

COMMENTARII
DE REBUS
IN
SCIENTIA NATVRALI
ET
MEDICINA
GESTIS.



VOLUMINIS XVII. PARS II.

LIPSIAE MDCCLXXI.

PVD IO. FRIDERICVM GLEDITSCH

Venduntur etiam

Amstelodami apud I. Schreuder, Londini apud Io. Nourse, Parisiis apud
Briasson, Patavii apud Io. Manfr , Holmiae apud L. Saluium.



I.

Medical Transactions, published by the College of Physicians in London. Vol. I. London printed for S. Baker and I. Dodsley. 1768. 8vo mai. Alph. 1. pl. 7½. Tab. aen. 1. *)

h. e.

Transactiones medicae a Collegio Medicorum Londinensi editae. Vol. I.

Cum hoc ipso seculo experiundo in rebus medicis plus inuentum sit, quam ratiocinando, Collegium Medicorum Londinensium, inuentas quoque res, ipsi traditas, collegit et edidit, miramur tamen, illud nec fidem relationum, nec opiniones propositas sua auctoritate confirmare velle. Nos de praecipuis rebus nunc ad Lectores nostros referimus.

I. *Animadversiones de aqua puteali Londinensi et p. I. de methodo purissimas aquas efficiendi.* Auctore Cl. GUILLIELMO HEBERDEN. M. D. Regiae societatis et Collegii medici membro **). Aqua puteorum Londinensium puluerem lapidis calcarei et tria cida mineralia, vitrioli, nitri et salis communis,

N 2

prae-

*) Tradita est versio Germanica: *Arzneykundige Abhandlungen etc. von D. CARL CHRISTIAN KRAUSEN.* Erster Band. Leipzig. 1768. 8.

**) lect. d. 22. iunii 1767.

praeterea oleosi quid continet, quod ex colore flavescente cognoscitur. Acidum vitriolicum calcaream partem in seleniten mutat, reliqua acida partes calcareas aquae intimius iungunt. Copia contentorum in mensura vna a decem ad viginti grana ascendit. Etsi vero Londinenses ingredientium particularum indolem variis signis cognoscunt, tamen ratione gustus puram iudicant, consuetudine ducti, ut quidam incolae Americae septentrionalis aquas fontanas, marinis inquinatas, libenter bibant. Medici aquarum impurarum noxam in morbis alendis, praecipue in imbecillis et infantibus, melius perspiciunt. Monet tamen Noster, ex calcarea aquarum terra calculos non generari, quorum terra animalis est. Coctura aquae fontanae non corriguntur, cum ea salia aquae intimius uniat, suadet itaque salis tartari aliquas particulas iniicere, quo terra calcarea praecipitetur, et acida salia in media mutantur minus noxia. Cum etiam aqua fontana putridis animalium partibus inquinetur, Cl. Auctor Londinensibus aquam fluuiatilem Thamesis commendat, et cum saepe particulis limosis aliisque impuris inquinata sit, p. 13. varios correctionis modos subiungit. De destillatione tandem aquarum agit ac varia, quae eam difficilem reddunt, commemorat et gratiam gustus iis denegat, interim tamen destillatas aquas purissimas iudicat.

p. 23. 2. *De elephantiasi*, Auctore Cl. THOMAS HEBERDEN, Medico in insula Madera, communicavit GUILLIELMUS HEBERDEN *). Elephantiasis, quae vera est leprae species, tubercula rubra in variis corporis partibus exhibet, prurientia et calentia cum febre, quae tamen cessat, quo facto tubercula liuida, scirrhusa, interdum tamen cutis coloris

*) lect. d. 22. iunii 1767.

colori similia redduntur. Facies potissimum ad supercilia tumet et pili ibi defluunt, simili ratione alae nasi, labia et auriculae tument et vlcera in cavis vicinis oriuntur. In extremitatibus ungues scabri fiunt et vlcera gangraenosa fouent, quae digitorum articulos subinde destruunt. In quibusdam tantum aegris crura vltra modum intumescunt, et tunc inter tubercula cutis finditur, in aliis enim extenuata sunt cum vel sine vlceribus. Cutis faciei splendida est et in vniuersum sine sensu, motus etiam digitorum manus et pedis cessant. Anima foetida est et pulsus debilis. Notat tamen Noster, morbum interdum alio symptomatum ordine procedere. Quamquam etiam vere contagiosus et haereditarius dici nequeat, commemorat tamen exempla latentis morbi et in generatione continuata iterum se euoluentis. In litteris additis Cl. TH. HERBERDEN, curatio morbi iam confirmati, praecipue ope corticis Peruuiani, describitur, qua occasione monet, mercurialia morbum non exasperare, et si eum non sanent. Cl. GUIL. HERBERDEN hac P. 39. occasione de serpentibus et cura viperarum pauca adiicit.

3. *Observationes de ascaridibus* communicatae a P. 45. Cl. GUIL. HERBERDEN *). Ascarides intestinum rectum et ani orificium potissimum irritant, a qua re nonnunquam somni defectus et aestus cum tumore intestini inducitur, dolor interdum quoque ad imam partem abdominis percipitur, mucusque sanguinolentus cum ascaridibus viuis excernitur. Clysmata ex decocto tabaci, aqua calcis et solutione vitrioli sine fructu fuerunt, tenesmus, qui saepe vrget, lacte calido et oleo iniecto temperatur. Purgantium porro leniorum et fortiorum varius vsus di-

*) lect. die eodem.

iudicatur et exemplis ostenditur, sanitatem cum ascaridibus diu illibatam esse posse, quod in aliis vermibus non ita obseruatur. Sal commune specificam virtutem in vermibus habere asserit et ideo sequentem obseruationem subiungit.

P. 54.

4. *Notatu dignus et bonus effectus largioris dosi salis communis in caussa verminosa **). Vir a variis incommodis infimi ventris contracti et sicci per quatuor annos ita confectus est, vt cum insigni macie prorsus langueret. Vsus quidem est variis medicamentis, sed sine fructu, donec suasu amici salis communis libras duas, in duabus mensuris aquae fontanae solutas, horae spatio deglutiret. Sensit inde insignem oppressionem pectoris, reiectis tamen per vomitum cum muco vermibus, melius se habuit et, aluo sicca, difficulter alias soluenda, mobili reddita, magna copia muci et vermium reiciebatur. Sitis ingens et dysuria eum quidem male affecerunt, sed potu aquae et lactis ebutyrati haec symptomata mitigata sunt, vt vsum remedii diutius continuare potuerit. Morbo sublato, prophylacticum remedium, libram dimidiam salis communis soluti tribus vel quatuor diebus ante nouilunium et plenilunium hausit.

p. 60.

5. *De coecitate nocturna sive nyctalopia*, Auctore Cl. GUILIEL. HEBERDEN **). Vir triginta annorum, febre intermittente per parcum nimis corticis Peruuiani vsum mitigato, recidiuam sensit, sed frigido tandem balneo febrim suppressit. Ab eo autem tempore noctu oculi obfuscati et tandem coeci redditii sunt, visu tamen summo mane iterum restituto. Morbus singulis noctibus redibat, quamdiu in mari commoraretur, in terra tamen viuens sensim

*) lect. die eodem.

**) lect. d. 6. iulii 1767.

sensum correctus est. Incidit hic paulo post in tabem et obiit. Notandum vero est, hunc virum antea labores, in quibus plumbum tractatur, suscepisse.

6. *Observationes de cancro*, Auctore Cl. MARCO AKENSIDE, Collegii medici et societatis regiaie socio, Medico regio *). Varias, quae cancri naturam et curationem spectant, collegit annotationes. Viri mentionem facit, qui verrucis in facie aliisque corporis partibus affectus est, quae etiam saepe resectae iterum redierunt et narrat, aegrum tandem aliquam insignem ad articulum cubiti resecare noluisse, ideoque ad Nostrum accessisse, qui eam, cum in cute mobilis haereret, per chirurgum resecare iussit. Etsi vero, quae porro huic viro acciderint, nesciat, in his tamen verrucis primam cancri originem inuenire putat, cum materia in subcutaneas glandulas coniiciatur et regeneratio ex humoribus peruersis, ad cutim ductis, fiat. Arbitratur enim, in his veram scirrhosam duritiem esse, quamquam cutis, a compressione et calore circumiacentium partium libera, non semper vlcera carcinomatrica formet. In cancroso vero per corpus dispersa materia, tandem variis in locis sedem figente, narcoticas plantas, vt antea solanum, sic nunc eicutam, vt specificum medicamentum, adhibuerunt.

Agit vero primum de viribus mercurii sublimati corrosiui, qui in venereis morbis magis, quam aliae medicinae mercuriales laudatus est et observationes subiungit, ex quibus patet, eum in scirrhis quoque discutiendis non inutilem fuisse. Femina quinquaginta circiter annorum, tumorem scirrhosum a ceruice ad aurem dextram et articulum maxillae inferioris extensum, habebat, dolorosum et ma-

N 4

xillae

*) lect. d. eodem.

xillae motum impredientem, exhibuit ei quartam tantum partem grani mercurii sublimati bis de die in vini spiritu et scirrhum intra quinque hebdomadas ita discussit, vt sine incommodo viueret. Medicamento tamen seposito, scirrhi moles denuo cum febre increuit, qua sopita et mercurio per mensem iterum adhibito, ita conualuit, vt ex nosodochio secederet, nec vnquam reuerteretur. Simili medendi ratione tumorem sub lingua exulceratum in alia femina se curasse affirmat.

P. 75. Cicuta postea in multis curationibus a Cl. STOERCKIO et aliis adhibita, et Noster tentamina instituit. Etsi vero a minori dosi ad maiores procederet, in imbecilibus tamen, temulentiam cum sudore frigido et interdum deiectiones aluinas inde fieri cognouit, quae tamen incommoda vsu aromaticorum breui euanuerunt; in scirrhis ipsis et aliis tumoribus discutiendis certum auxilium non obserauit, et arbitratur, narcotica haec medicamenta, vt opium, agere, cuius auctas doses tandem aegri ferunt.

p. 80. Lancinantes vero dolores in carcinomatibus cicuta cohiberi, exemplo carcinomatis vteri probat. Propinauit aegrae bis de die scrupulum dimidium extracti cicutae; eo effectū, vt dolores et effluxus materiae ichorosae cessarent, redeuntēs quidem post sepositum medicamentum. Etsi vero postmodum quindecim grana extracti bis de die adhibebat, doloresque iterum cessabant, sub continuato tamen medicamenti vsu recrudescebant et aegra paulo post misere periit.

p. 84. Addit tandem Noster varias obseruationes, in quibus corticem Peruuianum cum mercurio et cicuta combinauit, nec tantum lancinantes dolores sopiit, sed etiam aegros vere sanauit. Monet vero, omnes aegros in recenti malo, minime vero in inueterato auxilium expertos esse.

7. *De usu ipecacuanhae in asthma.* Auctore E O-DEM *). P. 93.
 Asthmatis differentiis breuiter expositis, et illo, quod ex hydrope pectoris pendet, simul examinato, praecipue illud, quod spasmodicum dicunt, persequitur, quod nimirum in stricture bronchiorum et cellularum pulmonalium consistit. In hoc opio cum fructu usus est, propinauit vero tincturae thebaicae guttas centum et ultra breui temporis spatio; ex qua re aegri per duos tresue dies stupidi facti sunt et vnus in anasarcam incidit. Laudat P. 96.
 itaque Noster lenia vomitoria et inprimis ipecacuanhae puluerem, quem a tribus ad quinque et deinde ad decem vsque grana propinauit. Quamquam vero interdum vomitum experti sunt aegri, mitiores tamen doses per aliquot hebdomadas continuatas, usu suo salutare inuentas esse, exemplis confirmat.

8. *Methodus medendi tumoribus albis articulorum.* P. 104.
 Auctore E ODEM **). Hos tumores, ex scrophulosa dispositione aegrorum oriundos, insignia saepe mala inferre, res notissima est. Methodum itaque medendi vtilem, nisi hydrops articuli accedat, proponit sequentem. Vesicatoria circa articulum applicauit, paruas doses calomel ad vnum alterumque granum vesperi et praeterea decoctum amarum, inprimis corticis Peruuiani, exhibuit et egregios effectus in continuata curatione expertus est. Femina, durante curatione, miliaribus superuenientibus et recte exsiccatis, sanata est.

9. *Epistola Cl. T. LANE ad Cl. GUILIELMUM P. 112.*
 HEBERDEN ***). Tentamina cum lixiuio salis alcali et calcis viuae proponit. Varia nimirum proportionem miscuit cineres clauellatos, calcem viuam, nec

N 5 non

*) lecta die eodem.

**) lect. d. eodem.

***) l. d. eodem.

non testas ouorum calcinatas, sodam et alia et in lixiuiis ita paratis calculum soluere tentauit. Cum nos cuncta repetere nequeamus, quaedam confectaria subiungamus. Salia alcalina fixa vim calculum dissoluendi non habent, nisi, calce addita, aliqua aëris fixi parte priuata sint: si vero, maiori calcis copia addita, omnis aër fixus eiicitur, vis dissoluens non augetur. In his experimentis cineres clauellati et sal tartari similem monstrant vim, illi tamen saepe impuri sunt. Alkali minerale longe inferius vegetabili, hinc in praeparationibus medicamentorum sapo Londinensium amygdalinus melius admiscetur, quam Hispanicus.

- p. 125. IC. *De operatione mercurii in diuersis morbis et constitutionibus.* Auctore Cl. EDUARD BERRY, M. D. et regiae Societatis membro *). In vniuersum differit de vi mercurii ex grauitate et diuisibilitate declaranda, quibus enim potissimum rarefactio sanguinis fit. Postmodum ex HALLERI primis lineis physiologiae ramorum aortae progressum repetit, et longo sermone demonstrare annititur, mercurium, sanguine receptum, per aortam magis ad carotidem externam, quam ad alios ramos dirigi et praecipue glandulas saliuales afficere. Ex iis, quae breuiter indicauimus, satis apparet, Nostrium simili ratione in explicandis phaenomenis morborum versari, ideoque in morbi venerei curatione, in retardata et celeri saluatione, in vsu frictionis mercurialis, hypothesibus uti, ex phaenomenis difficulter illustrandis, quae ideo iudicio Lectorum submittimus.

- p. 165. II. *Descriptio et cura grauissimi cuiusdam morbi oesophagi.* Auctore N. MUNCKLEY, M.D. Colleg. med.

*) lect. d. 13 iulii 1767.

med. et Societ. reg. membro *). Tubus oesophagi interdum ita contrahitur, vt aegre admittat cibos solidos, tandem, et his exclusis, fluidissimos; in augmento morbi supra stricturam expanditur oesophagus et vomitu reiicit cibos non diu retentos. Saepe ipsa callositas in contextu cellulari, crassas reddit tunicas, interdum glandulae vicinae obstruuntur. Angustatio vero vel ad pharyngem, vel profundius ad cardiam obseruatur. A medico exercitato cognouerat Noster, in hoc malo frictiones mercuriales ad partes colli, superaddito insuper cerato mercuriali, excitata etiam leni saluatione, opem tulisse. Ille ergo, similibus aegris crebrius obuenientibus, primum parcas mercurii doses propinauit, saluatione semper cohibita, hanc tamen, si malum vinci non potuit, lente fieri permisit ad sextam saepe hebdomadam. Haec in recenti morbo valent, si enim aeger deglutita paulo post vomitu reiicit, difficulter, nec vnquam curatur.

12. *Disquisitio caussarum colicae endemicae Deuo-P. 175.*
nienfis (Damnonienfis). Auctore Cl. GEORGE BAKER, M.D. Colleg. med. et Societ. reg. membro, medico aulico **). Etsi non interest scire, quid morbum faciat, sed quid eum tollat, tamen non nisi cognitionem caussae ad morborum cognitionem ducere, certum est. Ad hanc rem, in morbo hoc endemio diiudicando, praecipue respexit Noster. Vino pomaceo colicam Damnoniensem excitari, Cl. MUSGRAVE docuit; magis vero hanc rem illustrauit Cl. HUXHAM, qui ad vini illius differentias et aëris vicissitudines, imprimis in vento boreali, simul respexit, et ad corruptionem bilis porraceam, inde natam, attentus fuit. Noster tandem non solum noxiam P. 188.
 succi

*) lecta die 11 augusti 1767.

**) lecta d. 29 iunii 1767.

fucci pomorum indolem, sed admixtas quoque venenatas plumbi particulas examinavit. Quamquam enim acidi crudi in pomis, ad maturitatem veram saepe non accedentibus, vel ex cultura minus accurata aliisque causis minus bonis et corruptis, noxam non negat et varia symptomata, inde in aegris oborta, ex Auctoribus repetit, studiose tamen inquit, quomodo plumbum, subdole ab hoc acido solutum, in mixtionem vini, inprimis pomacei, intret, et sanitatem laedat. Hanc vero rem, testimoniis Auctorum vbique commemoratis, egregie illustrat. Hac occasione etiam de coctura vinorum tenuium, qua ad fermentationem meliorem duci dicuntur, differit, et in hac quoque disquisitione clandestini veneni, ex plumbo accedentis, testimonia, assensu variorum medicorum confirmat.

p. 217. Cum autem Cl. Auctor non solum in examine per liquorem probatorium vini subsistere voluerit, sed alia quoque subiecerit tentamina, his quaedam in uniuersum de vnione particularum plumbi cum vino praemittit. Acidum vegetabile, cum dulcedine vini coniunctum, per fermentationem intimius combinatur, si vero nimis copiosum et crudum fuerit, vt subigi nequeat, praeparatis variis plumbi additis, transitus ad fermentationem acetosam impeditur. Vina, dulcibus particulis magis saturata, huic corruptioni minus obnoxia sunt. Vegetabile acidum aut natium in musto, aut in fermentatione acetosa, aut in intermedio statu vinorum, fermentatione praeparatorum, plumbum vel ipsum, vel varie calcip. 221. natum suscipit. Tentamina nunc varia, cum vino pomaceo, saccharo saturni et aliis praeparatis plumbi instituta, proponit, additis obseruationibus, quarum repetitionem nostra non patitur recensio.

p. 231. Commemorat quidem ea, quae Cl. SEERUP, Auctor quidem de reliquo minus notus, in *triumpho*

pho lithargyriatorum, et hac occasione simul vires medicas plumbi, a variis medicis laudatas, recenset, et concedit, praeparata plumbi interne propinata, refrigerare, incrassare, repellere, resolvere et acrimoniam obtundere, inde in sudoribus colliquatiuis, aliisque fluxibus et haemorrhagiis bonos effectus edere, qui vero transitorii sunt, suo tamen modo noxii, cum varia quoque medicorum testimonia damna, inde oriunda, confirment.

Cum facile praeuiderit Cl. Auctor, opinionem p. 242. suam de plumbo, pomacea vina corrumpente, objectionibus ansam daturam esse, varias sibi ipsi proposuit dubitationes, quas simul diluere annititur. Sub finem tamen optat, ut causa endemiae Damnoniensium colicae, morbi adeo tristis et exitiosi, si forte ab Eo non satis definita sit, aliorum tentaminibus porro definiatur.

13. *Examen variorum modorum, quibus venenum p. 257. plumbi in humanum corpus clanculum se insinuare potest.* Auctore EODEM *). Ii, qui plumbum varia ratione tractant, colica saturnina afficiuntur, diro morbo, cuius impetu apta medendi ratione sopito, si ab his laboribus recedunt, vel illos maiori cum cautione instituunt, a morbo non amplius petuntur. Sed sunt, qui v.c. vino, lithargyrio adulterato, modice vtuntur, imbecilles potissimum, varia incommoda sentiunt, quorum causam saepe nesciunt et medicamentis minus idoneis tractantur, hi tamen sensim languidi et macilenti fiunt et tandem convulsiui vel apoplectici moriuntur. Hac ratione forte praeparantur et propinantur lenta venena, quae hominem solo languore subinde eneruant et conficiunt. Ostendit quoque Noster olea, butyrum et lac ab infectione plumbi non libera esse.

Transit

*) lect. d. 13 iulii 1771.

p. 265. Transít postea ad vasa terrea, vitro plumbi, et cuprea tenui lamina stanni, cum plumbo mixti, obducta, et proportionem plumbi admixti studiose examinat, ita, vt cibis et iusculis admixtas plumbi particulas tentaminibus definiat, et teneriorum et imbecillium corpora his tamen maxime laedi confir-

p. 280. met. Progreditur ad destillationes aquarum per plumbea, vel plumbo obducta vasa et monet, teste MATTHIOLO, his aquis, ob causam plumbi, dulcedinem conciliari et sedimentum album in iis esse, aliaque plura exempla addit, vbi colicam siccam in Americae insulis et prouinciis frequentem, his destillationibus et cocturis in vasis plumbeis, vel plumbo obductis, oriri, asserit. Aquam etiam simplicem frigidam, per plumbeos canales ductam, his metalli

p. 301. particulis infici, variis testimoniis probatur. Additis nonnullis, quae superiores de vino, plumbo corrupto, obseruationes illustrent, ad effectus noxios medicamentorum internorum, ex plumbo paratorum, praecipue sacchari saturni, respicit et simul saturninorum, in emplastris et vaporibus externe applicatorum, damna commemorat.

p. 319. 14. *Tentamen historicae recensiois, speciei colicae spasmodicae, quae nomine colicae pictonum insignitur.* Auctore EODEM *). Praemissis variis ex veterum libris, de colicis singularibus et plumbo, monet, Cl. FRANCISCUM CITOIS 1617. primum colicae pictonum in libello singulari mentionem fecisse, addit vero plures fuisse, qui ante eum colicas endemias descripserint. Ex his PARACELSUM commemorat, qui de simili colica agit, arbitratur autem, hanc medicum, vsu variorum remediorum saturninorum, excitasse.

Sed

*) lect. d. 21 iulii 1767.

Sed cum, Cl. BAGLIVIO monente, nihil fa- P. 334.
cilius colicae superueniat, quam paralyfis, Cl. GRAS-
HUIS colicam pictonum tantum ex atrocissimo et
pertinacissimo dolore definiuit, ex quacunque de-
mum caussa illa oriatur. Alii itaque ad tenuem
acrimoniam in vniuersum, alii speciatim ad vini vitia
respexerunt, quamuis etiam haec vtplurimum a li-
thargyrio, vino admixto, orta sint, quod in Germania
praecipue publicis et feuerissimis legibus interdi-
ctum est, ad plumbum tamen non adeo, vt caussam
colicae, sed ad cruditatem vini, ita correcti, vel po-
tius corrupti attenti fuerunt. Quam ob rem No- P. 350.
ster iterum regreditur ad praeparationes vini, a vete-
ribus indicatas, et ab admixti plumbi suspicione non
alienas, ex qua caussa etiam colicae endemiae, a ve-
teribus medicis descriptae, ortae sunt.

15. *Examen variarum caussarum, ex quibus colica* P. 364.
pictonum orta, dicitur. Auctore EODEM *). Tra-
ditur brevis recensio caussarum, ex quibus varii Au-
ctores genesis huius colicae declarare voluerunt.
Commemorantur itaque febres crisis imperfectis
iudicatae vel male curatae, venena et ex cupro, an-
timonio, mercurio praeparata medicamenta et va-
pores, forte etiam omnes vapores metallici, arthri-
tis et rheumatismus, suppressa perspiratio, scorbu-
tus, melancholia et tandem omnes ingratae animi
commotiones. Omnibus tamen his amplius decla-
ratis et Auctorum testimoniis explicatis, Noster
semper ad vim plumbi reuertitur, quoniam in mor-
bis his saepe medicamentis, ex plumbo paratis, vsi
sunt, vel si hoc non ostendi possit, alios colicos do-
lores esse cum colica pictonum non confundendos,
in qua praecipue ad paralyfin aliasque neruorum af-
fectiones attendendum est.

16. *De*

*) lect. d. 7. august. 1767.

P. 407.

16. *De polypo bronchiali.* Auctore R. WARREN, Colleg. med. et Societ. reg. socio, medico regio *). Polypos in variis corporis cauitatibus nasci res notissima est, rarior vero ille, qui in bronchiis concrefcit, nunc a Nostro describitur. Puella octo annorum, glandularum obftructionibus obnoxia, refpiratione difficili affecta, venaefectione, veficatoriis et laxantibus tenuioribus parum leuabatur, pulfus femper iufto frequentior erat, et oxymel squilliticum poftea propinatum tantum tranfitorium auxilium efficiebat. Duodecimo demum morbi die, aegra tuffiundo reiiciebat polypofam concretionem fine fanguine, pure et muco, qua quidem excretionem facta, ea melius fe habere videbatur, fed refpiratio difficilis et celerior pulfus denuo obferuabantur, et noui femper polypi ad alterum ufque annum excernebantur. Interualla morbi, interdum obvenientia, a mutatione fitus polypi, pulmones minus prementis, declaranda funt. In tabula duae figurae polyporum excretorum delineatae funt, quae afpectu arteriae ramis respondent. Materia alba, opaca, coagulato lacti fimilis erat; aliquae vero concretiones denfiores erant, in aqua non foluendae, aliae laxiores, in ea facile fecedentes, interdum muco adiecti erant globuli denfiores pifi figura.

P. 417.

Polypos fimiles vafa efle fanguifera, TH. BARTHOLINUS et TULPIUS affirmarunt, fed RUYSCHIIUS, qui fimilem polypum in cadauere inuenerat, hanc fententiam reiicit, genefin tamen non declarat. Noster nonnullis obferuationibus, et fimiliter ferme ex HIPPOCRATE propofita, Cl. MORGAGNII fententiam probat, qui exfudationem muci ex glandulis et gelatinae ex tenerrimis vafis, vt caufam, affert; concrefcere enim et in lamellas cogi materiam, autumat, quae explicatio cum genefi polyporum

*) lect. d. 11 auguft. 1767.

porum in vniuersum conuenit. Scrophulofi, qui nimirum glandularum vitiis laborant, praecipue in polypi geneses procliuēs sunt. Aegra vero lenioribus sanguinis missionibus et pectorantium vſu adiuta, non vero curata eſt, ſaepe enim in prandio et coena inprimis a grumo panis in aſperam arteriam deſlapſo, has polypofas excretiones paſſa eſt. Decoctum corticis Peruuiani diu ſumptum, balnea in aqua marina, Briſtolienſes aquae, et tandem aqua calcis leuamen afferebant, ſed minus conſtans, morbus enim non ceſſabat, niſi exulceratio ad os calcis oriretur.

17. *De variolis gallinaceis, (chicken-pox).* Au-p. 427. Auctore Cl. GUIL. HEBERDEN *). *Chicken pox* et *ſwine-pox* ſunt nomina vulgi, quibus variolas ſpurias indicant, hae, vt notiſſimum eſt, leuioribus ſymptomatibus ſtipatae ſunt. Noſter ideo tantum in eas inquit, quo differentiam a veris potiſſimum ratione inoculationis inſtituendae et diiudicandae definiat. Cum autem Noſter generalia et vbique nota ſigna variolarum ſpuriarum ſeroſarum proponat et reliquas differentias non tangat, nihil repetimus, et hoc vnicum tantum monemus, Cl. Auctorem inſitionem harum variolarum ſine omni effectu tentaffe, ideoque arbitrari, inoculatores ſaepe, has ſpurias ad inoculationem eligentes, falli.

18. *De epidemia catarrhali iunio et iulio menſep. 437. 1767. obſeruata.* Auctore EODEM **). Deſcribit progreſſum variarum febrium catarrhalium, Londini graſſantium, quae tamen non tam graues erant, quam ſimiles anno 1762 cum calore inſigni atmofphaerae obſeruatae.

19. *Flo.*

*) lect. d. eodem.

**) lect. d. eodem.

p. 442. 19. *Flores cardamines, medicamentum antispasmodicum, tentaminibus medicorum commendatum.* Auctore GEORGIO BAKER *). Virtutes florum cardamines a veteribus et recentioribus expositas breviter enarrat Noster, et variis exemplis probat, antispasmodicam vim his floribus denegari non posse. Virginem, asthma spasmodico vehementer excruciatam, puellam et puerum, convulsivis motibus crebrius affectos, hoc remedio sanatos vidit.

p. 449. Femina triginta quinque circiter annorum tempore menstruorum perterrita, et inde convulsa est cum difficili deglutitione, ex paralyti pendente. Morbo hoc per quindecim annos durante, et variis medicamentis sine fructu tentatis anno 1765. hemiplegia affecta est, quam convulsio superueniens quidem discussit, morbus vero omni ferme mense reversus est, cum deglutitione semper laesa. Post duos annos demum Noster ei propinavit pulveris florum cardamines drachmam semis bis de die, et ad diem, quo haec observatio lecta est, morbum non solum imminutum, sed penitus suppressum vidit. Alia femina, grauioribus morbis nervosis affecta, quorum causa etiam post mortem, sectione cadaveris, in medullaris substantiae uniuersae duritie et siccitate inuenta est, durante morbo, a drachma una huius medicamenti bis, postea drachma una et dimidia ter de die propinata leuamen sensit.

p. 460. 20. *Appendix ad Cl. BAKER disquisitiones causae colicae endemicae Damnoniensis.* Cl. Auctor ipse varia testimonia affert de vini pomacei, per accessionem clandestinam plumbi, corruptione, ut causa colicae. Sub finem etiam monet, mercurialia medicamenta, nisi, destillatione mercurii praemissa, elaborantur, colicam quoque inducere posse.

21. Quae-

*) lect. d. eodem.

21. *Quaestiones* a Cl. GUILLIELMO HEBER-P. 469.
DEN *propositae* *). 1.) Estne cortex Peruvianus
adstringens medicamentum? Negatur. Lochia et
catamenia feminarum non repressit, nec salivationem
in variolis confluentibus cohibuit. 2.) Medetur
camphora stranguriae? non dici potest, cum
eam crebrius excitauerit. 3.) In morbis exanthematis
eruptio melius succedit, si aegri aliquoties
de die lectulum relinquunt. Potestne tepor lecti
caussa eruptionis dici? 4.) Estne podagra remedium
certum aliorum morborum, ut vulgo creditur?
vel nonne grauius malum est, illis, quorum curam
efficere dicitur? 5.) Paralyfes et apoplexiae rarius
iuniores, semper ferme adultos et ad senium proce-
dentes, afficiunt, praeter purgantia ideo non nisi
cardiaca medicamenta postulant. Nonne ideo no-
xia videtur larga sanguinis missio? Proposita est dif-
ferentia inter pituitosas et sanguineas apoplexias;
in his tantum venaesectio admittitur. Sed si ante
morbi ingressum, nulla caussa sanguinis missionis in-
venta est, in ipso insultu parca, minime autem lar-
ga, admittatur. Vidit Noster apoplecticos, nimia
venaesectioe laesos.

*) die 11. augusti 1767.

II.

Historia constitutionis epidemicae verminosae, quae annis 1760. 1761. 1762. et initio 1763. per insulam Overflacqué et contiguam Goedereede grassata fuit cum perpetuis fere commentariis in praecipuos verminantium morbos ac locupletissimo capitum et sectionum elencho. Auctore I. I. VAN DEN BOSCH Medic. Hagan. L. B. apud Samuellem et Ioannem Luchtmans. 1769. 8. mai. i. Alph. pl. i. sine dedicatione et elencho capitum.

Quamquam pathologia animata multis prorsus superuacanea videtur medicis, tamen aegrorum obseruationibus, hanc rem spectantibus, ductus, Cl. Auctor in hoc, cuius summam cum Lectoribus communicamus, libro, pathologiam verminosam non plane esse repudiandam, multo potius attente ac diligenter vt causam, non semper morborum proximam, sed ferocium in aliis morbis symptomatum considerandam esse, studiose ostendit. Atque cum Noster non ab eorum sit partibus, quibus morborum nomina ament, sed potius causas eorum persequantur, in hoc libro pertractando magna cum studii assiduitate, quid in verminantibus morbis acciderit, quasnam mutationes illi induxerint, quae nam auxilia profuerint et num symptomata indubitata, vt signa certa ad veram diagnosin eruendam et vbinam acquiri possint, exponendi dedit operam. Ita namque, obseruationibus quam plurimis et optimis veterum aequae, ac recentiorum additis, historiam verminosae constitutionis, per quatuor prope modum annos grassatae, praemisit, dein regionem inco

incolarum vitae genus, atmosphaerae vicissitudines et omnino vermium generationem in corpore humano persecutus est. Postea morbos tam epidemicos, quum sporadicos cum vermibus tradidit. Tum symptomata nonnulla, varios huius constitutionis morbos comitantia, exposuit ac medicamenta. Tandem in rationem plurimorum phaenomenorum inquisiuit, quibus quaedam, diagnosin spectantia, nituntur.

Verminosa haec constitutio epidemica merito a P. II. Nostro appellatur, cum nullus morbus, per totam hanc epidemiam e. g. peripneumonia, pleuritis, variolae, petechiae, inflammationes hepatis alique sine lumbricis, raro aliis vermium speciebus, et vna vice taenia, adfuerit. Qua itaque sedulo descripta et aere, loco et aqua praemissis, omninoque pathologia animata illustrata, ad morbos verminosos ipsos Noster deuenit, eosque vel vt morbos primarios, vel secundarios seu comitatos considerat.

Ac primum quidem Cl. Auctor de febribus con-P. 30. tinuis putridis cum vermibus agit. Quarum, vt et aliorum verminosorum morborum, haec inprimis memoramus symptomata: vehemens supraorbitalis dolor capitis, radicem nasi et partes fronti vicinas occupans, interdum leuior erat hic dolor cum pupillae maiori dilatatione, quam Noster et in aliis acutis febribus saepius obseruauit, narium pruritu et aurium susurru. Indicationes curatoriae tres sunt: proxima de statione auerruncare morbum, putredini siue in sanguine, seu ipsis in intestinis resistere, vrgentia compescere symptomata. Atque hoc fit lenioribus laxantibus, vt rhabarbaro optimo, cum sale polychresto et radice valerianae coniuncto, remedio anthelmintico et remediis antispasmodi.

fmodicis et antiputridis. Inter symptomata vrgentia compescenda refert anxietatem praecordiorum, quam acidis mineralibus optime sedauit, ideoque acida mineralia ac vegetabilia in his morbis maiorem in modum suadet. Nec minus repetit id, quod FORESTUS de vtilitate cornu cerui vsti contra vermes obseruauit.

P. 45. His pertractatis, scholia ad febrium putridarum historiam cum vermibus a Cl. Auctore sunt addita, quorum primum maxime spectat illarum distinctiones, ex veteribus aequae ac recentioribus haustas. Ac potissimum placet Nostro distinctio in gastricas et sanguineas, quibus petechiae vermesque accedunt. In his saepissime sufficiunt sudor et vrina critica, interdum haemorrhagia narium subsequitur, in illis alui fluxum aut vomitum accedere oportet. Id quod in scholio secundo, ubi animaduersiones quaedam in acutarum cum vermibus regimen criticum, adduntur, amplius adhuc demonstratur. Tum ad scholion tertium, quod diagnosin vermium in acutis et nonnulla theoremata practica attinet, progreditur. Signis supra iam commemoratis, addimus linguam mucosam, fuscam cum anima foetida, dolores laterales vagos, non pleuriticos vel post crisin remanentes, pulsum inconstantem et intermittentem debilem, ventriculi dolorem cum praecordiorum anxietate, syncopen et lipothymiam, vrinae suppressionem, leviores in pollice et indice conuulsiones, aluinas deiectiones mucidas, ramentosas, aluoque aperta horum symptomatum decrementum, clausa vero eorum plerumque incrementum, subitam ad caput metastasin cum encephali molestiis, sudores copiosos non criticos, vrinam limosam, iumentosam.

Remedia, ab Auctore tentata et probata, sunt: aluum leniter cientia siue vomitoria; his clysmata antiputrida ex oxymelle scillitico, spiritu vitrioli, assa foetida

foetida et amaris coniungebantur; lingua nigra apparente, corticem Peruvianum, cum rhabarbaro gummi arabico siue cornu cerui vsto compositum, acida mineralia ac vegetabilia aliaque antiphlogistica Cl. Auctor adhibuit, venaesectionem vero noxiam iudicat.

Iam progreditur Noster ad febres intermittentes p. 71. verminoso biliosas et catarrhales, quae ab initio febribus cum lentis alebant quamdam similitudinem, paulo post vero erant acutis adnumerandae. Apparebant hic nausea, conatus vomendi cum nausea gulae, ructus rancidi et largus salivae affluxus, lingua impura, aphthae faucium, vteri haemorrhagia, angina inflammatoria, icterus, dolor ischiadicus, lienteria, vomitus aeruginosi, animi deliquia, deliria, articulorum et digitorum intumescencia cum peculiari exanthemate, mittimus alia symptomata. Horum morborum, cum his symptomatibus stipatorum, Cl. Auctor studiose collegit exempla, quibus methodum medendi, scholia, epicrises, et theoremata practica addidit. Quae quidem omnia cum nobis non liceat, etiamsi optabamus, per instituti rationem pertractare, de nonnullis tantum videamus.

Quaerit e. c. num haemorrhagia vteri a vermibus oriri queat? Id quod quamquam non omnino asserere ausus est Noster, tamen ex analogia, cum plerumque haemorrhagia narium a vermibus excitetur, nec non ani tubercula et haemorrhoides tam coecae, quam apertae communes sint verminosis, eodem modo vermes vteri haemorrhagiam efficere, Nostro verisimile videtur, ac inprimis quidem, quoniam intima vteri cum intestinis est connexio. Obseruavit enim Cl. Auctor menstruorum phaenomena in puella octo annos nata, abdomine remediis anthelminticis illito, iterum cessantia. Porro vidit

feminas copiosis vteri, tum narium haemorrhagiis ita vexatas, vt menstrua omni propemodum binarum triumue septimanarum spatio nimium fluerent, quae, expulsis vermibus, ex lege naturae catamenia experiebantur. Tandem ad hanc rem comprobendam memorat abortus, ex vermibus oriundos, spasmosque, ab iis excitatos, quibus suam potissimum debent originem haemorrhagiae; illis quoque ipsis spasticis contractionibus, a nimia vermium irritatione profectis, adscribit icterum, cuius mentionem facit inter symptomata.

p. 106. Quod ad methodum medendi attinet, semen plantaginis rotundo folio inter medicamenta anthelmintica Noster refert, aluumque apertam lenioribus, si fieri potest, remediis, ne febris inde nimium intendatur, seruare, potentiora vero purgantia ad dies criticos esse differenda suadet. Amaricantia anthelmintica remedia ob tonicam eorum virtutem in fine biliosarum harum febrium, quam in initio exhiberi mauult.

p. 127. Dein ad febres lentas verminosas considerandas se accingit Cl. Auctor. Sensim hae febres progrediebantur et aegre sese prodebant sensibiles exacerbationes; praeter leuem nocturnum sudorem, frigoris et caloris vicissitudinem, cum aurium, capitis omnino et abdominis molestis sensationibus, vespertinis nocturnisque inflationibus, cum vermiculatione aut matutinis obscurioribus ventris doloribus, quos aluus aperta sequebatur. Aucta febre, augebant sese quoque haec memorata symptomata. Versus vesperam hae febres ingruebant, saepeque tum sudore minus critico aegri debilitabantur, nec raro reuertebantur, continuam remittentem interdum mentientes, in acutam malignam transibant, actum profecto vix ab aliis putridis poterant discerni febri-

febris. Quibuscum coniungebantur tympanitis, cutis intertrigo, phthisis sicca abdominalis, hypochondriaca et hysterica passio, leucophlegmatia. Nec grauidae liberae erant ab his febris et, nisi tempore grauiditatis, vermes expellebantur, febris acuta saepenumero puerperis eueniebat. Inter symptomata, quorum aliqua pars iam a nobis est memorata, hic seligemus dolorosam otalgiam, erysipelate concomitatam, odontalgiam, quam, etiam si verminantibus adeo frequens est, tam raro animadversam esse a medicis, miratur Cl. Auctor, amaurosin, haemorrhagiam vteri, vomitum cruentum, haemoptoen, linguam vel tumidulam, incisuris leuioribus et dentium foueis ad marginem impressis, oculos excavatos, halone liuido cinctos, oculos nigerri- mos cum pupillis amplis, albuginea interea madore splendente, tusses saepe moleste irritantes in summa larynge, oris ventriculi dolores vel contentionem leuiusculam circa vmbilicum. Haemoptoen a ver- mibus posse effici, probat Cl. Auctor partim ea- dem ratione, ac alias haemorrhagias verminosis so- lennes et supra a nobis commemoratas explicat, par- tim ex effectu medicamentorum. Per aluum enim ducentia, vermibus expulsis, cessauit haemoptoe. Quapropter in omni omnino haemorrhagia, a caus- sa verminosa orta, aluo esse prospiciendum, Cl. Au- ctor monet. Caeterum quod curam attinet, elixi- rio vitrioli acido, quod parauit ex spiritu vitrioli, tinctura chinae et cinnamomi, et decocto mer- curii in tympanitide verminosa optime cum successu usus est, eoque non solum vomitum atque cardialgiam sedauit, sed etiam aluum, antea pertina- citer clausam, inter eius usum reddidit apertam.

Leucophlegmatiae verminosae causa cum ab in-p. 159.
dole morbi mucosi primarii pendeat, sedulo ad eum
O 5 respi-

respiciendum est. Raro enim solis diureticis cedit remediis, nisi vermes expellendi eorumque nidum destruendi habeant vim, ac tum obstructiones in visceribus chylopoëis sponte quasi resoluuntur. Porro in nullis propemodum verminantium morbis tantam pupillarum dilatationem, quantam in leucophlegmatia verminosa, atque maiorem oculorum splendorem obseruauit Cl. Auctor. Remedia, quod attinet, ea adhibuit, quae supra commemorauimus.

p. 170. Nec minus respicit Noster in cute ferina ceu exanthematibus verminantium ad morbum mucosum. Materie enim hac mucosa, calore corporis, acri facta et degenerata, et ex primis ad secundas vias indeque ad peripheriam corporis delata, varia exanthemata et vlcera oriri oportet. Quapropter primis viis praecipue prospiciendum est.

p. 179. Quemadmodum vero Cl. Auctor in verminantium exanthematibus omnino primas vias in primis depurandas, sic omnia fortiora purgantia in iis vitanda et externa caute adhibenda esse suadet. Necessariam enim vrget erysipelatis aequae ac reliquorum exanthematum verminosorum distinctionem in symptomaticum et idiopathicum. In symptomatico ad primarium morbum, in idiopathico ad topicum malum est respiciendum. Si a bile caustica erysipelas proficiscitur, cauendum est, ne peruersa medela in dysenteriam malignam abeat. Tutissima remedia ex cornu cerui vsto in erysipelate petuntur, quo cum rob sambuci coniuncto, aduersus illud domesticum habetur remedium et lumbricis vere inimicum est.

p. 189. Praemissa febre accessoria inflammatoria, vbi potissimum aphtharum distinctionem in veras et symptomaticas Cl. Auctor vrget, mucoso verminosam
gravi-

gravidarum et puerperii accessoriam persequitur febrim. Verminosa causa in gravidis anxietates praecordiorum insignes et diurnas, vteri tantos spasmos, tantamque orificii vterini dilatationem, ut magna aquarum copia emitteretur, insolitam mammarum intumescantiam, epilepticos insultus, ut risum involuntarium, aphthas, imo abortum, in puerperis metastases ad caput effecit, lactis secretionem et vterinas euacuationes cum imminuit, tum prorsus impediuit et fluorem alui induxit. Ac miratur profecto Noster, lactis repulsionum in sanguinem, a causa verminosa profectarum, tam raro ab Auctoribus mentionem esse factam, cum nullibi crebriores, quam in puerperis, verminosa labe laborantibus, deprehendantur.

Quemadmodum pleuritis et peripneumonia p. 231. magna gaudent diuersitate, quae partim ab aegrorum, qui afficiuntur, varietate, partim tempestatum vicissitudine, ut pleuritis vernalis atque aestiua, constitutione porro epidemica et sporadica proficiscitur, sic saepenumero ambarum quoque causa latet in primis viis, ideoque a vermibus, ibi morantibus, oriri posse has, nec tum pulsus explorationem, nec solas vasorum inanitiones sufficere, sed oculorum, linguae et vrinae rationem simul esse habendam, Noster arbitratur. Atque tum potissimum laudat Cl. Auctor oxymel scilliticum, antimonium diaphoreticum, cum sale suo stibiaturum, nec non kermes minerale, quippe quo in primis tam expectorationem promouendo, quam vermes expellendo insigni cum fructu usus est in his morbis. In quibus praefert decocta saturata radicum aperientium, foeniculi, leuistici, petroselini, parietariae cum salibus mediis manna aut syrupo cichorei cum rheo, purgantibus fortioribus, nisi perturbatio encephali metastatica fortiora exigit.

Tam

p. 287. Iam ad symptomata nonnulla, indiscriminatim cum acutos, tum chronicos verminantium morbos comitantia, progreditur. Horum plurima suis iam iam locis in antecedentibus sunt exposita, inter quae potissimum referuntur febrium typi inconstantes, vicissim alternantes, seu duplicatis paroxysmis accedentes, sudores copiosi, colliquatiui raro critici, aphthae, exanthemata ferina, haemorrhagiae spontaneae, variarum partium dolores acerbissimi et spastici. Hic autem inprimis considerat Cl. Auctor capitis dolorem, primarum viarum degeneraciones, urinae phaenomena, stranguriam et visus obnubilationem. Ventriculi cruditatibus, nausea, ructibus et vomitu omnino consideratis, ad alui fluxum verminantium Noster deuenit.

p. 303. Atque hic suadet diuersitati dysenteriae, quae vel est mucosa, vel biliosa, vel verminosa, vel cruenta accommodare medicamenta, nec cum HIPPOCRATE alui recrementum glutinosum, sincerum aut album in verminosis morbis esse pertimescendum monet, cum plerumque interitum vermium eorumque nidi destructionem denotet.

p. 321. Urina verminantium interdum est lactea, turbida, limosa aut iumentacea, incocti quid geniturae similis continens. Atque hic cortex Peruvianus conuenit. Alii stranguria afficiuntur verminosa, in qua ad ventris cruciatus et primarum viarum saburram attendere oportet.

p. 340. Quod attinet ad medicamenta anthelmintica, quorum plurima iam in superioribus, cum morbos verminosos pertractaremus, a nobis sunt commemorata, in vniuersum monet Cl. Auctor, non esse singulari formulae nimis fidendum, eaque omnibus omnino morbis verminosis medendum. Nimirum enim est eorum diuersitas; non simplex igitur medi-

medicamentum, sed varia postulant remedia, aegroto eiusque aetati, sexui, vitae generi, idiosyncrasiae, anni temporibus et tempestatum vicissitudinibus, quid, quod morbis epidemice grassantibus, accommodata. Mercurium dulcem, quod saepenumero pauca modo grana excitarunt salivationem, et decoctum mercurii viui, vt medicamenta anthelmintica, non laudat. Oleosorum quoque adhibendorum ratio est habenda, in aluinis potissimum doloribus et spasmis. Inde et veteres oleum oliuarum cum succo granatorum, ad vermes expellendos cum fructu exhibuerunt. In morbis acutis corticem et acida mineralia simul adhibuit, nec non vesicatoria, venaesectionem, mittimus alia, vt in pleuritide et peripneumonia verminosa. Aliis ac inprimis, si simul cum vermibus bilis corrupta aderat, extracta amara, gummata ferulacea, praecipue asam foetidam, cum aloë aliisque purgantibus, coniuncta dedit. Nec morem illum vituperat Noster, vbi magnam aquae frigidae copiam propinant iis, qui fortiora assumerunt purgantia, idque et tum suadet meliori profecto cum fructu ac securius, vti Nostro videtur, cum aquae mercuriales, vel alia metalla sunt exhibita, modo viscerum status sit integer et fiat hoc omni, qua par est, attentione medici. Nec externa, quae ad vermes enecandos et expellendos applicantur, prorsus reiicit. Quin rusticum remedium, ieiuno ventriculo radices dauci vulgaris ingerendi, non omni anthelmintica virtute est destitutum et nonnullis infantibus salutare.

Dum quorundam verminantium symptomatum p. 354. rationem Noster persequitur, arbitratur, plerorumque verminantium symptomata in secretorum humorum deprauatorum copia ac viscerum secernentium vitiata structura atque partium sensibilibus irritabilibusque a vermibus affectione esse quaerenda. In genere Cl. Auctor vniuersum corpus animatum

matum supponit, et cum praecipua sensus ac motus organa nervi, eorumque mirae sint conspirationes, ad eos potissimum respicit, ac inprimis quidem nervum magnum sympatheticum seu intercostalem considerat. Variis scriptis, ad hunc nervum pertinentibus, eiusque principium aequae spectantibus, ac totam controuersiam, de hoc nervo eiusque origine inter eruditos ortam, nominatis, veram eius originem monstrat atque variam eius cum capite, ac potissimum oculis connexionem, partim aliorum, magna cum studii assiduitate a Nostro collectorum, partim suis experimentis roborat. Ex hoc itaque nervorum consensu varia verminosa symptomata, ut capitis dolorem, visus obnubilationem, oculorum mutationes, aurium tinnitus, surditatem, aphoniam, salivationem, gingivarum ardorem, maxillae inferioris motus tetanicos, singultus, respirationem oppressam, cordis palpitantes, pulsus mutationes, anxietates, dolores inter scapulas, convulsiones per totum corpus cet. exponit.

p. 378. Tandem quaedam ad verminantium diagnosis spectantia, addit Cl. Auctor. Non semper omnibus opus est signis verminosis, cum pauca aliquando rem prodant verminosam. Sola enim saepenumero sufficit pupillae dilatatio in obambulantibus, vel linguae symptomata et vomantia in acutis morbis ad verminosam diagnosis stabilendam et confirmandam. Porro in infantibus solummodo terror in somno et oculorum palpebrarumque phaenomena manifestant animatam potentiam. Quamquam tandem Cl. Auctor non inficias it, nervorum pariter, ac vasorum interdum esse lusum, tamen non retur, singularis rami nervosi aberrationem posse impedire, quominus omnimodus nervorum consensus et tanta, quanta, nervi intercostalis ope, est cum quinto, sexto, septimo, octavo nonoque nervorum pari cumque cerui-

cervicalibus, phrenico, brachialibus, thoracis ac abdominis plexibus peculiaribus communicatio penitus tollatur, ideoque ipsi Auctori multa verminosa symptomata ex hoc nervorum consensu, iure meritoque posse et debere explicari, stabiliri ac confirmari videntur.

III.

The works of ROBERT WHYTT, M.D. late Physician to his Majesty, President of the royal College of Physicians, Professor of Medicine in the University of Edinburgh, and Fellow of the royal Society. Published by his Son. Edinburgh. Printed for T. Becket, and P. A. de Hondt London, and J. Balfour Edinburgh. 1768. in 4. alph. 4. pl. 7.

i. e.

Opera ROBERTI WHYTT, M.D. edita a filio.

Continet haec collectio omnia opera Cel. WHYT-
TII, cuius obitum alio loco indicauimus *), iam
antea edita et opusculo inedito *de hydrope cerebri in-
terno* aucta. Prodiit ea curante filio, et Cel. PRIN-
GLE ob singularia eius in hanc editionem operum
amici merita dedicata est **).

I. Primum scriptorum, quae in hac editione p. I.
comprehenduntur, est *commentarius de vitalibus et
aliis*

*) vid. Comment. nostr. Vol. XIII. p. 533.

**) Scripta Cel. WHYTII, quae ad praxin medicam
spectant, in Germanicam linguam translata et passim
variis annotationibus aucta, prodierunt Lipsiae hoc ipso
anno apud Casp. Fritschium sub titulo: ROBERT
WHYTTS *sämmtliche zur practischen Arzneykunst
gehörige Schriften, aus dem Englischen nach der neuesten
Ausgabe übersetzt, in 8 mai.*

*aliis inuoluntariis motibus in animalibus. De hoc commentario, qui primum anno 1755 et deinde an. 1763 editus est, iam alio loco ad Lectores retulimus *).*

p. 209. 2 et 3. *Tentamina physiologica, quae continent 1) disquisitionem caussarum, quae circulationem fluidorum in*

p. 255. *vasis animalium minimis promouent. 2) Observationes de sensibilitate et irritabilitate partium corporis humani aliorumque animalium, occasione nuperi scripti Ill. DE HALLER circa hanc rem. Prima editio prodiit anno 1755, secunda 1759, tertia 1761 et quarta 1766, de qua alio loco diximus **).*

p. 304. 4) *Relatio de nonnullis experimentis cum opio in viuis et morientibus animalibus factis. Primum prodiit in Edinb. phys. and literary essays Vol. II. p. 280 ***).*

p. 329. 5) *Commentarius de viribus aquae calcis et saponis in calculi curatione. Haec primum in Edinb. phys. and lit. essays publicata, aliquoties deinde seorsim impressa (1752, 1754, 1761) pluribusque observationibus et annotationibus aucta, hic sistitur ****).*

p. 431. 6) *Appendix ad hunc commentarium, continens historias morborum Ill. H. WALPOLE, S. V. NEWCOME, Cl. W. HAY, L. TREVIGAR cet. *****).*

p. 467. 7) *Commentarius de varia vi variarum specierum aquae calcis viuae *****).*

p. 477. 8) *Cel. PRINGLE epistola ad Cl. TH. BIRCH cum literis Cel. WHYT, quae nonnullas annotationes ad commentarium de aqua calcis viuae continent *****).*

9) *Ob-*

*) vid. Comment. nostr. Vol. I. p. 589.

**) ibid. Vol. XIII. p. 277.

**) ibid. Vol. VII. p. 87.

****) ibid. Vol. IV. p. 611.

*****) vid. Phil. transact. Vol. L. P. I. p. 209. Comment. nostr. Vol. IX. p. 681.

*****) vid. Edinb. phys. and literary essays. Vol. I. p. 372. Comment. nostr. Vol. V. p. 67.

******) vid. Phil. transact. Vol. L. P. I. Comm. nostr. Vol. IX. p. 691.

9) *Observationes de vi lithontriptica thermarum Carolinarum, aquae calcis viuae et saponis*, in litteris Cl. Auctoris ad Cel. PRINGLE *). *Observationibus his, vti loco inferius memorato iam monuimus, Cl. Auctor respondet ad commentationem Cl. PRINGSFELD de praerogatiua thermarum Carolinarum in dissoluendo calculo vesicae prae aqua calcis viuae, quae Lipsiae a. 1756. in quarto edita est **).*

10) *Observatio de virtute medica vis electricae in Paralyfi*. Haec a Cl. BRYDONE Cl. Auctori tractata, ab eo cum Societate Regia communicata est ***).

11) *Observationes de natura, causis et curatione Morborum neruorum*, de quo eleganti opere, cuius tres editiones a. 1764. 1765. et 1767 vulgatae sunt, fusius alio loco exposuimus ****).

12) *Observationes de singulari vi vesicatoriorum Pulsus celeritatem in tussi cum infarctu pulmonum et febre coniuncta minuendi *****).*

13) *Observationes de hydropo cerebri*. Disputat P. 723. Cl. Auctor imprimis de ea hydropis cerebri interni specie, cuius sedes in ventriculis cerebri lateribus reperitur, quae omnium maxime frequens et periculosa est, licet pauci scriptores eam cognouerint. Quae enim HIPPOCRATES (de morbis. II. cap. 6.) habet, ad eam hydrocephali speciem, a quo aquae inter duram matrem et cerebrum effluunt, pertinent, cum caput ad cerebrum usque perforare et aquam emittere iubeat. Inter recentiores primum MERCURIALIS hydropis ventriculorum mentionem facit, PETITUS vero (Mem. de l'A-

*) vid. Phil. transact. l. c. et Comm. nostr. l. c.

**) vid. Comm. nostr. Vol. V. p. 539.

***) vid. Phil. transact. l. c. et Comm. nostr. l. c.

****) vid. Comm. nostr. Vol. XIV. p. 100. seq.

*****) vid. Philos. transact. Vol. L. P. II. p. 569. et Comm. nostr. Vol. X. p. 137.

de l'Acad. de Paris 1718. p. 118.) fusius hydropem hunc describit et symptomata commemorat, quae in eiusmodi aegris obseruari solent; quam vero descriptionem minus completam esse, nec ex signis hic adductis diagnosin eiusmodi hydropis formari posse, Cl. Auctor asserit. Suturarum cranii in hydrope secessus rarissime accidit, nec vnquam ab hac specie Cl. Auctor magnitudinem capitis auctam vidit. Hinc alia signa addit, omnemque morbi decursum in tria stadia distinguit, singulorumque stadiorum symptomata fusius describit, ex viginti et ultra aegris sedulo collecta.

p. 729. In pueris hydrocephalo interno obnoxiiis quatuor sex vel plures septimanas ante mortem sequentia obseruantur symptomata. Appetitus ciborum minuitur, languent et tabidi fiunt, simulque febre laborant anomala aut lenta, pulsu non pleno, sed debili. Vexantur siti et quotidie fere semel vel bis vomitum experiuntur. Duos tamen Cl. Auctor vidit aegros, in quibus vomitus non aderat. Conqueruntur de dolore in vertice vel fronte. Aluus vt plurimum obstructa est, nec facile purganti remedio mouetur, nonnulli tamen diarrhoea nonnunquam laborant. Animus deiectus est, fereque semper in lecto cubant, licet minime soporosi sint, sed raro dormiant. Lucem abhorrent, sique candela accensa oculis admouetur, de dolore conqueruntur. Digitos saepe naribus admouent, et dentibus strident, vti infantes, qui vermibus laborant, saepius facere solent; vt itaque difficulter in hoc stadio morbus hic a lenta febre, quae a vermibus vel vitio viscerum aut alia caussa oritur, distingui queat.

p. 730. Secundi stadii initium Cl. Auctor ibi ponit, vbi pulsus, qui antea celer, sed aequalis et regularis erat, tardus, inaequalis et irregularis fieri incipit; quod, vt plurimum, tres septimanas, vel quatuordecim

cim dies ante mortem accidit. Pulsus tarditas saepius maior est, quam in sanis esse solet. Symptomata recensita persistunt, sed circa finem periodi huius aegri soporosi fiunt. Suspiria saepius edunt, licet de nullo peculiari dolore conquerantur. Oculi introrsum vel extrorsum conuersi sunt, et nonnunquam aegri obiecta duplicia vident. Nonnulli circa finem periodi huius delirare incipiunt. In aliis vermes eiiciuntur, qua tamen re symptomata minime leuantur. Vrina multum variat; halitus foetet.

In tertia periodo pulsus celeritas iterum ad 130 p. 732. pulsus in minuto primo augetur et ille simul regularis fit, quod quinque, sex vel septem dies ante aegri obitum obseruatur. Simul aegri soporosi fiunt, palpebrae vel vna tantum earum paralyfi afficiuntur, et pupilla vim se contrahendi perdit atque dilatata manet. Vidit tamen Cel. Auctor nonnullos aegros, in quibus ex debilissima tantum irritatione, v. c. ex usu aquae cinnamomi vel spiritu volatili naribus adnoto pupilla dilatabatur. Ante mortem vt plurimum in his aegris motus conuulsiui vel spastici obseruantur, et calor vnam vel alteram genam occupat. Qui antea aluo obstructa laborabant, nunc diarrhoeam experiuntur. Leuiora symptomata et varietates, a Cel. Auctore in variis aegris obseruatas, omittimus.

In omnibus aegris, quos dissecauit, aquam in p. 734. ventriculis anterioribus et nonnunquam etiam in tertio vel quarto ventriculo reperit. Vno ventriculo aqua distento, parua tantum copia in altero aderat. Copia huius aquae, vt plurimum, duas ad quinque vsque vncias aequabat. Semel tamen octo vnciae repertae sunt. Aqua haec non, vt pericardii liquor vel paracentesi educta aqua, calore coagula-

tur *), cum arteriae cerebri exhalantes vasis exhalantibus aliarum partium longe minores sint.

p. 735. Ex omnibus tandem symptomatibus hic descriptis Cel. Auctor signa colligit, quibus morbus hic veteribus incognitus et a recentioribus neglectus dignosci possit. Haec praecipue in pulsu posita sunt, qui primum celer et aequalis, deinde vero tardus et inaequalis est, tandemque iterum celer et aequalis fit; quod nec in febre a vermibus, nec febre ab obstructione glandularum mesenterii orta, observatur. In aliis quoque morbis v. c. cephalalgia, doloribus colicis, spasticis etc. pulsus inaequalis quidem et tardus est, sed cutis non calet, nec sitis aegrum vexat.

p. 738. Causas deinde hydropis huius Cl. Auctor examinat, docetque, vel laxitatem vasorum cerebri, vel laesionem et compressionem cerebri in partu, vel indurationem glandulae pituitariae aut alius partis cerebri ventriculis vicinae, vel nimiam sanguinis tenuitatem, vel urinae suppressionem, aquae in cerebri ventriculis contentae copiam morbose augere posse.

p. 740. His expositis, Cl. Auctor symptomata superius descripta, quae fere omnia ex compressione cerebri ab aquarum copia oriuntur, fusius physiologice et pathologice explicat; quae tamen, brevitatis studiosi, licet lectu dignissima sint, omittimus, tandemque

p. 744. ad morbi curationem accedit. Si morbi huius praesentia statim in initio, aquarum copia nondum aucta, dignosci posset, purgantibus, diureticis, vesicatoriis, frictione, corporis exercitatione et diaeta ulterius morbi progressus certe impediri posset. Cum vero tum demum eum cognoscamus, ubi aquae pressione cere-

*) Haec etiam Cel. DE HAEN est observatio vid. *rat. medendi* Vol. IV. c. 6. et Ill. MORGAGNI *de sedibus et causis morborum* Ep. IV. §. 2. ex observationibus VALSALVAE. Putat tamen Ill. HALLERUS omnino coagulari (*Elem. Phys.* T. IV. p. 45.) et, si non coagulatur, semper putredine iam resolutam esse.

cerebri actio laeditur, parum ab omnibus remediis sperare licet. Purgantia enim et diuretica, quae in aliis hydropis speciebus vtilissima sunt, hic ob cerebri ab abdomine distantiam, motum fluidorum per cerebri vasa languidum et resorptionem fluidi a compressione parietum ventriculorum impeditam, nullum auxilium ferre possunt. Paracentesis vero non institui posse patet. Hinc Cl. WHYTTER libere fatetur, se nullum aegrorum, hoc morbo affectorum, curasse, licet purgantia ex rhabarbaro et ialappa cum calomel, errhina et vesicatoria, quae in secundo stadio symptomata leuant adhibuerit, putatque illos aegros, quos alii se curasse crediderunt, non hydropice cerebri, sed alio morbo laborasse.

14) Appendicis loco adduntur 1) *relatio de p. 747. morbo epidemico Edinburgi et aliis in locis Scotiae australis autumnis 1758 saeuientis **).

15) 2) *Excerpta ex variis litteris Auctoris Cl. p. 749. ad Cl. PRINGLE, quibus usus mercurii sublimati in cura ulcerum phagedaenicorum declaratur ***).

Sufficiat annotasse desiderari in hac editione operum Cel. WHYTTER: 1) *Commentarium de differentia respirationis atque motus cordis inter homines dormientes atque vigilantes, qui in Edinb. Ess. Vol. I. p. 436. continetur ****), quem vero Cel. Auctor commentario de motibus vitalibus (p. 178 – 183) inseruit. 2) *Descriptionem matricis siue ovarii buccini ampullati, quae Vol. II. Edinb. Ess. p. 8. inserta est *****), et quam Cl. Editorem, cum nullas ad rem medicam pertinentes observationes contineat, studio omisisse coniicimus. Desideratur quoque figura

P 3

qua

*) vid. London. Medie. Observat. and inquiries Vol. II. p. 187. et Comment. nostr. Vol. XII. p. 454.

**) ibid. p. 213. et ibid. Vol. XII. p. 455.

***) vid. Comment. nostr. Vol. V. p. 77. et 455.

****) ibid. Vol. VII. p. 69.

qua calculus in vesica repertus delineatur, quae ad
commentarium de vi aquae calcis contra calculum vesti-
cae pertinet.

IV.

*Neues systematisches Conchylien-Cabinet, geordnet
und beschrieben von FRIEDRICH HEINRICH
WILHELM MARTINI, der Arzneygelahrt-
heit Doctor und approbirter Practicus in Berlin,
und unter dessen Aufsicht nach der Natur gezeich-
net und mit lebendigen Farben erleuchtet. Erster
Band. Mit Approbation und unter der Prote-
ction der Königl. Preussischen Academie der Wis-
sensschaften. Nürnberg bey G. N. Raspe. 1769.
4. Alph. 2. pl. 12. tab. aen. 31. et tab. 16. mi-
nores.*

i. c.

**Nouum et systematicum museum conchylio-
rum dispositum et descriptum a FRIEDERICO
HENRICO GUILIELMO MARTINI, M. D.
et sub eius inspectione ad naturam delineatum
viuisque coloribus illustratum. Volumen pri-
mum cum approbatione et sub auspiciis Aca-
demiae Regiae Borussicae.**

Magna profecto cum voluptate, nec minore cum
desiderio etiam reliquas eius partes quam pro-
xime videndi, hoc, quod iam indicamus opus, perle-
gimus. Etenim illud non Auctori Cl. solum, sed pa-
triae quoque vniuersae eximio honori, omnibusque
qui systematicam conchyliorum notitiam sibi com-
parare cupiunt, maxime proficuum fore iudicamus
Consilium vero Cl. MARTINI illud fuit, vt testa-
ceorum

ceorum, quotquot vel ipse viderat vel ab aliis Aucto-
ribus descripta et depicta cognouerat, collectionem
curaret talem, cui nihil deesset. Cui consilio vt fa-
cileret, operam dedit, vt omnia ad naturam vel se-
cundum figuras ab aliis Auctoribus, optimis quibus-
que, datas depingerentur, et viuis coloribus illustra-
rentur. Vfus propterea est arte Cl. HAPPE picto-
ris Berolinensis, atque isto modo vno hoc opere col-
lecta proposuit, quaecunque ex tam multis iisque
saepe rarissimis et pretiosissimis operibus, non sine
multo labore temporisque iactura, antea conquiren-
da erant. Quantopere vero, suscepto hoc opere,
conchyologicum studium discentibus leuatum, eius-
que incrementa in vniuersum sint promota, cuique
facile patet; siquidem quae nondum descripta pas-
sim in museis lateant, vel ex remotissima quaque re-
gione noua aduehantur, facile nunc addi et ad sua ge-
nera referri, hac data opportunitate, possunt. Atque
i ipsi, qui testacea conquirendi occasione destituun-
tur, museo hoc solo plenariam conchyliorum
omnium cognitionem leui labore acquirere pote-
runt. Vfus autem est in hac re Cl. Auctor non pro-
prio tantum museo, sed et variis instructissimis aliis;
et praeter haec omnia, quae in LISTERI, GUAL-
TIERII, SEBAE, BONANI, RUMPHII, KLEI-
NII, PLANCI, LESSERI, ADANSONII, D'AR-
GENVILLE, DAVILA *), GEVE **), KNOR-
RII ***), REGENFUSII cet. operibus reperiun-
tur,

P 4

*) *Catalogue systematique et raisonné des curiosités de la nature et de l'art, qui composent le Cabinet de Mr. DAVILA* 3. Vol. à Paris. 1767. 8. c. fig. aen.

**) Est pictor Hamburgensis, qui testacea varia aeri in-
cisa et viuis coloribus distincta dedit, sub titulo: *Mo-
natbliche Belustigungen im Reiche der Natur.* Hamb.
1755.

***) *Vergnügen der Augen und des Gemüthes in Vorstel-
lung*

tur, incredibili cum studio congeffit. Nec species modo singulas, sed et plures varietates, nec non testacea arte v. c. politura mutata, hic passim nobis exhibentur, ne noua aliquis putet, quae fraude tantum mutata sunt. Nihilominus tamen Cl. Auctor ipse impossibile esse fatetur, vt omnes nostro aeuo cognitae species testaceorum marinorum hoc opere exhibeantur, et ob eam rem supplementum et spicilegium eorum, quae in museis latent, proxime se editurum promittit, omnesque, qui testacea in hoc libro non descripta possident, rogat, vt ea beneuole communicent. De iis etiam conchis, quae in aquis dulcibus habitant, singulari opere acturum se esse promittit, quod vltimam partem maioris operis constituet. Spem quoque facit edendae philosophiae conchyologicae, in qua singulares de conchyliis quaestiones tractabuntur, veluti de systematibus eorum cet.

In ipsa concharum descriptione non testas tantum seu exuuias animalis describit, sed quae ad nostra vsque tempora de vermibus notata sunt, qui in iis habitant, ex optimis Auctoribus ADANSONIO et D'ARGENVILLE collegit, eaque ipsa animalia internamque testarum structuram depingendam curauit. Testacea omnia ad ductum proprii systematis disposuit, secundum externam eorum formam, atque ea genera, quae habitu et forma conueniunt, serie quoque et ordine arctius connectit. Singulis descriptionibus character testae descriptae latina pariter atque germanica lingua praeponitur, quem excipiunt synonyma Auctorum et nomina triuialia latina, gallica, belgica et germanica.

Pri-

lung einer allgemeinen Sammlung von Muscheln und andern Geschöpfen, welche im Meer gefunden werden.
Nürnberg. 1757 — 66. Vol. I. II. c. fig. viuis color pictis.

Primum hoc volumen tubulos marinos omnis generis, patellas, aures marinas, nautilos, bullas et porcellanas tantum comprehendit, in quorum numero species variae nouae pluresque, vti iam superius monuimus, varietates occurrunt. Iam vero vt Lectores nostri de systematico ordine Cl. Auctoris, iisque capitibus, in quibus ille a Linnaeano aliisque systematibus discedit, iudicium facere queant, sequentem apposuiimus systematis Cl. MARTINI, quantum eius quidem insertum est huic tomo, tabulam, in qua species, quae in Linnaeano systemate reperiuntur, triuialibus nominibus Linnaeanis notauimus, aliasque, quae in eo desiderantur et notatu videbantur digniores, aliorum Auctorum nominibus adduximus.

Classis prima: Testae vniualues.

Ordo I. testae non turbinatae.

Sect. A. *testae fistulosae seu tubulosae.*

Genus I. (*Caput I.*) Tubuli conici cauita-P. I.
te continua.

α. laeues, (*antales*): *Dentalium entalis*, *D. politum*, *D. eburneum*.

β. striati et angulati (*Dentales*): *D. elephantinum*, *D. aprinum*.

γ. polythalamii: *Nautilus raphanistrum*, *N. fascia*, *N. legumen*, *N. siphunculus* *), *N. radícula*, *N. obliquus* **).

P 5

Genus

*) Hunc nucleum maioris tubuli esse Cl. Auctor probat (p. 38).

**) Ad hoc genus orthoceratites petrificati pertinent, quorum eotypus adhuc incognitus est. Cl. Auctor refert (p. 5.) se orthoceratitem duplici siphone instructum vidisse, sed in praefatione hoc ita emendat, vt doceat, duplicem siphonem in omnibus orthoceratitibus apparere, si secundum longitudinem et oblique simul difsecantur et politura subiiciantur.

p. 40.

Genus 2. tubuli vermiculares.

α. testacei.

a) solitarii: *Serpula polythalamia*, *S. penis*, *Solen ocreatus* KLEINII, *Solen clibaniformis* EIUSD., *Solen corrugatus* omnium maximus EIUSD., *Serpula lumbricalis*, *S. anguina*, *S. arenaria*, *S. spirillum*, *S. spirorbis*, *S. vermicularis*, *S. semilunium* etc.

b) conglomerati 1. recti: *Tubipora musica* *).
2. inordinate dispositi: *S. glomerata*, *S. contortuplicata*, *S. triquetra*.

β. arenosi seu *Sabellae*: *Sabella granulata*.

γ. ex arena et concharum fragmentis confecti: *Sabella chrysodon*, *S. alveolata*.

δ. coriacei: *Penicillum* GUALTIERII, *Sabella penicillus*.

Secl. B. *Patellae* seu *lepadēs*.

p. 77.

Genus 1. et unicum: *Lepas*. (Cap. II.).

α. vertice integro.

a) conicae v. c. *Patella vulgata*, *P. verna*, noua species, *P. infundibulum* magellanicum Auctoris.

b) ouatae depressae, v. c. *P. quam le parasol chinensis* Cl. DAVILA vocat **), *P. testudinaria*, *P. mammillaris*.

c) margine inaequali v. c. *P. mitra lugubris*, noua species, *P. granularis*, *P. sachalinensis*.

*) Hanc omnes fere alii Auctores ad zoophyta (vid. PALLAS elench. zooph. p. 337. et Comm. nostr. Vol. XV. p. 161.) referunt. Forma vero et adhaesio ad scopulos Cl. Auctorem permouerunt vt tubulis annumeraret.

**) Cl. Auctor hanc speciem ipse non vidit; alii, vti ex praefatione cognoscimus, putarunt, squamam tantum maioris cuiusdam piscis esse.

chanaria, *P. granatina*, *P. laciniosa*, *P. oculus hirci* Auctoris etc.

β. vertice perforato. v. c. *P. nimbosa*, *P. graeca*.

γ. vertice adunco cauitate simplici v. c. *P. hungarica*, *P. fissura* etc.

δ. semi-concameratae seu stilo interno donatae: *P. equestris*, *P. chinensis*.

ε. concameratae vertice rostrato marginali *P. porcellana*, *P. crepidula* *), *P. fornicata*, *P. neritoidea* siue *valuata*.

Ordo II. univaluia turbinata.

p. 163.

Lib. I. spira occulta vel parum exerta ore longo patulo vel rima longa angusta.

Sect. A. *cochlides ellipticae*.

Genus 1. *aures marinae* (Caput III).

α. perforatae latiores: *Haliotis midae*, *H. parva*, *H. striata*, *H. marmorata parva*, *H. varia*, *H. tuberculata*, etc.

β. oblongae angustae: *H. asinina*.

γ. imperforatae: *Patella lutea* **), quam Cl. MARTINI *auriculam muris* vocat.

Genus 2. *Catini lactei* (*Milchnaepfe*. Cap. 194. put IV). Hoc genere comprehenditur tantum vnica species: *Helix haliotoidea*.

Sect. B. *cochlides planae intortae spiris vel occultis vel conspicuis*.

Genus

*) Hanc omnino patellis labiatis, nec, vti in duodecima editione systematis Linnaeani factum est, patellis basi dentatis annumerari debere, Cl. Auctor asserit.

**) Hanc, quam LINNAEUS ob foraminum defectum ad patellas retulit, Cl. Auctor haliotidibus adnumerat, cum in omnibus aliis proprietatibus cum reliquis speciebus huius generis conueniat.

- p. 198. Genus 1. *Nautili* *), (Caput V.)
 α. papyracei non tabulati siue vacui: *Argonauta argo*, *A. cymbium*.
 β. crassi concamerati: *Nautilus pompilio*,
N. calcar, *N. crispus*.
- p. 154. Genus 2. polythalamii teretes, (Caput VI.)
 α. spiris proxime se tangentibus, *Cornua ammonis vera*. *Nautilus BECCARII*.
 β. spiris a se inuicem remotis: *Nautilus spirula*.
 γ. apice tantum spirali: *litui* et *semi-litui*.
- p. 266. Sect. C. *Cochlides volutatae*, seu ex vno latere in gyros latentes intortae, ore testae longitudinem vel superante vel aequante
 Genus 1. *volutatae subouatae*: *Bullae*,
Oua. (Cap. VII.)
 α. parum ventricosae in gyros incompletos collectae: *Nux marina*
 GUALTIERII an *bulla aperta*
 LINN.?
 β. ventricosae umbilicatae oris labio externo simplici: *Bulla ampulla*, *B. lignaria*, *B. physis*, *B. naucum*.
 γ. per-

*) De usu siphonis in nautilo Cl. Auctori (p. 109.) ea sententia maxime arridet, quam anonymus in *Gentleman's Mag.* mens. ian. 1752 proposuit. (vid. *Comment. nostr.* Vol. I. p. 502. seq.): tubum scilicet seu siphonem, dum nautilus viuit, flexilem esse et elasticum, dilatationis aequae, ac contractionis capacem, pro diuersis necessitatibus, quas animal requirit; forte eandem habere vtilitatem, ac vesica natatoria in piscibus, et animal eodem forte vti mechanismo, vt constringatur et expandatur; aërem exinde distribui per diuersas cameras et centrum grauitatis mutari, prout instituendus motus illud requirat. Quod certe tam facile fieri non posset, si aër in singulae camerae fuerit admissus cavitatem, deficiente hoc adiumento. Sententia haec vltcrius confirmatur ex nautilorum fossilium consideratione *ibid.* 1752. p. 301. *Comm. nostr.* Vol. II. p. 346.

γ. perfectae veneroides non umbilicatae: *Bulla ouum*, *B. gibbosa*, *B. spelta*, *B. volva*, (*Weberspühle*, quae inter testacea rarissima refertur).

Genus 2. volutatae ouatae, rima angusta vtrin- p. 302.
que dentata: *Porcellanae*. (Cap. VIII).

α. simplices vel non fimbriatae conglobatae et crassae. *Bulla verrucosa*, *Cypraea mas*, *C. zickzack*, *C. vitellus*, *C. lynx*, *C. tigris*, *C. annulus*, *C. globulus*, *C. cicercula*, *C. mappa*.

β. spirales leues siue tenues: *C. amethystea* etc.

γ. pyriformes simplices. vid. GUALTIERIUM tab. XIV. E et tab. XV. N.

δ. longae et angustae: *C. testudinaria*, *C. talpa*, *C. isabella*, *Ouum casuarii* RUMPHII, *C. asellus*, *C. hirundo*, *C. argus* et varietates, *C. carneola*, *C. exanthema*.

ε. in vno tantum latere fimbriatae: *C. stolidi*, *C. caurica*, *C. pediculus*.

ζ. in utroque latere fimbriatae: *C. nucleus*, *C. staphylea*, *C. lurida*, *C. caput serpentis*, *C. onyx*, *C. mauritiana*, *C. erosa*, *C. poraria*, *C. arabica*, *C. ocellata*, *C. cribraria*, *C. moneta*.

V.

De vermibus in lepra obuiis iuncta leprosi historia et de lumbricorum fetis obseruationes regiae societati scientiarum Gottingensi praelectae cum figuris aeneis. Auctore IO ANNE ANDREA MURRAY. Gottingae impensis Io. Christ. Dietrich. 1769. 8. pl. 6 c. tab. aen. 2.

Quamquam hi duo commentarii regiae Scientiarum Societati Gottingensi non vno eodemque tempore sunt praelecti, tamen ob argumenti similitudinem coniunctim a Cl. MURRAY sunt editi. In primis cum contigerit Nostro, beneuolentia Cl. VOGEL, aegrum, Graecorum elephantiasi seu Arabum lepra affectum, videre, indeque has obseruationes de vermibus in lepra obuiis ditare. Additas de lumbricorum fetis, in quibus potissimum earum mobilitas spectatur, ideo attentione dignas reputat Noster, quod Auctores, qui contra Ill. LINNAEUM intestinales lumbricos aculeis instructos esse negent, ad assentiendum proniores reddi possint.

p. 3. Nomine leprae siue elephantiasis disquisito, notitas horum vermium describit; quibus cum vermibus in oue detectis, comparatis, vtriusque discrepantiam ostendit, ac quaedam de genere horum animalculorum et vermium larvarumque distinctione addit.

p. 15. Vermes vero, a Cl. Auctore obseruati, ex undecim annulis et antica acuta parte vncino deorsum flexo armata constabant. Maximi eorum dimidium pollicem aequabant. Color griseus erat praetereaque duo stigmata et canales aeriferi, nec non pedes inter

inter quoduis articulorum par conspiciebantur. Similes iis erant vermes in spurcitie pavimenti reperi, in ouino autem cadauere deprehenso colore cet. et vncinis duobus ab iis differebant. Posteriores. Auctor larvas *muscae carnariae* LINNAEI esse demonstrat. De prioribus vero dubius adhuc est. Putat tamen larvas fuisse *muscae domesticae* LINNAEI, quarum magna copia ad lectum aegroti aduolabat.

Harum muscarum ortu et celeri incremento P. 29. memoratis, duplex omnino statuendum esse vermium genus in morbis, in quorum vno causam morbi, in altero effectus eius ponit, arbitratur Noter, Auctoresque, ad vermes in variis exanthematis morbis respicientes, inter quos monumenta veterum hac de re posteritati relicta desiderat, memorat, et ROLANDRI, qui *muscae leprae* ideo dictae, tribuit elephantiasin nigritarum, mentionem facit. Figurae additae vermes aegri et vermes in oue reertos in variis partibus sistunt.

Haec sequitur historia leprae, in qua hi vermes P. 45. apparuerunt. Initium huius morbi impetigo faciebat, quae cessabat et redibat. Tum methodo medici imprudenti adhibita, vbi potissimum mercurialia, usque ad saluationem propinata, valde noxia erant, tanta hoc malum nanciscebatur incrementa, et foetidissima vlcera totum corpus occuparent et teterrimus ille morbus, leprae nomine notus, naceretur. In facie nimirum erant rotunda, eminentia, fusca tubercula, quae nasi pinnas, labium superius et mentum foedabant; in pectore diuersae magnitudinis partim rubentia, partim nigricantia. Maxima et teterrima, nec non margine inflammato cincta, colore liuido praedita ichoreque pellucido, interdum vero pure, impleta erant tubercula in manibus et brachiis. Adhuc plus ichoris et puris effluebat

fluebat ex vlceribus pedum, insigniter tumentium et peponem fere referentium. Atque sic, praesertim medicamentis, quae iam recensere volumus, adhibitis, totum corpus, ne capillatis quidem eius partibus exceptis, scatebat efflorescentiis cum insigni pruritu, dolore et foetore.

p. 52. Viperas, in hoc morbo iam laudatas, Cl. VOGEL vel solas vel cum cortice Winterano, dulcamara, bardana, saponaria, cortice Peruuiano coniunctas suasit interne, et externe depurabantur vlcera per folia boni henrici, recenter iis applicata. Ab initio hoc malum his remediis cedere videbatur, paulo post autem eo peius redibat, vt non solum magis tumerent, ruberentque supra nominatae partes, sed ipse sanguis ex his vlceribus efflueret. Propinabatur propterea decoctum radicis hellebori nigri, tinctura cantharidum ex mente MEADII et regulus antimonii medicinalis, sed sine omni omnino effectu, et, febre lenta accedente, pedibus insigniter tumentibus cum immensa aquae, quae effluebat copia, foetoreque aucto, aeger mentis compos exspirauit. Tres dies ante mortem vermes apparuerunt, quorum generationem promouisse impeditam aegri per mortem amatae puritatem, coelum calidum, conclauis angustiam et muscarum aduolationem, quae nullo modo poterant arceri, Noster fatetur.

p. 63. In altera dissertatione, Cl. MURRAY fetas lumbricorum terrestrium sollicite describit; lumbricos enim intestinales eiusmodi fetas habere, contra Ill. LINNAEUM (Syst. Nat. Ed. XII) plurimi et inter hos Cel. PALLAS *) negant. Quamquam vero iam TYSONUS, RAIUS, WILLISIUS varii-
que

*) vid. EIUSD. diff. de infestis viuentibus intra viuentia. p. 13. vid. Comment. nostr. Supplem. IV. Decad. prim. p. 696.

que recentiorum has lumbricorum terrestrium setas describere, varia tamen adhuc in earum historia deesse, ab iis Viris Cl. non annotata, accuratior harum setarum contemplatio Auctorem Cl. docuit. Vidit vero setas has quatuor ordinibus secundum omnem corporis lumbrici longitudinem excurrere, quemlibet autem ordinem duplici setarum serie constare, ut itaque quilibet annulus, eo, qui cingulum siue ephippium refert, excepto, octo eiusmodi setas ostendat. Inferiorem vero corporis partem semper occupant, motuique vermis inserviunt. Quaelibet seta in vagina includitur, et, si pars in cute haerens simul mensuratur, duas tertias lineae aequat. Pars extra cutem prominens durior est ea, quam cutis includit. Anteriores setae retrorsum, posteriores antrorsum, conuersae sunt, mediae vero erectae deprehenduntur. Emittere retrahique has setas posse Cl. Auctor observauit, eo magis vero emissent, quo viuidior lumbricus est. Putat in humano lumbrico has setas longe subtiliores, et forte idcirco ab observatoribus non visas esse, quoniam eo tempore in corpore delituerint. Si adessent, vel ductitiae aculeos lumbricorum terrestrium aequarent, insignes profecto crearent molestias, cum lumbrici rarius solitarii occurrant.

VI.

Nuove osservazioni sopra i globetti rossi del sangue. In Lucca 1766. A Spese di Vincenzo Landi Librajo Fiorentino. 8. mai. pagg. 45. cum dedicatione.

i. e.

Nouae observationes super globulis rubris sanguinis. Auctore Cl. FELICE FONTANA.

- p. 7. **Q**uam celeberrimus quidam in Italia philosophus antea aliquot annos globulos sanguineos figuram non sphaeroideam aut ovalis, sed spiralem descripsisset depingendosque curasset, ac si essent cylindri ex sacculis recuruis et extremitatibus inter se unitis compositi et vacuum satis distinctum in medio offerentes: nouae hae observationes iisdemque superstructae hypotheses permouerunt Auctorem non solum, ut omnia haec experimenta curatius ipse repetere, quo, quod ipsis veri falsive inesset, inueneret. Nihil autem videre ipsi contigit, nisi globulos veros, eos autem in media parte magis, quam
- p. 11. in ambitu pellucidos: quandoquidem verum esse corpus sphaericum qualecumque a luce transparen-
te, prout eius situs aut directio variat, mutari. Eadem praeterea ratio est corpusculorum rotundorum quae in vegetabilibus microscopium detegit, et oculorum eorum seu particularum se mouentium, quae
- p. 13. in vegetabilibus animalibusque partibus, corruptionem subeuntibus, conspiciuntur; item animalculorum feminalium, quae in re BUFFONUS et NEEDHAMUS decepti sunt, credentes, haec animalculorum caudarum iacturam pati, quod mera illusio optica est, a mutata lucis directione profecta. Et hac occasione Noster largam recensionem experimentum

rum, super his animalculis aequè ac iis, quae per infusionem generari videntur, captorum, alia occasione se exhibiturum promittit, quam auide nobiscum Lectores nostros expectaturos putamus. In pulvere antherarum eadem mutatio obuenit, et licetp. 16. in nonnullis plantis non contigerit, hoc tamen tribuendum erat texturae irregulari lamellarum exteriorum horum globulorum, siquidem, puluere in aqua macerato, laminisque ideo arctius ad se inuicem accedentibus, phaenomena reliquis similia subsequabantur. Potest etiam causa erroris in maculis exilissimis laminarum talci (vel micae potius, quae vitrum rufficum dicitur), quibus interponi solent obiecta oculo armato subiicienda, posita esse. Minutissima denique corpora fere omnia facile eodem modo oculis nostris illudere posse, exemplo bullularum, ex fermentatione atque efferuescentia natarum, patet. Quo vero euidentius figura particularum sanguinis vera atque genuina elucesceret,p. 19. primo vnam eandemque sanguinis guttulam vno eodemque microscopio vsus conspexit, viditque moleculas has sub ipso examine figuram saepius mutare, prout maior vel minor lucis gradus, aut conus lucidus a speculo reflexionis ad obiectum plus vel minus oblique delatus fuerit; imo, euanescente marginis globulorum parte, hos figuram semilunarem, semicircularem, aut denique bacillorum tenuissimorum assumere, cet. Cum igitur hae illusiones viderentur ex eo proficisci, quod obiectum sistatur, a parte inferiori illuminatum, adeoque luce refracta conspiciatur, melius factum iri putabat Noster, si solum luce, reflexa ab ipso obiecto, vteretur. Qua mente collectam per aliquot specula re-p. 21. flectentia lucem, mediantibus tubis opacis, ad minus speculum argenteum deducebat, cuius in foco lentem exactissimam collocauerat, ita quidem, vt globuli

- buli sanguinis lucem, ex loco superiori acceptam, protinus reflecterent, versus oculum obseruatoris. Perspicue tunc videbat globulos hos vere sphaericos, simulque nullum in iis praeter rubrum colorem detegebat: intensior tamen is est in arteriis, quam in venis, ob diuersam horum vasorum structuram; intenditur item a maiori ipforum coagmentatione, cum e contrario in vasis minimis, inprimis si vnum tantum globulum capiant, transparens sit, vbi etiam globuli figurae spiralis deprehenduntur, in maiores autem transgressi canales rursus sphaericam figuram offerunt. In minimis tamen itidem colorem rubrum globulus praebet, cum lux non aequaliter super canalem vel globulum extenditur, et superior superficies maiorem eius partem, quam inferior accipit. Auctor iste, quem refutat Noster, eo etiam spatium vacuum in medio globulorum sanguinis probare annisus est, quod per eos-
- p. 23. dem transparent maculae et inaequalitates miculae: sed globuli isti, tunc demum transparentes, redduntur, cum lux maiori copia per centrum ipforum transit, quod aliae etiam obseruationes docent. Icones etiam incogniti illius Auctoris non sufficiunt explicandae figurae, quam ille globulis suis tribuit.
- p. 24. Si globuli isti proxime sibi inuicem adiacent, videntur conflare ex spiris duabus, ita vt alter circulus niger exteriorem ambitum, alter centrum constituat; sin autem remoueantur a se inuicem, iterum transparent et pellucidissimi conspiciuntur, adeo vt hoc etiam phaenomenon illusionibus opticis sit annumerandum. Porro memoratu dignum est, eosdem, potissimum si ex animalibus frigidis desumpti fuerint, laminae crystalli impositos ita, vt vnus ab altero distet, videri paulum conquassari reddique latiores, forsan proprio pondere, vel quia abest serum, quod ipsis in vasis continebat. Harum tamen muta-

mutationum causae non penitus patent. Quod auxilia spectat, quibus has sic dictas spirulas se detexisse sibi persuasit Auctor iste Italus, globuli vitrei, p. 27. lentium loco adhibiti, licet ob focum minorem multum faciant ad augendam obiecti magnitudinem, pluribus tamen, quam lentes, incommodis laborant; id quod etiam de microscopio solari valet, nisi hoc secundum propositum BOLLONDI, corrigi et colores iridis ab eo separari queant. Summum incommodum, ab istis globulis vitreis expectandum, quod in lentes non adeo cadit, in aberratione lucis p. 28. positum est, quod etiam solertissimus HENR. BAKER iam indicavit. Commemorandus praeterea est alius error opticus, in eo consistens, quod p. 29. globuli, in vasis considerati, saepe videantur mutare colorem et figuram, quod tamen Noster potius se- ro, cui innatant, et quod frangendo radios lucis nobis potest imponere, adscribi debere, quam vere contingere putat, neque persuadere sibi valet, impulsus ipsum globulorum ad se inuicem nobis adeo facile exhibere posse mutatam ipsorum figuram.

Hanc tamen mutationem vere perspexit in pul- p. 32. monibus ranarum, quam prolixissime viuidissime- que describit: in minimis quippe vasculis globulus figurae sphaericae elongatur ad tertiam, dimidiam, mo duplam partem diametri, adeo ut verum cylin- drum constituat; simulac vero vas maius intrat, pristinam rursus formam consequitur. Similem mutationem pisciculorum caudae conspiciendam praebent. Ad opticas porro illusiones refert fila- menta vel fibras, salesque natantes in sanguine, porro series globulorum minorum, ex quibus maio- res confluant. Hoc tamen obseruatu et miratu di- gnum est, in caudis piscium saepe arteriam in ve- nam, breui post iterum in arteriam, et demum rur- us in venam mutari. Figura globularis corpuscu-

p. 40.

lis minimis fluidorum animalis aequae ac vegetabilis regni propria esse videtur. Polypi illud genus, quod LINNAEUS *gordium* dixit, et multa alia ex vermium classe videntur ex meris eiusmodi globulis composita. In animalibus frigidis saepius apparent figurae ovalis, in homine vero reliquisque animalibus calidis semper rotundae. Globuli sanguinei videntur compositi ex massa viscida oleosa gelatinosa; pellicula autem eos inuestiens, a nonnullis assumpta, vere non adest, quod multa ratiocinia et experimenta probant. Praeter has autem partes alia ipsis insunt principia, speciatim terra, quae cum phlogisto coniuncta a magnete attrahitur. Figura sphaerica essentialis est, neque a solo motu et impulsu in vasis producit. Experimentis huius nostri Auctoris respondent ea, quae Cl. ALPHONSUS GUADAGNI, physicae experimentalis in Academia Pisana Professor, fecit. Denique Noster promittit, se propediem novas observationes de determinanda magnitudine absoluta globulorum sanguinis, de varia eorum in variis animalibus figura ac celeritate, et de pluribus aliis, ad circulationis historiam spectantibus, nobiscum communicaturum.

VII.

Dell' azione del cuore ne' vasi sanguigni nuove
osservazioni dell' Abate SPALLANZANI,
Sacerdote della Congregazione della B. Ver-
gine, e S. Carlo di Modena, Professore di
Filosofia nell' Università, e Collegio de' No-
bili, e Membro della Società Reale di Lon-
dra. In Modena 1768. Nella stamperia di
Giovanni Montanari. 8. mai. pagg. 71. cum
dedicatione.

i. e.

Observationes novae de actione cordis in vasa
sanguifera, Auctore Cl. SPALLANZANI.

Opus hoc in forma epistolari ad Ill. HALLE-
RUM directum est, sistens observationes, ad
normam earum factas, quas hic ipse in libro de mo-
tu sanguinis in animalibus proposuerat. Cum au-
tem ex animalibus frigidis HALLERUS bufones
tantum, et ranas examini suo subiecisset, his Cl. P. 8.
Auctor salamandram aquaticam substituit, neque ad
solum mesenterium, sed ad integrum systema vaso-
rum respexit, spe facta, se continuatas huius gene-
ris observationes alio tempore communicaturum.
Vfus est apparatu anatomico, a Cl. LYONNET de-p. 9.
scripto, sed elaboratiori; luce reflexa tantum, non
refracta, et quidem, ubi fieri poterat, solari in ca-
mera obscura, aut, ubi debiliior illa erat, fortiori red-
dita per lentem aut reflexionem speculi vistorii. Si-
tus animalis examinandi semper supinus fuit. Reii-
cit consuetum modum contemplandi mesenterium,
quo istud prius expandendum est, ideoque in statu
naturali conspici nequit. Neque aliud umquam
vasorum genus vidit, quam sanguifera. Sed pro-
gredia-

grediamur ad tractationem ipsam, quae in sex capitibus actionem cordis in vasa arteriosa maxima, media et minima, tumque in venosa minima, media et maxima declarat.

- P. 15.** Aperto pectore pericardium, quam maxime tenue cordis motum viuidissimum ostendit: hoc autem, cum pericardio includitur, non adeo insigniter in diastole se attollit, quam eodem dissecto; in priori etiam casu ascendens lineam curuam a sinistro versus dextrum latus describit, in posteriori autem perpendiculariter ascendit. Differentiam spatii, quod a corde in summa eleuatione et descensu per diastolen et systolen efficitur, vnus lineae Noſter inuenit: differt autem haec mensura pro vario gradu motus aucti vel imminuti. Liquorem pericardii in 150 salamandris semper praesentem conspexit. Sanguis, in auriculam influens, ob copiam colorem rubicundiores offert; inde vno momento in cor transpellitur, quo extenso, auricula concidit: pari etiam modo transitus fit ex corde in aortam. Momentum collapsus in auricula breuius est, quam extensionis eiusdem: color tamen eiusdem semper rubicundior, quam cordis, si hoc contrahitur prolixè. Describitur progressus arteriae aortae: nos tantum hic notamus, non vno momento sanguinem omnem in eam impelli, adeo, vt successiua diastole et systole motibus cordis respondeat. Si animal diu iam excruciatum fuit, sunt momenta, in quibus vas hoc omnino sanguine vacuum est: quare et in statu naturali cursus sanguinis non continuus, sed interruptus esse videtur. Neque in vniuersum omnes arteriae dici possunt, figurae conicae esse, sed sunt etiam cylindricae, quod in specie de ramis vasorum pulmonalium ac mesenterii affirmatur.

Motus hic, si viuendum est animal, aequaliter p. 25.
peragitur, neque adeo interrumpitur, ut in vasis
maioribus: at, isto debilitato, sanguis lentius in dia-
stole, celerius in systole, accedente noua eius vnda,
mouetur; tandem in diastole motus prorsus fere
cessat, imo sanguis in arteria refluit, et systole de-
mum rursus propellitur: quem fluxum atque re-
fluxum Noster *motum oscillatorium* dicit. Sin au-
tem animal se contorquet vehementiusque agitat,
aut impedimenta quaecumque, libero motui op-
posita, remouentur, rursus cessat motus hic oscilla-
torius, et progressius restituitur. Oscillatio haec
in mesenterio simul in trunco arterioso eiusque ra-
mis obseruatur, in pulmonibus autem in arteriis
minimis incipiens, ad ramos demum maiores pro-
greditur. In toto mesenterio motus sanguinis ae-
qualissimus est, neque gyrationes vasorum eum re-
tardant, neque sanguini ipsi motum rotatorium aut
intestinum comparant. Aer in sanguine nullus se
ostendit, nisi, ruptis aut attenuatis vasis, per ea se in-
sinuauerit, et tum globulos sanguineis longe maio-
res format. Aneurysmata vel oualis vel sphaericae
figurae Cl. Auctor vidit, et nonnumquam sub ipsa
inspectione mire aucta, cognouitque, sanguinem, in
ea ingressum, nonnihil velocitatis perdere, colorem-
que multo rubicundiores sistere, quem iterum ma-
iori eius coaceruationi adscribit.

Arteriae minimae siue capillares, vbiuis fere in P. 32.
corpore obuiaae, non omnes adeo exiguae sunt, ut
vnum tantum globulum transmittant. Sunt etiam
quaedam ex iis, quae in venas non transeunt, sed
in partibus diuersis extensae vel inter eas abscondi-
tae euanescent. Sanguis in iis paulum tantum
tardius, quam in vasis mediis arteriosis, mouetur,
ne ipsis quidem arteriis cutaneis exceptis: sub
continuatis tamen animalis cruciatibus motus oscil-
lato-

- latorius, supra descriptus, hic prius, quam in vasis mediis, deprehenditur, ideoque citius etiam in iis motus omnis cessat, habita tamen ratione structurae partium ipsarum organicarum. Maiorem vel minorem a corde distantiam hic aliquid conferre, vero quidem simile videtur, sed nondum plane liquet. Pariter nondum patet, an facilior exsiccatio vasculorum minimorum hic in censum vocanda sit. Globuli sanguinei, in his vasis cuiuscumque diametri et magnitudinis moti, alii fluido inuisibili innatant, quod iam HALLERUS perspexerat, nostrique Auctoris observationes denuo confirmant. Color eorum sub luce refracta pro ratione congeriei ipsorum varius est: in minimis vasis albescens et lucidus; in parum maioribus paullo flaescens, leuissima, nebulae quasi ad instar, rubedine obductus; inde, crescente vasorum magnitudine, sensim sensimque saturatius ruber. Reflexa autem luce adhibita, omnes globuli rubicundi apparent, quamquam maior eorum copia intensiorem omnino rubedinem efficit: ex quo patet error eorum, qui vasa serosa et lymphatica, distincta a sanguiferis, se conspexisse putant. Figura globulorum maiorum non est rotunda, sed fere oualis, sphaerae nempe elongatae similis, sed in medio paulo crassior. Est autem species alia minorum, vix ad dimidiam priorum magnitudinem accedentium, numero quoque pauciorum, qui sphaericae figurae sunt propiores. Num globuli figuram mutare possint, HALLERUS nequiuit definire; FONTANA, vti supra in recensendo eius scripto monuimus, hoc in vasis pulmonalibus ranarum vidit, et Noster in vasis branchiarum Salamandarum iuniorum conspexit, vbi vasa angulum acutissimum formant, flexisse se globulos figuramque semilunarem assumpsisse, neque, nisi superato hoc angulo, pristinam rursus figuram acquisuisse. In transitu

situ etiam variorum animalium globulos sanguineos varia gaudere figura, neque ergo ab vno ad alterum concludi posse, monet.

Transimus nunc ad systema venosum. Princip. p. 44.
 pia venarum, neque in ranarum mesenterio HALLERUS, neque Noster in salamandris vidit, quippe qui arterias satis adhuc magnas ad superficiem intestinorum ferri, ibidemque mirandum in modum divisas in venas abire conspexit. Vti etiam arterias quasdam evanescere quasi supra indicauerat, sic etiam iisdem ex locis venularum principia emergunt. Relatio diametri globulorum ad diametrum horum vasorum minimorum ea est, vt globulus absque notabili frictione parietum vasis celeriter decurrat, quamquam distantia illius a pariete ipso mensurari ob exilitatem nequit. Venas etiam minimas motui cordis subiectas esse, capta in animalibus viuidis experimenta docuere, in quibus, donec vigor iste durabat, nullum discrimen inter velocitatem sanguinis in arteriis venisque minimis conspici poterat: ligata etiam aut compressa aorta motus omnis subito cessabat, restitutus, quam primum aorta rursus libera reddita fuerat. Verum motus hic in venulis prius languescit, quam in arteriis. Cruorem in truncis venarum maiori celeritate, quam in ipsorum ramulis, moueri tunc demum patet, quum plures eiusmodi venulae confluunt, non aequae in paucioribus tantum concurrentibus: imo hanc differentiam etiam in pluribus arteriis minimis, in vnum truncum venosum unitis, Cl. Auctor vidit. Observatio HALLERI, si venula minor inferatur in truncum multo maioris diametri, celeritatem sanguinis in hoc adeo magnam esse, vt ingressum sanguinis ex minore canali cohibeat, peculiari exemplo confirmatur p. 53.
 venularum minorum, super aortam serpentium, tandemque

demque in trunculum exiguum confluentium, quod postea venae cauae immerfus sanguinem vtrumque facile a se inuicem distinguendum offert. In vasis coronariis cordis nonnisi difficulter motus sanguinis detegitur, isque, contracto corde, celerior, hoc autem dilatato, languidior, quamquam vtrum haec vasa arteriosa sint, an venosa, nondum definiri potuit.

p. 58. In vasis venosis mediis, mesentericis nimirum ac pulmonalibus, monet Auctor se nullum discrimen inter sanguinem venosum et arteriosum inuenisse, si vtriusque generis vasa eiusdem diametri fuerint: causa ergo mutati coloris iterum ad aggregationem globulorum redit. In mesenterio venae et numero plures et diametro maiores sunt arteriis: circulatio autem, si viget animal, eadem est, nisi quod impulsus cordis in venis non persentiscatur. Neque etiam inflexiones et anguli venarum eam retardant.

p. 60. Summa autem celeritas conspicitur in trunculo venae pulmonalis, quippe quae celeritatem reliquarum venarum mediarum ad duas tertias superat. Num sanguis in axe venae velocius, quam ad latera eiusdem moueatur, non potest disquiri, quam diu circulatio adhuc vegeta est: hac vero languescente, prius dilucide cognoscitur. Vti, retardato vel sublato prorsus motu, sanguis in arteriis non coaceruatur, sed eodem, quo progressus fuerat, ordine subsistit: sic idem etiam fit in venis. Obstaculo quodam, liberiolem cursum impedieme, iste eo in loco acceleratur, donec illud superatum fuerit, facile etiam est, producere globulum aeris elastici in sanguine, si vena leuiter tantum vossellae apice irritatur, quod in mesenterio et intestinis saepius vidit Cl. Auctor.

p. 68. Ex capite ultimo de vasis venosis maximis, id est, vena caua superiore et inferiore, hic tantum notamus, celeritatem sanguinis in iis non esse maiorem, quam

quam in venis mediis. In superiore sanguis prope cor non aequaliter mouetur, sed in hoc vndis alternis ingreditur. Pulsatio vtriusque cauae pro ratione magnitudinis eius diuersa est. Effectus insertio- nis minorum venularum in alias multo maiores et assertum de celeritate sanguinis, angulis vasorum non imminuenda, hic nouis exemplis illustrantur.

VIII.

Histoire de l'Academie Royale des Sciences.

Année 1764 avec les Mémoires de Mathématique et de Physique, pour la même Année, tirés des Registres de cette Academie. à Paris de l'Imprimerie Royale 1767. 4. Alph. 3. pl. 4. tab. aen. 16. Année 1765. ibid. 1768. Alph. 3. pl. 15. tab. aen. 18.

i. e.

Historia Academiae Regiae scientiarum ad annum 1764 et 1765, cum commentariis mathematicis et physicis.

Ex observationibus ad physicam generalem spectanti. a. 1764. bus voluminis, quod ad annum 1764 pertinet, P. 32. sequentia notanda sunt: 1) tubum hydraulicum (*trompe de mer*) etiam in Sequana fluuio obseruatum esse. 2) Mustelam martem vulnerasse infantem, in cunis iacentem. 3) Fluuium, qui (vel potius vapor eius) flamma admota, accenditur, de quo alio loco expositum est*), proprietatem hanc habere a ferri minera, quae in terra, quam percurrit, copiose reperitur. 4) Patinam ex argento deaurato confectam, quae per aliquod tempus in cloaca latuerat,

*) vid. Histoire de l'Acad. 1741. pag. 36.

erat, mire corruptam, et argentum in speciem minerae argenti, sulphure mineralifati, mutatum fuisse. 5) In Comitatu Ruscinocensi anno 1763 varia flumina, nulla pluuia praecedente, subito ex alueo suo prorupuisse, et vicinos agros inundasse, quam inundationem ex terrae motu originem duxisse, probabile est.

P. 62.

In *observationibus anatomicis* continetur: Cl. MORAND filii *de nanis* relatio; in quo primum varia de nano Regis STANISLAI *bebe* dicto narrantur, qui vicesimo tertio aetatis anno, senili quasi marasmo confectus, obiit. Longitudo corporis eius triginta tres pollices tantum aequabat, paucaeque animae rationalis signa dabat. Alius vero nanus, ex nobili Poloniae stirpe ortus, viginti octo tantum pollices longus, optimo praeditus ingenio erat, variasque linguas callebat. His in vniuersum propositis, monet Cl. MORAND, duas nanorum species reperiri. Alii enim rhachitici ex membrorum distortionem paruum tantum staturam acquirunt et difformes sunt, in aliis vero, qui longe rariores occurrunt, omnia membra iustam inter se proportionem habent; atque ad hanc speciem STANISLAI Regis nanus et nobilis ille Polonus referendi sunt. Monet quoque Cl. Auctor, nonnunquam ex rhachitide capitis magnitudinem morbose ita augeri, ut crania eiusmodi gigantum potius, quam nanorum capita referant *). Tale vidit Cl. Auctor in coemeterio effossum, quod 26 pollices in ambitu suo aequabat.

P. 71.

In *observationibus anatomicis variis* notatur: ex hernia incarcerata exulcerata varios exiisse vermes: fetum duplicem, in abdomine et pectore connatum, Cl. CUCHET Academiae obtulisse, cuius tamen sectio desideratur: in quibus, vertigine correptis, post mortem varios vermes in sinibus frontalibus repertos esse cet. Cl.

DE

*) vid. Ill. HALLERI Elem. Phys. Tom. VIII. p. 42.

DE CHAIGNEBRUN varios quoque morbos describit in locis paludosis prouinciae Briae dictae in hominibus animalibusque ortos.

Ex *botanicis* notamus, Cl. ADANSON hordei p. 77. etiam spicam ramosam tritico ramoso similem reperiisse, seminaque seruisse, quo appareat, vtrum hordeum hoc noua species, an varietas sponte nata sit.

Sequentes commentarii ad annum 1764 pertinent:

1. *Observationes geographicae comparationem in-p. 1. sulae de France et de Bourbon sistentes.* Auctore Cl. BUACHE.

2. *Additamenta ad calculos eclipsis solaris, d. 1. p. 7. apr. 1764.* Auctore Cl. LE MONNIER.

3. *Commentarius de euaporatione aquae salsae, p. 9.* Auctore Ill. DE HALLER. Vsitata salem coquendi ratio, qua aqua falsa in domibus gradatoriis condensata, ope ignis euaporatur, Ill. HALLERO, qui salinarum Bernensium tunc temporis curam quoque in se suscepserat, valde displicuit. Sollicitus igitur de noua via inuestiganda, multa tentamina instituit, et primum glaciem ad aquam falsam applicauit, vt congelatione eam condensaret, deinde eam in vasis cauis per aliquod tempus reposuit, vt sal, in ea contentum, in fundo vasorum subsideret. Quae cum haud ex voto procederent, cogitauit de aqua falsa calore solis euaporanda, ductus obseruatione, quam relata legerat, ad mare, praesertim in calidioribus terris, scopulos sale ex aqua marina per solis calorem cocto obduci. Hunc in finem cum experientiam consulisset, non modo maiorem, quam vulgari via, salis copiam obtinuit, sed et sal multo praestantius, opacum, durissimum, communi aliquan-

quantum grauius, odore violarum praeditum, quod multo minus aquam ex aëre attraheret, maiorem acidi copiam contineret, et figuram absolute cubicam ostenderet. Communicauit hoc commentario Ill. Auctor experimenta paene per sex annos instituta, adiecitque tabulas, quae quantitatem exhalationis quotidianae conspicuam reddunt, quae pro diuersa coeli tempestate vel citius vel tardius progreditur, per hiemem vero ob fractam solis vim plane non procedit.

P. 75. 4. *Disquisitiones nouae circa lentes opticas*, Auctore Cl. D'ALEMBERT.

p. 146. 5. *Obsersuatio eclipsis solis, d. 1. april. 1764.* Auctore Cl. LE MONNIER.

p. 159. 6. *Nouae methodi analyticae computandi eclipses solares, occultationes stellarum fixarum et planetarum per lunam, et in uniuersum quascunque huius sideris obseruationes ad locum e centro terrae visum reducendi.* Commentarius primus, Auctore Cl. DE SÉJOUR.

p. 186. 7. *Commentarius de gradu caloris, quem homines et animalia ferre possunt*, Auctore Cl. TILLET. Cl. DU HAMEL et TILLET, Rupe Fucaldi (Rochefoucault) commorantes, viderunt puellas in furnum pistorium intrare, ibidemque ligna disponere et per quartam horae partem remanere, cum tamen thermometer Reaumurianum in eo adscenderet ad 130 gradus, siue potius, vt ex comparatione thermometri, quo vsi sunt clarissimi obseruatores, cum spiritu vini praeparati, cum alio mercurio repleto elucescit ad 112 gradus, graduque huius thermometri 85 (qui gradum 112 thermometri Fahrenheitiani aequat) iam aqua ebulliat. Haec obseruatio

tio, quae cum sententia vulgo recepta, homines scilicet in aere, sanguine calidiore, non vivere posse, minus conuenit, Cl. TILLET occasionem dedit, in hanc rem vltius inquirendi. Ex experimentis vero, ab eo sollicitè cum variis animalibus factis et cum experimentis, quae a BOERHAAVIO instituta sunt *) in camera, qua panes saccharini exsiccantur, comparatis, patet, animalia longe maiorem gradum caloris perferre posse, inprimis si linteis ita obvoluta sint, ne externus calor iis adeo noceat. Hinc iudicat Noster subitam corruptionem, qua in BOERHAAVII experimento canis, eiusmodi camerae inclusus, affectus est, ortam esse a singulari quadam morbosa animalis huius dispositione, et in vniuersum aerem harum camerarum nociua aliqua qualitate, animalia citius necante, infectum esse.

8. *Historia morbi feminae cuiusdam, cuius mem. p. 206.*
bra breui tempore singulari modo distorta facta sunt.
 Auctore Cl. MORAND filio. Femina haec triginta sex annorum variis leuioribus ophthalmiis, imo dolore in genu articulo laborauerat, ceterum vero egregie valebat. Duos quoque fetus felici partu edebat. In altero tamen puerperio mammae lacte quidem turgescabant, nullum vero lac ex iis profluebat. Hinc die nono horrore et cephalalgia corripiebatur, genua turgescabant, vomitusque lacteus subsequiebatur. Genuum vero dolor et tumor non minuebantur. Tandem, variis ab empirico quodam abhibitis remediis, tumor quidem dissipatus est, sed misera omnium membrorum vsum, scapulae motu excepto, perdidit, atque perpetuis iam per vndecim annos doloribus infestatur, videndi facultatem amisit,

*) vid. Chem. T. I. p. 275. Confer etiam Ill. HAL-
 LERUM Elem. Phys. T. II. p. 32. seq.

amisit, membraque eius sensim sensimque singulari ratione, quae hic icone illustratur, distorta facta sunt. Unguium quoque longitudo mirum in modum aucta est, variisque aliis morbis, ab acrimonia humorum prouenientibus, molestat. Ceterum vero satis valet *).

p. 215. 9. *Nouae methodi analyticae computandi eclipses solares* (vid. sup. p. 159.) *Commentarius II.* Auctore Cl. DE SEJOUR.

p. 251. 10. *Commentarius de lentibus obiectiuis*, Auctore Cl. FOUGEROUX DE BONDAROY.

p. 262. 11. *Commentarius de longitudine et latitudine urbis Pekin in China*, Auctore Cl. PINGRE.

p. 273. 12. *Commentarius de eclipsi solis*, d. 1. apr. 1764. Auctore Cl. BAILLY.

p. 277. 13. *Observationes astronomicae Noslonii prope urbem Sens factae* a S. R. E. Purpurato DE LUYNES et Cl. BAILLY.

p. 284. 14. *Observatio eclipsis lunae*, d. 17. martii 1764. Auctore Cl. PINGRE.

p. 288. 15. *Disquisitiones de gradu aequationum resultantium ex eliminatione incognitarum, et de mediis ad has aequationes inueniendas applicandis*, Auctore Cl. BEZOUT.

16. Com-

*) Summam hic morbus cum morbo feminae Soupiot analogiam habet, qui etiam post puerperium ortus fuerat, vid. Phil. transact. 1753. p. 23. Mém. de l'Acad. de Paris. a. 1753. p. 541. seq. Comm. nostr. Vol. IV. p. 384. Vol. V. p. 137. et VII. p. 279.

16. *Commentarius circa observationem transitus p. 339.*
Veneris per discum solis Seleginskii in Sibiria institu-
tam, Auctore Cl. PINGRE.

17. *Ephemerides cometae a. 1764. Auctore E O. p. 344.*
 DEM.

18. *Commentarius circa longitudinem urbis Pol. p. 348.*
 ling, Auctore Cl. BAILLY.

19. *Calculus eclipsis solis, d. 1. apr. 1764. Au-p. 351.*
 tore Cl. CASSINI DE THURY.

20. *Observationes circa Mercurium factae in ob-p. 353.*
servatorio Régio mens. mai. 1764. plurimumque ecli-
psium satellitum Iouis ab a. 1760. ad 1764. Auctore
 Cl. CHAPPE D'AUTEROCHE.

21. *Commentarius de parallaxi lunae in hypothesi p. 362.*
telluris circa polos compressae, Auctore Cl. PINGRE.

22. *Disquisitiones circa naturam calculorum, qui p. 374.*
a hominibus et animalibus formantur. Commenta-
rius primus, Auctore Cl. TENON. Cl. Auctor,
calculos in hominibus animalibusque accuratius dis-
quirens, cognovit, eos ex duplici parte constare, ter-
rea scilicet et gelatinosa, acidis non facile solubili,
qua figura calculi quasi delineatur. Albi calculi fa-
cilissime in acido nitri soluuntur, flauescentes non ae-
que facile, bruni autem ab iis minime mutantur.
Nec acidum vitriolicum omnium calculorum men-
struum est, vel eos perfecte solvit, sed eos magis de-
ruit, ipsamque gelatinosam eorum fabricam in spe-
ciem, mucii albumini similem, mutat. Balarucenses
quae calculos albos et flauescentes in mucum lim-
pidum albuminosum dissoluunt, brunos vero non
 R 2 attin-

attingunt. Quodsi vero eiusmodi calculi in aqua ebulliente per quinque vel sex horas detinentur, tunc, extractis vnguinosi et oleosi partibus, aqua Balarucensi cedunt, atque ipsius quoque acidi nitrosi ope gelatinosa eorum fabrica detegitur. In vniuersum vero haec fabrica in diuersis calculis differt, cum vel orbicularia strata efformet, quod v. c. in calculis vesicae animaduertitur, vel semiorbicularia, vt in cancerorum lapidibus, vel spongiosam fabricam sistat. Priores duas species aqua et spiritus vini firmant, tepida vero emollit. Lithonriptica autem in vniuersum vel terram soluunt, vel gelatinosam fabricam emolliunt, vel vinctuosas et pingues partes extrahunt et ita cohaesionem reliquarum partium minuunt. Vltiora experimenta in sequentibus commentariis se communicaturum esse, Cl. Auctor pollicetur.

P. 390. 23. *Animaduersiones in observationes lunae a Cl. DE LA CAILLE vulgatas, Auctore Cl. CASSINI DE THURY.*

P. 408. 24. *Commentarius de comparatis tonitrus et electricitatis effectibus; adiunctis meditationibus quibusdam de mediis se aduersus priores tuendi, Auctore Cl. NOILLET.* Cel. Auctor similitudinem tonitrus et electricitatis ex paribus, quos producunt, effectibus demonstrare conatur. Nube, in qua materia electrica frictione excitata est, tanquam conductore considerata, fulmina nihil aliud esse putat, quam scintillas electricas, appropinquante alio corpore, ex conductore prouenientes. Tonitru comparat cum sonitu scintillae electricae, a quo non nisi vehementia differt. Illustrantur haec et confirmantur per partes, adhibito ad comparandum experimentorum auxilio. Secunda commentarii pars versatur in explicandis

candis iis tempestatum effectibus, qui in hominibus fulmine tactis, aedificiis incensis, arboribus diffisis cet. se produnt; quae omnia quemadmodum electricitatis ope fieri possint, clare ostenditur. Vltimum locum occupant meditationes de ratione, oborta tempestate, a periculo se defendendi. Loca, montibus inclusa, aedificia altius vicinis eminentia et multo metallo aut inaurato ligno ornata, vbi magna multitudo hominum conuenire solet, vt templa, eorumque turres et campanas, theatra, naues etiam in mari iactatas, fulminibus prae ceteris credit obnoxias. Suadet iis, qui tutius a fulmine esse cupiant, ne corpus muro aeclinent, aut sub dio arboris tegmini se confidant, sed potius in loca subterranea descendant, siue hoc nolint, fenestras claudant, sericeis vestibus se induant, verum non aure aut argento intextis, aut, si nimius timor fuerit, vitreis vasibus se includant.

25. *Commentarius de epiplocele, cuius signa in P. 452. initio valde dubia erant.* Auctore Cl. TENON. Vir quidam sine causa euidenti subito tumore afficiebatur in inguine dextro nato. Vndecimo, post eius ortum, die superficies eius inaequalis erat variaque tubercula dura, magnitudine nucis anellanae, tactu distingui poterant. Ipse tumor cuti firmiter adhaerere videbatur, nec reduci poterat, ita vt nulla signa herniae recentis ostenderet. Erat tamen hernia et quidem omenti. Hic enim vir, puer adhuc, hernia laborauerat inguinali, post cuius repositionem pars quaedam omenti, extra annulum remanens, annulo accreuit eiusque aperturam clausit, adhaesione vero hac rupta, aliae partes proruperunt. Variis incassum tentatis remediis, tandem tumor in suppurationem abiit omentiue pars prorupta ferro, ligatura, suppuratione sensim consumpta est.

- p. 457. 26. *Commentarius super inundationibus Sequanae Parisiis observatis.* Auctore Cl. DEPARCIEUX.
- p. 487. 27. *Elementa cometæ a. 1764. et 1765.* Auctore Cl. PINGRE.
- p. 489. 28. *Meditationes super formulis* Cl. EULERI *de parallaxibus,* Auctore Cl. LE MONNIER.
- p. 490. 29. *Comparatio latitudinis præcipuarum Galliae urbium, per observationes astronomicas membrorum Academiae determinatae cum ea, quæ ope triangulorum obtinetur,* Auctore Cl. CASSINI DE THURY.
- p. 492. 30. *Commentarius de fossilibus agri Parisiensis tertius,* Auctore Cl. GUETTARD. Corpora, imprimis marina fossilia, ibidem reperiunda, describit. Belemnitas nucleum credit esse conchæ cuiusdam vel tubuli marini, radiatamque eorum fabricam non, uti Cl. DE LA TOURETTE opinatur *), a structura corporis animalis, quod ille polypum durum et osseum fuisse putat, pendere, sed radios hos in iis tantum belemnitis observari docet, qui in spathum vel pyritem mutati sunt, quæ lapidum genera fere
- p. 504. semper radiis eiusmodi componuntur. Afferit quoque Cl. GUETTARD, se reperisse belemnitas, testibus biualui tenuissima, ex duabus laminis composita, obductos, atque in uniuersum belemnitas tubulis marinis affines esse, variis argumentis probat. Alueoli vero sic dicti belemnitarum opercula ei esse videntur. Inter reliqua petrefacta, hoc commentario descripta, nonnulla quoque occurrunt, quorum ectypus adhuc incognitus est, et quæ forte ad pennas marinas vel ad medusas, uti nobis videtur, pertinent.

31. Ob-

*) vid. Cl. BERTRAND Dict. des fossil. T. I. p. 71.

31. *Observationes botanico meteorologicae in ar p. 526.*
ce Denainvilliers a Cl. DU HAMEL factae a. 1763.

32. *Observationes macularum et librationis lunae p. 555.*
ad probandum motum nodi aequatoris lunaris, Auctore Cl. DE LA LANDE.

33. *Commentarius de diverso situ foraminis magni ossis occipitis in hominibus et animalibus, Auctore Cl. DAUBENTON. In homine hoc foramen fere in media calvae basi collocatum est, tantumque a parte posteriore occipitis, quantum a parte anteriore maxillae inferioris distat, planumque marginum eius cum linea, ex centro huius foraminis ad inferiorem partem orbitae ducta, vix angulum trium graduum format. In quadrupedibus contra, piscibus, et amphibiiis reptilibus v. c. bufone, in posteriore cranii parte collocatur, planumque eius cum linea, ex centro eius ad inferiorem orbitae partem ducta, angulum rectum efficit. Causa huius differentiae posita est in erecto situ hominis et in eo, quod nunquam ore terram tangere debeat, cum contra animalia cibum ore ex terra capiant. Hinc quoque ea animalia, quae erecto corpore nonnunquam ingrediuntur, vt simiae etc. magis ad humanam fabricam accedunt.*

34. *Commentarius de ratione alcali fixum tartari (sal tartari) crystallisandi, Auctore Cl. MONTEI, Socio Societatis regiae Montispeffulanae. Notum est, plurimos chemicorum negare, sal fixum tartari unquam in crystallos cogi posse. Hoc tamen fieri nonnunquam Cl. Auctor iam a 1761 observavit repetitisque experimentis cognovit, omnia salia alcalina fixa in crystallos abire, si magna huius salis copia euaporetur, alcali purum sit, et crystallisatio instituatur in*

vase amplo non admodum profundo. Primo ignem adhibet, sique pellicula formari incipit, leni tantum calore reliquam euaporationem peragit, sique fere semper crystallos obtinet. Crystallos spiculis hexaedris constant vel columnis sexangularibus solidis.

1765. Iam ad volumen, quod ad annum 1765 pertinet,
p. 22. accedimus. In *observationibus physicis* continetur;
1) aegagropilae descriptio, quae non rotundam figuram habebat, sed facieculas politas quinquangulares in superficie ostendebat. Durior quoque erat, quam vulgo esse solent, lignique frustum continebat. 2) Tolosae d. 19. maii 1765. terrae motus observatus est. 3) Varia remedia recensentur, quibus in regno Neapolitano locustas, quae per aliquot annos varias huius regni provincias deuastarunt, earumque oua destruxerunt. 4) In fago insignis magnitudinis lapis ita inclusus est, ut pars eius adhuc promineat. Sine dubio lapis ille, in tumultu terrae constitutus, in rimam arboris iunioris penetravit et a fibris ligneis inclusus est; sique, terra per pluuiam ablata, libere suspensus remansit. 5) Cl. RIGAULT observauit, acido nitroso aquae marinae affuso, vermiculos, qui nocturno tempore mare lucidum reddunt, conuelli et mox perire. Eundem effectum acidum etiam vitriolicum habet, acidum vero salis communis et acetum idem quoque, sed longe debilius, efficiunt. Alcalia etiam vermiculos necant, sed tardius, nec alcalia vermiculos, ab acidis enecatos, in vitam restituere possunt. 6) Hac occasione commemoratur, ab affuso spiritu nitri etiam anguillas, quae, microscopii ope, in aceto observantur, perire. 7) Cochlearum vulgare *) opercula, qua hiemali tempore orificia testae clauduntur, ex Cl. HERRISSANT observatione, non ex succo

*) Est *belix pomaria* LINN.

fucco viscoso formantur, sed duplici substantia constant, organica scilicet animali et terrea. Prior oritur ex ipso animale, a cuius corpore, specie membranae tenuissimae, secedit, in cuius poros deinde intra breue tempus terreae particulae accumuluntur.

Observationum anatomicarum summa haec est. p. 42.

1. In ora Britanniae minoris *testudo coriacea* LINN. quam nonnulli in Chinenfi mari tantum reperiri putarunt, capta est. 2. Virgo 58 annorum in atrophiam vniuersalem tantamque debilitatem incidit, vt mumiam referret, nec membra mouere posset. Ossa praeterea aegrae ita emollita sunt, vt ex leuissimis quibuscunque caussis frangerentur, et intra anni spatium misera vndecim eiusmodi fracturis, quae ob partium rigiditatem maximo tantum cum dolore reponi poterant, afficeretur. 3. Methodus describitur, qua opium in viro, spasticis affectionibus obnoxio, in clysmatibus adhibitum est. Sumsit vero ille intra vndecim annos ad 300 libras laudani. Subito tandem ex morbo acuto periit, et in eius sectione cerebrum iusto durius, pulmoque dexter et pleura eiusdem lateris, multo sanguine distenti ac foetidissimi, reperti sunt. 4. In sarcocoele exstirpata fragmenta ossea, in albuginea tunica testis nata,prehendebantur.

Observatio chymica CL. DE MACHY observatio. p. 48.

nes circa Cel. MARGGRAFFII experimentum, quo alcali fixum in cremore tartari iam existere probauit, continet *). Obtinuit vero Cel. MARGGRAFFIUS, cum cremorem tartari, quem, creta addita, solubilem reddiderat et acidum nitri misceret, crystallos, quae nitri crystallos perfecte referrent; ex qua re colligit, alcalia fixa sine ignis actione produci aut potius ex corporibus, in quibus iam existant, edu-

R 5

ci

*) vide EIUSD. *chymische Schriften, zweyter Theil.* p. 49 seq.
Mem. de l'Acad. de Berlin. 1764. p. 3. seq.

ci posse. Cl. vero DE MACHY docet, cryсталlos, quas MARGGRAFIUS nitrum esse putauerat, non nitrum esse verum, sed tartari cremorem plane non mutatum, qui acido nitroso basin praebeat, cui adhaerere possit, et cuius figura a nitroso acido pendeat.

Commentarii vero sequentes in hoc volumine continentur.

P. I. 1) *Disquisitio noua circa determinationem paralaxis solis per transitum veneris, d. 6. iunii 1761. Auctore Cl. PINGRE.*

P. 35. 2) *De circulatione sanguinis in hepate fetus humani.* Commentatio secunda, Auctore Cl. BERTIN. Pergit Cl. Auctor in explicatione argumenti, de quo primam commentationem ante duodecim annos Academiae communicauit *). Describuntur vero in hac altera parte venae hepaticae et inprimis anastomoses, ad hunc diem nemini visae, inter venam portae venamque vmbilicalem et venas hepaticas, quae lineae $\frac{1}{2}$ vel lineae vnam diametrum habent; atque ex hac descriptione varia coniectaria de circulo sanguinis per hepar fetus et adulti deducuntur. Quamquam iniectio ostendit, eiusmodi anastomoses existere, Cl. tamen Auctor primum veras communicationes inter vtramque venam, nudo oculo conspicuas, vidit; quas enim nonnulli veterum **) pinxerunt enormes anastomoses, cohaesiones tantum sunt ramorum vtriusque venae maiorem, operetelae cellulosae. Minores vero inter ramos cauae

et

*) vid. Mem. de l'Acad. de Paris 1753. p. 323. seq. Comm. nostr. Vol. VII. p. 270. Conf. Ill. HALLER Elem. T. VI. p. 483. seq.

**) Confer HALLER. l. c. p. 500.

et venae portarum vel vmbilicalis anastomoses Cl. Auctor vidit quinque vel sex *), plures tamen adesse certum est. In fetu eundem usum habent, quem canalis venosus praestat, cum ex venae vmbilicalis ramis oriantur; in adulto vero transitum sanguinis venae portae per hepatis viscus promouent, atque imprimis in hepatis obstructionibus insignem usum praestant; vasorum enim collateralium diametrum, trunco obstructo, insigniter augeri posse, ex eo patet, quod post aneurysmatis in brachio operationem fit. Eo magis vero eiusmodi anastomoses necessariae erant, quo difficilior in vniuersum sanguinis, a vena portarum allati, per hepatis viscus transitus est. Atque in hoc solo difficiliore transitu Cl. Auctor causam crassitiei sanguinis venae portarum ponit, qui alias, cum lienalis sanguis aquosior sit, magisque resolutus, et plures partes aquosae a venis mesaraicis resorbeantur, eandem profecto fluiditatem haberet, qua aliarum venarum sanguis gaudet.

3) *Disquisitione circa lentes opticas*, Auctore Cl. p. 53.
ALEMBERT. Comm. II.

4) *De circulatione sanguinis in hepate fetus humani*, commentatio tertia, Auctore Cl. BERTIN. p. 106.
Hoc commentario circulationis sanguinis ratio ipsa explicatur, vasis, quarum ope ea fit, prioribus commentariis iam descriptis. Refutantur primum variorum Auctorum sententiae V. C. BIANCHI,
MOR-

*) Hac occasione Cl. Auctor monet, se nudo oculo anastomosin inter arteriam bronchiale et venam oesophageam a WINSLOVIO iam obseruatam, nec non communicationem inter eandem arteriam et venae pulmonalis ramum, tandemque inter arteriam radialem et venam radialem aliquoties vidisse.

MORGAGNI cet. tandemque motus sanguinis matre ad cor fetus per vasa, quorum historiam primo commentario Cl. Auctor dedit *), sequenti ratione explicatur. Ex placenta, ope venae umbilicalis, sanguis ad hepar fertur, quae vena, in ipsa concava hepatis parte posita, sinum format, quem Cl. Auctor umbilicalem vocat, quo nomine illam venam huius paullulum dilatatae **) partem intelligit quae inter lobum anonyum et sinistrum hepatis in proprio sulco posita est, et dextrorsum sinistrorsumque ramos plures ad ipsam hepatis carnem emittit. Tandem in duos ramos diuiditur, quorum minor qui ex trunci siue sinus directione est, canalis venosus ARANTII vocatur, et per fossam sibi paratam in cauam vel venam hepaticam maiorem ad angulum acutum immittitur, maior vero dextrorsum ita inflectitur, ut in sulco transuerso hepatis, quem autem Cl. Auctor longitudinalem vocat, tandem cum venae portarum confluat, ex qua coniunctione dexter venae huius ramus oritur. Hinc sanguis, per venam umbilicalem allatus, partim per canalem venosum statim ad cauam transit, partim hepar, tum per proprios venae umbilicalis ramos, tum per ramos quos vena haec cum vena portarum communes habet, adit. Nec tamen omnis ad minima hepatis vascula venit, sed aliqua eius portio iterum per anastomoses, secundo commentario descriptas, ad venas hepaticas statim tendit. Celerrimus vero est sanguinis ex sinu umbilicali in ductum venosum, ob eius directionem et insertionem in venam cauam, progressus; cum multo lentius per ramum maiorem quidem, sed lateralem fluat, ut itaque per venosum ductum, licet minor sit ramo transuerso, maior tamen sanguinis portio transeat. In vniuersum autem

*) Confer. Comment. nostr. Vol. VII. p. 271. seq.

**) HALLER Elem. Tom. VI. p. 480.

tem tres, quartas partes sanguinis, quem hepar fetus accipit, per venam umbilicalem adduci, Cl. Auctor probat. Post partum vero, umbilicali funiculo p. 136. lo discisso, circulationis sanguinis per hepar fetus ratio ita mutatur, ut vena portarum, quae quartam per nouem menses sanguinis hepatici partem attulerat, nunc vnica huius visceris vena sit, et per ramum communicantem venae umbilicalis cum venae portae sanguis, mutata directione, ad sinistrum lobum fluat, umbilicalis vena et ductus venosus collabantur et concrecant, sinus vero umbilicalis pars venae portae fiat, quamquam temporis successu magnitudo eius sensim minuitur. Confectaria varia physiologica omittimus.

5) *Disquisitiones nouae circa causam vniuersalem* p. 143. *caloris aestiui et frigoris hiemalis, quatenus ea cum calore interno et perpetuo telluris coniungitur.* Auctore Cl. DE MAIRAN.

6) *Observationes circa Solfataram, prope Neapo* p. 267. *lim sitam,* Auctore Cl. FOUGEROUX DE BONDAROY. Quamquam iam varii Auctores de hac Solfatara, quae ut reliquiae montis olim igniuomi considerari potest, et modo, quo ibidem alumen, sulphur cet. praeparantur, egerunt *); plures tamen ab Auctore Cl. institutae observationes omnino dignae sunt, quo ex iis nonnulla hic addamus, omissis, quae iam alio loco, inferius commemorato, adduximus. Accuratus inprimis Cl. Auctor modum, quo sal ammoniacum natium ibidem obtinetur, et ipsum hoc sal eiusque naturam examinavit. Sunt vero in medio vallis, quam *Solfataram* dicunt

*) vid. Cl. NOLLET Mem. de l'Acad. 1750. p. 97. seq. Comm. nostr. Vol. IV. p. 583. seq. ut Cl. MERCATUM, GEOFFROY etc. taceamus.

dicunt variae fissurae et cryptae, ex quibus perpetuo fumus adscendit, ingrato odore sulphureo praeditus, tussim excitans et coeruleorum florum colorem in rubrum mutans. Has fissuras obtegunt operari variis testarum fragmentis, sine ullo certo ordine sibi inuicem impositis, quo vapor interstitia eorum penetret, quod dum fit, sal ammoniacus verus sublimatus his testarum fragmentis adhaeret. Floccos format, colorem album lutescentem ostendit, qui tamen ab admixto sulphure pendet, quod, dum sal in aqua soluitur, ab eo secedit, atque in initio odorem ingratum acidi sulphurei volatilis habet, quem tamen, breui tempore elapso, amittit. Esse vero hoc sal verum sal ammoniacum, illo, quod in Aegypto paratur, simillimum, chemica, a Cl. Auctore instituta, experimenta probant. Nec difficile est alcali volatilis originem explicare, si modo attendimus, eiusmodi sal in lithantracibus reperiri, et sulphur volatile in adscensu suo salia aliaque corpora secum rapere et inter se combinare posse, quae alias minus volatilia esse soleant. Obtinetur quoque ex lapidibus, in *Solfatara* obuiis, si vi ignis subterranei calcinantur, et aqua deinde iis superfunditur, aqua alumine impraegnata, quod crystallisationis ope deinde separatur. Et sulphur quoque perficitur ibidem apparatu, a Cl. Auctore fusius descripto.

P. 286. 7) *Nouae methodi analyticae computandi eclipses solares.* Commentarius tertius, Auctore Cl. DE SEJOUR.

P. 361. 8) *Commentarius de singulari aberratione in motu Saturni observata,* Auctore Cl. DE LA LANDE.

P. 376. 9) *Commentarius I de praesenti statu tabularum Iouis et de mutationibus, quibus indigent respectu praecipuo-*

principuorum elementorum theoriae, Auctore Cl. JE A U-
R A T.

10) *Observationes de fodina lithantracum*, quae p. 389.
iam per longum tempus ardet. Fodina haec parum
ab vrbe S. Etienne en Fores distat et, vti in multis
aliis similibus fodinis factum est, vel per incuriam,
vel sine vlla externa causa sponte incensa est. Cl.
Auctor hic varia phaenomena, quae in ea obserua-
vit, describit et remedia igni hoc subterraneo extin-
guendo apta, indicat, inter quod praecipuum est ac-
cessus aeris plenarie impeditus.

11) *Observationes astronomicae* ab a. 1760. ad p. 396.
a. 1764. factae a Cl. BAILLY.

12) *Commentarius de mediis instrumenta astrono-* p. 411.
mica ulterius perficiendi, Auctore Sereniss. Duce DE
CHAULNES.

13) *Determinatio distantiae arcturi a limbo solaris* p. 428.
superiore, solstitio aestiuo 1765. ab EODEM Seren.
Duce et Cl. CASSINI instituta.

14) *Comparatio altitudinum solstitialium circa* p. 432.
tropicum capricorni a. 1762. et 1764. factarum cum
illis, quae a. 1743. et 1744. in obelisco gnomonis S.
SULPITII factae sunt. Auctore Cl. LE MON-
NIER.

15) *Observatio oppositionis Iouis et Solis* d. 4. p. 435.
ian. 1764. et correctiones, quae in tabulis Cl. CAS-
SINI fieri debent. Auctore Cl. JE A U R A T.

16) *Commentatio de duratione sensationis visus*, p. 439.
Auctore Cl. D'ARCY. Sensationem visarum re-
rum

rum haud esse momentaneam, sed earum imagines oculo per aliquod tempus obuersari, satis constat. Hac de causa carbo ardens, sufficiente celeritate in orbem gyratus, igneum circulum repraesentat, quia carbo in eundem locum redit, antequam imago eius, ibidem visi, ex oculo discessit. Huius experimenti, noctu instituti, ope Cl. Auctor tempus definiuit, per quod ista visi carbonis sensatio animae inhaeret. Machina, qua usus est, et tentamina copiose describuntur, tempusque, de quo dicimus, octo aut nouem minutorum tertiorum esse demonstratur, atque aliis etiam experimentis magis confirmatur. Addit et alias observationes, interdium, lucente sole, factas, quarum tamen seriem ob tempestatis iniurias ad finem perducere haud potuit.

p. 452. 17) *Commentarius de duabus machinis ad comparandas diuersas frumenti aut fluidorum mensuras cum modio aut congio Parisiensi*, Auctore Cl. TILLET.

p. 460. 18) *Commentarius de usu obseruatorum eclipsium solarium totalium et annularium et de utilitate capiendae ex eclipsi instante partiali d. 16. aug. 1765*. Auctore Cl. LE MONNIER.

p. 465. 19) *Commentarius de conditionibus ad obseruandas immersiones et emersiones secundi satellitis Iouis necessariis*, Auctore Cl. DE LA LANDE.

p. 476. 20) *Obseruatio eclipsis solis d. 16. augusti 1765 facta Colombii a Cl. DE COURTENVAUX*.

p. 480. 21) *Obseruatio de aneurysmate, quod singulares plane effectus produxit*, Auctore Cl. PETIT. In viro quodam 58 annorum oriebatur tumor in dextro colli latere, qui sensim magnitudinem oui columbi-

ni

ni acquirebat. Hunc aneurysma esse pulsus, in eo percipiendus, ostendebat, sedem vero aneurysmatis Cl. PETIT in trunco carotidis non longe a diuisione eius esse coniiciebat. Accuratiore diaeta et renaesectione adhibita, tumor minuebatur, aegri tamen frater, Cl. VIEILLARD, praedixit, tumorem penitus disparituum, arteriaeque cauo concreto, egrum subito morituum esse. Veram hanc prognosin fuisse, euentus docuit. Tumor enim semper minor factus, tandemque in nodum durum, non pulsantem, mutatus est; aeger vero nullum incommodum sensit, nisi difficultatem aliquam in loquendo et maiorem salivae in os affluxum. Post septem tandem annos, vitae genere mutato, subito apoplexia periit. Sectione cadaueris instituta, satis magna copia sanguinis in ventriculum superiorem sinistrum effusa et fissura aliqua profunda et ampla in cerebro aperta est. Vasa quoque omnia, in sinistro capitis latere posita, valde dilatata erant. In dextro vero latere eo loco, vbi aneurysma fuerat, tumor, nuclei salivae magnitudinem habens nullaque cauitate praeditus, deprehendebatur, tota autem carotis huius lateris concreta erat et in ortu suo ex subclauia tumorem aneurysmaticum, magnitudine nucis mochatae, continebat. Addit Cl. Auctor explicationem eorum, quae in aegro hoc obseruabantur, symptomatum, quam omittimus.

22) *Commentarius de variatione inclinationis or- p. 491.*
bitae secundi satellitis Iouis, Auctore Cl. MARALDI.

23) *Commentarius de causa huius variationis, Au- p. 499.*
ctore Cl. BAILLY.

24) *Continuatio historiae inoculationis variolae- p. 505.*
um. Commentarius tertius ab anno 1758 ad an-
Tom. XVII. Pars II. S num

num 1765. Auctore Cl. DE LA CONDAMINE
Enarrantur fata infitionis in Gallia aliisque regioni-
bus et controuersiae circa praestantiam infitionis ali-
asque res, huc spectantes, ortae. Cum praecipua scri-
pta, quae huc pertinent, iam aliis locis enarraueri-
mus, reliqua vero proxime indicaturi simus, indi-
casse sufficiat Cl. Auctorem, qui inter celeberr-
mos infitionis defensores referri debet, ex calculis hoc
quoque in commentario vtilitatem inoculationis e-
periculum, quod a naturalibus variolis aegris immi-
neat, cum ex septem aegris vnus vt plurimum moria-
tur, probare variasque obiectiones refutare.

p. 533. 25) *Commentarius de solutione vniuersali aequa-
tionum cuiuscunque gradus*, Auctore Cl. BEZOUT.

p. 553. 26) *Observatio eclipsis solis d. 16. aug. 1765*
Auctore Cl. LE MONNIER.

p. 555. 27) *Epitome theoriae generalis dioptricae*, Au-
ctore Cl. EULER.

p. 576. 28) *Observationes botanico meteorologicae in
arce Denainvilliers a. 1764. factae*, Auctore Cl. DU
HAMEL.

p. 605. 29) *Commentarius de mutatione inclinationis ter-
tii satellitis Iouis*, Auctore Cl. DE LA LANDE.

p. 609. 30) *Observatio eclipsis solis d. 16. aug. 1765*
in obseruatorio Regio facta a Cl. CASSINI DE
THURY.

p. 610. 31) *Observatio eiusdem eclipsis, a Cl. CHAPPE*
D'AUTEROUCHE facta.

32) *Occul-*

32) *Occultatio duarum stellarum in cauda capri*-p. 611.
visi per lunam d. 1. aug. 1765. Auctore Cl.
 NGRE.

33) *Adnotationes super tritici ramosi variis spe*-p. 613.
bus et hordei ramosi noua specie. Auctore Cl.
 ANSON. Experimentis cum hordeo *) et aliis
 nosis cerealium speciebus institutis, cognouit,
 rietates tantum esse, quae non perpetuae sint, sed
 tura mutantur.

34) *Disquisitiones circa causam pulsus arteria*-p. 620.
 n, Auctore Cl. DE LAMURE, socio Societatis
 giae Monspeliensis. Argumentis et experimen-
 Cl. Auctor probare tentat, causam pulsus in ar-
 tis tactu percipiendi non, vti fere omnes physio-
 i assumunt, in dilatatione arteriae a pressione san-
 nis laterali positam esse, sed arteriam in pulsu
 tum loco suo moueri et motu hoc suo (*déplace-*
nt) digitum explorantis ferire. Haec sententia
 n ea satis conuenit, quam WEITBRECHTUS
 n **) proposuit, licet Cl. Auctor in aliis ab eo
 ferat. Recensitis itaque aliorum physiologorum
 causa pulsus sententiis, pluribus confirmat,
 pressionem sanguinis lateralem non eam dilatatio-
 n arteriae producere, quae oculo vel digito per-
 i possit. Cum enim diastole ad diametrum arte-
 e naturalem sit, vti 1 ad 80, ea in aorta vix $\frac{1}{8}$, et
 arteria intestinorum, cuius motum tamen con-
 cere possumus, vix $\frac{1}{800}$, lineae erit. Addit, nemi-
 n physiologorum, qui arteriam in pulsu dilatari
 cent, hanc dilatationem vidisse, nec experimen-
 n, in quo aqua, siphonis ope in arteriam pulsa, ar-
 iam dilatari obseruarunt, aliquid probare, cum

S 2

cor

) vid. sup. p. 255.

*) vid. Comment. Petropol. T. VII. p. 376. seq. Con-
 fer Ill. HALLER Elem. Phys. T. II. p. 238.

cor non percussione, sed pressione sanguinem pellat. His propositis, Cl. LAMURE sententiam suam variis experimentis ulterius confirmat. A

p. 639. ria crurali duplici ligatura intercepta, inter has duplices ligaturas pulsus percipitur, qui non a sanguinis impetu, sed a arteriam dilatante, oriri potest. Veremur tamen, ne percussio arteriae, a sanguine, in parte arteriae supra ligaturam affluente, excitata, motus huius causa forte fuerit, cum in aliis experimentis Cl. Auctor tremorem tantum aut nullum plerumque motum observare potuerit. Causa autem motus arteriarum omnium, qui pulsus efficit, in commotum posita est, quod, ut notum est, in systole cor suo movetur, costas apice suo ferit et ita pulsus cordis excitat, qui motus deinde arteriis omnibus ita communicatur, ut eodem temporis momento quo cor situm suum mutat, omnes etiam arteriae moveantur et eleventur. Arterias enim maiores quoque in pulsu elevari et aortam cet. a spina dorsali recedere et attolli, experimenta instituta Cl. Auctorem docuerunt. Addit, ut alia omittamus, arteriae ossescentes, quae non dilatari possint, tamen pulsus, pulsus cordis non in diastole eius, sed in systole fieri cet. asseritque, se, digito sub aortam, quae in pulsu eleuabatur et a spina recedebat, inserto, remorem in parte, quae spinam respiciebat, dilatationem percipere potuisse. Quo vero pulsus in arteriis quadam fieri possit, semper requiritur, ut ea tunc habeat eum, qui actioni cordis sufficienter resistere possit, et qui ex influxu fluidi nervi pendeat; enim amisso et arteria flaccida reddita, nullus pulsus fit, vel mollior tantum percipitur. Hinc venae non pulsant, quia tono hoc carent, licet cum corde coniunctae sint. Corde vero vehementius movetur etiam venas pulsare, observationes in asthmate

p. 660. cet. factis, docent. Addit tandem Cl. Auctor

ria corollaria physiologica et pathologica v. c.: ea omnia, quae de systole et diastole arteriarum, effectu earum in sanguinem in sanguificatione, de motu sanguinis in venis, ex motu arteriarum pendente, cet. in physiologia proponuntur, valde dubia esse, motumque horum vasorum, si existat, adeo paruum esse, ne vnquam oculis conspici possit; caussam p. 661. porro, cur in partibus inflammatis saepe pulsus auctus sit, cordis et reliquarum arteriarum motu non aucto, in tensione arteriarum partis inflammatae tonoque earum auctis positum esse; suppurationis mechanismum per alternum vasorum motum non explicari posse; pulsum non semper virium cordis mensuram esse, vel ex eo ad quantitatem sanguinis, per arteriam propulsi, concludi posse, cum pulsus, tensione et tono arteriarum variatis, etiam variare queat. Phaenomenon quoque, in moribundis observandum, in quibus pulsus in extremitatibus primum cessat, et haec cessatio sensim ad arterias cordi viciniores propagatur, ex tono arteriarum per influxum fluidi neruei, sensim sublatum, explicat.

35) *De methodo omni tempore crystallos salis tar-* p. 667.
ari conseruandi, Auctore Cl. MONTET. Continuatio est eorum, quae Cl. Auctor superiore volumine *) proposuit. Docet vero crystallos, methodo eo loco descripta, praeparatas, exsiccandas esse in charta bibula eas circumuoluendo. Conseruantur, si aether vitrioli vel spiritus vini vel oleum ethereum aut oleum expressum purissimum iis superfunditur. In fine varia adduntur, quae in operatione crystallisationis ipsa adhuc obseruanda sunt.

*) vid. sup. p. 263.

Traité de la vitriolisation et de l'alunation, ou
l'art de fabriquer les vitriols et l'alun. Avec
une dissertation sur la mineralisation et sur
l'état du soufre dans les mines et les métaux.
Par Mr. MONNET, Membre de la Soc. roy.
yale de Turin et de l'acad. roy. des sc. art
et belles lettres de Rouen. Avec figures
A Amsterdam, et se trouve à Paris chez Pi
erre François Didot le jeune. 1769. 12
Pl. 13½.

h. e.

Tractatus de arte vitriola et alumen praeparan
di, vna cum dissertatione de mineralisatione
deque statu sulphuris in mineris et metallis
Auctore Cl. MONNET.

Vitriola ex acido vitriolico, cum ferro vel cupro
vel zinco coniuncto, produci posse, constat.
Cum autem haec vitriolorum praeparatio, si magn
eorum copia requiritur, nimis sumtuosa sit, aliaque
in pyritum commutatione consistens, maiorem co
piam sumtu minori largiatur, hanc prae reliquis a
tentione dignam Noster iudicauit, inprimis cum va
riae in isto praeparandi modo res obseruandae ve
niant. Primo itaque de natura et qualitatibus py
ritum agit Cl. Auctor, postea autem de mutatio
nibus eorum in vitriolum exponit, hicque ad tri
inprimis momenta respicit; primo nimirum vitrio
formationem seu, vt dicit, *vitriolisationem*, per s
consideratam explicat, deinde modum, quatenus
vitrioli praeparatio accelerari et vitriola obtiner
possint, communicat, tandem theoriâ harum pra

parationum tradit. Absoluta hac de vitriolo tractatione, formationem aluminis, seu vt loqui amat, *aluminisationem* considerat, ideoque primo de mineris aluminis earumque mutatione in alumen agit, deinde modum, quo in variis locis, inprimis Leodii, praeparatur alumen, pertractat, vltimo autem ostendit, quomodo alumen ex commixtione argillae cum pyritis per artem produci possit. His expositis, dissertationem de mineralisatione et statu sulphuris in mineris et metallis subnectit. Quod ad ipsam tractationem attinet, haec ipsa maximam partem tanquam opusculum bene compilatum considerari poterit. Itaque nonnulla tantum hinc inde decerpere et cum lectoribus nostris communicare liceat.

In praefatione Noster rationem reddit, cur novis vocabulis, nimirum *vitriolisatione* et *aluminisatione*, ad explicandam notionem de vitrioli et aluminis formatione vtatur. Bene itaque monet, grammaticos minime rerum vocabula inuenisse, sed intellectum humanum, prout novas rerum notiones acquisiuerit, conuenientia eis applicuisse nomina, et grammaticos hoc tantum praestitisse, vt id, quod intellectus humanus excogitauit, systematice colligerent, seu coordinarent. Hinc, inuentis novis rebus, noua etiam vocabula ad explicandas rerum notiones inuenire quemque posse, ostendit.

Naturam pyritum dum considerat Noster, hosp. 10. ipsos ex ferro, materia sulphurea et terra argillacea constare, hanc autem in maiori minoriue copia inesse, ita, vt interdum pyrites minorem copiam vitrioli, maiorem contra aluminis praebeant, ostendit. Eiusmodi composito, nimirum ferro hac ratione mineralisato, nec aliis, quibus alia metalla immixta sunt, nomen pyritis competere, autumat, sique pyrites alia praeter ferrum metalla vel in minima co-

- p. 16. pia contineant, naturam eorundem mutari et vitrioli formationem impediri, ostendit. Licet autem pyrites omnes ex ferro, terra argillacea et substantia mineralifante constent, magnum tamen inter hos ipsos discrimen et varietatem esse, notat. Alios enim difficulter admodum, alios contra facile in vitriolum mutari, omneque discrimen a diuersis proportionibus materiarum componentium et imprimis a statu crystallisationis pendere, perhibet.
- p. 17. Pyrites ob qualitatem, qua mutantur in vitriolum, in tres species a Nostro diuiduntur. Alia nimirum in forma cubica, alia in magna mole ceu minerae, alia demum in figura sphaerica, deprehenduntur. Prima species difficulter, altera minori cum difficultate, tertia facile admodum in vitriolum mutatur. Cum vero altera species maiori in copia reperiatur, prima rara sit, et tertia hinc inde quasi disseminata, non nisi cum sumtu colligi possit, pyrites, in forma minerae occurrentes, ad praeparationem vitrioli cum fructu impendi, Noster perhibet.
- p. 23. Si pyrites in vitriolum mutantur, primo incallescunt, deinde intumescunt, tandem expansionem obseruari, hancque vitrioli formationem sequi, constat. In causas horum phaenomenorum inquirens Noster, primo ad acidum attendit, quod in pyritide, vt putat, ad agendum liberum est, quodque, licet materiae inflammabili vnitum sit, mediante tamen aqua, seu incallescuntia, quam intrans vel introducta aqua efficit, separatur; quo facto, in motum ducitur, in materiam inflammabilem agit, atque hanc ipsam insensibiliter destruit, sicque nudum quasi factum, partem metallicam aut ferrum, quibuscum simul pyritide immixtum est, soluit et vitriolum producit. Aquam tamen non nisi subtilissime diuisam, qualis sit aqua, per aerem dispersa, pyrites intrare inque partes subtilissimas eorundem se insinuare

sinuare posse, atque acidum vitrioli sic dilutum, quod concentratum antea ferrum non aggrediatur, hoc posthac soluere, et vitriolum produci, hocque in pyritis non formari, nisi multa aqua eosdem penetrauerit, ideoque vitrioli formationem non nisi lente fieri, prout aqua se insinuauerit, ostendit. Cum spontanea pyritum efflorescentia non nisi tar. P. 32. diffime fieri soleat, calcinationem eorumdem praemittere solent. Haec, vt lenissima sit, nec diu continuetur, necesse est; alias enim ferrum calcinatur, et in crocum mutatur, sulphur autem nimium dissipatur, sicque vitrioli formatio impeditur. Calcinatione facta, pyrites calcinati, vt constat, ad minimum sex menses aeri libero exponuntur, quo efflorescentia rite succedat et vitrioli formatio fiat. Pyrites enim calcinatos, statim post calcinationem si elixentur, vitriolum nullum praebere, sed hoc tantum formari, si aqua ex atmosphaera pyrites intret, experientia docet. Facta tamen efflorescentia, elixatio locum habet, sique pyrites, non sufficienter calcinati, post elixationem restant, iidem denuo calcinantur, aerique rursus exponuntur. Cum autem pyrites interdum sint, qui facile ad formationem vitrioli disponuntur, solam tantum eorumdem contusionem absque calcinatione praemissa suscipiendam Noster suadet, contusos autem in cumulos colligi, sique hi ipsi, quod facile fieri possit, inflammantur, multam aquam affundi et ignem extinguere iubet. Hac autem cautione obseruata, vitrioli formationem non impediri, sed accelerari, perhibet.

His expositis, lixiuiorum decoctionem, in ahe. P. 49. nis plumbeis instituendam, et subsequentem crystallisationem describit, simulque perhibet, quomodo in variis locis vitrioli praeparatio, quae, quoad encheireses, hinc illinc interdum variat et satis nota est, instituatur.

p. 88. De vitriolo coeruleo seu cupri, quod ex minera cupri pura vel lapide cupri lenissime calcinato itidem elixando, euaporando et crySTALLIFANDO paratur, notat Cl. Auctor, calcinationem lenissimam requiri, quo fusio impediatur et acidum sulphuris euoluatur, sicque cuprum solvatur. Ceterum euaporationem seu coctionem lixiuiorum, quae in ahenis cupreis, nec, vt cum vitriolo ferri fieri solet, in plumbeis suscipitur, hanc ob causam institui posse, Noster autumat, quod praecipitatio hic metuenda non sit. Cuprum enim, acido vitriolico unitum, dum coquatur, phlogisto non orbari, siquae foret, vt praecipitetur cuprum, acidum tamen in ahenum cupreum non agere, putat, cum constet, acidum hoc non, nisi concentratum, cuprum soluere.

p. 98. Quod ad vitriolum album seu zinci, ex minera Rammelsbergensi, zincum, plumbum et argentum continente, parandum attinet, nihil hic decerpere placuit, cum paucis verbis praeparationem dicti vitrioli describat, quod prolixius omnino in SCHLÜ-
TERI opere dictum legimus.

p. 105. Absoluta hac tractatione, aluminis formationem describit Cl. Auctor, ideoque de mineris aluminis earumque mutatione in alumen, seu vt dicit, *aluminisatione* earundem, posthac autem de methodo, alumen parandi, agit. Ex his tantum notamus, quomodo per artem cum fructu alumen parari pos-

p. 148. sit. Modus, qui Nostro arridet, triplex est; primo nimirum suadet, partes aequales argillae, in parua frusta redactae, et pyritum commiscere et ex his cum ligno cumulos per strata exstruere sicque calcinare. Cum post primam hanc calcinationem maior quantitas vitrioli, quam aluminis obti-
neatur,

neatur, eosdem cumulos denuo calcinari iubet, quo basis martialis phlogisto orbetur, sicque acidum, liberum factum, cum argilla coniungatur, licet non negandum sit, tunc quoque vitriolum obtineri posse. Calcinatione facta, omnibus bene elixatis, lixiuia alcalina et ea inprimis, quae phlogiston fouent, adfundi suadet, quo vitriolum et lixiuia vitriolica destruantur et aluminis crystallisatio promoueatur. Alter modus alumen obtinendi est, si argilla, bene exsiccata, cum lixiuiis vitriolicis humectatur, dein calcinatur et elixatur. Tertius modus est, si lixiuia vitriolica, quae vitriolum dant et omnem crystallisationem vltro respuunt, cum lixiuiis alcalinis commiscantur. Hac enim ratione, praeter vitriolum, vltimo alumen obtineri, perhibet.

Progredimur cum Cl. Auctore ad dissertatio P. 173. nem de mineralisatione, in qua ostendere annitur, qualis sit sulphuris in mineris combinatio et quae sint in quouis metallo differentiae huius combinationis, vt causae diuersarum operationum eruantur, quas cum mineris instituere cogantur metallurgi. Ad quatuor itaque momenta respicit Cl. Auctor, quae per experimenta probare studet. 1) Sulphur et arsenicum, vt fert communis opinio, vnice pro corporibus mineralisantibus haberi; 2) sulphur in genere maiorem affinitatem cum alcali fixo, quam cum metallis alere; 3) inter metalla ferrum primum locum obtinere, quod cum sulphure affinitatem habeat; post hac autem cuprum, stannum, plumbum, argentum, bismuthum, antimonium, mercurius, arsenicum et cobaltum se inuicem excipiunt. 4) Aurum et zincum nullam affinitatem cum sulphure habere. His prae-P. 178. missis, ostendit, sulphur cum alcali fixo maiorem affinitatem, quam cum ferro, non habere, idque per experimentum demonstrare annitur.

tur. Clavis nimirum ferreis, in crucibulo bene candentibus, aequale fere pondus hepatis sulphuris sicci adiecit, massa posthac fusa et refrigerata, in fundo pyritem nigrum, in superiore vero parte hepar sulphuris, minore quantitate sulphuris, quam antea praeditum, et paruum portionem ferri soluti continens, reperit. Itaque sulphur ob id, quod alcali deserat, et ferro se vniat, maiorem affinitatem cum hoc, quam cum illo, aut ad minimum aequalem habere, coniicit.

p. 207. Sulphur, vt ostendit Noster, eandem fixitatem in cupro, quam in ferro habet. Adeo nimirum cupro adhaerere dicitur sulphur, vt cuprum sulphuratum, si cum alcali fundatur, huius combinationem respuat et ferrum frustra omnino addatur. Hoc enim vel non mutatum restat, vel cum cupro sulphurato coniungitur et mineram cupri, cum ferro mixtam, sistit. Si calcinatur cuprum sulphuratum, phlogiston quidem dissipatur, sed acidum sulphuris ita adhaeret cupro, vt, si fundatur posthac calcinata minera, acidum sulphuris rapidissime phlogiston ex igne arripiat, sicque sulphur, denuo generatum, cum cupro coniungatur, rursusque cuprum sulphuratum obtineatur. Vix itaque nisi maxima cum difficultate cuprum purum per repetitas calcinationes et fusiones ex minera cupri obtinetur; si tamen, cupro sulphurato, ferrum insimulque plumbum addatur, sulphuris separatio expectari dicitur. Cum enim plumbum cum cupro, neque ita cum ferro, coniunctionem amet, accidit omnino, vt, dum cuprum plumbo se vnire tendit, nexus sulphuris cum cupro imminuatur, quo facto, ferrum fortius nunc in sulphur agit, idque eo magis, quo magis nexus sulphuris cum cupro, durante fusione, imminuitur. Ab hac operatione alia et quidem maior vtilitas pendere dicitur, perfecta nimirum argenti a
cupro

cupro separatio. Si enim cuprum purum, argentum continens, cum plumbo funditur, id sane, quam diu cuprum purum est, non nisi maxima cum difficultate argentum a cupro separare potest; sin vero cupro, cum argento mixto, praeter plumbum, sulphur ea quantitate, quae pro sulphurando cupro sufficit, additur, plumbum tunc faciliori negotio argentum separat, quoniam affinitas cupri cum sulphure affinitatem eiusdem cum argento minuit. Ob eamdem rationem eliquatio argenti faciliori negotio instituitur cum cupro nigro, quam cum cupro puro, sulphure orbato. Si porro cuprum, cum plumbo coniunctum, cum sulphure funditur, plumbum, dum cuprum mineralisatur, fundum petit et purum obtinetur. Idem effectus observatur, si lapides cupri, cum plumbo coniuncti, igni exponuntur; ut enim ignis ab illis sulphur separat, sic quoque idem eodem tempore a plumbo separatur, quod eo facilius argentum, si inest, secum abripit, cum plumbum citius, quam cuprum a sulphure liberetur.

Cohaesionem sulphuris seu affinitatem cum metallis sic dictis albis et scalam affinitatis ita Noster definit, ut ferrum et cuprum superiorem locum occupent et aequalem affinitatem habeant, posthac autem stannum, plumbum, argentum, bismuthum, regulus antimonii, mercurius, arsenicum et cobaltum se inuicem ordine excipiant, ita, ut ope ferri ab omnibus his metallis sulphur separari possit. p. 244.

Praeter sulphur nullum aliud corpus, quod metalla in mineras vertit, agnoscit Cl. Auctor. Arsenicum enim, ut recte monet, nequaquam metalla in mineras conuertit, sed, si purum est et cum metallis coniungitur, regulum metallicum compositum, nec mineram praebet. Sin vero minerae reperiantur, quibus arsenicum insit, tunc metallorum mineralisa- p. 265.

ralisationem, ope sulphuris, cum arsenico coniuncti, nec ope arsenici fieri, monet.

p. 279. Quod tandem ad quaestionem attinet, vtrum metalla, cum sulphure coniuncta, sub forma metallica, id est, phlogisto vnita, an sub forma calcis coniunctionem ineant, priori Noster assentiri non dubitat, licet calces nonnullorum metallorum cum sulphure per artem coniungi interdum posse, non neget.

X.

IOSEPH IACOB PLENKS, *der Wundarzney und Geburtshülfe Meisters, Anfangsgründe der Geburtshülfe. Erster Theil: die Lehre der natürlichen Geburt. Zweyter Theil: die Lehre der harten und widernatürlichen Geburt. Wien in der Graefferischen Buchhandlung. 1768. 8. 1 Alph. 6 pl. tab. aen. 2.*

i. e.

IOSEPHI IACOBI PLENK, chirurgiae et artis obstetriciae magistri, elementa artis obstetriciae. Pars prior doctrinam de partu naturali et pars posterior doctrinam de partu difficili et praeternaturali comprehendens.

In hoc vtili et eleganti compendio Cl. Auctor ea, quae physiologicam theoriam artis obstetriciae spectant, breuiter tantum tradidit, doctrinam vero de grauidarum, parturientium, puerperarum et puerorum morbis plane omisit, ne libri moles nimium augeatur et ea hic exponantur, quae magis ad medici, quam ad chirurgi obstetricii munus pertinent. Instrumentorum applicationem non ibi tradit, vbi de

de speciebus partus difficilioris, quae eam exigunt, exponit, sed singulari disputatione de iis differit, quae circa forcipis, perforatorii cet. vsum monenda sunt. In vniuersum optimis inter recentiores scriptoribus de arte obstetricia vsus est, plura tamen tum ex suis, tum ex Cl. LEBMACHERI, qui Vienneae artem obstetriciam docet, obseruationibus addidit.

In partu difficili in feminis sanis et in cacochy- p. 9.
micis ossa peluis diduci, autumat Noster. Mensu- p. 10.
rae peluis, hic propositae, a mensuris, quas alii tradi-
derunt, parum recedunt. Orificium vteri clausum p. 30.
signum grauiditatis esse, plane negat. In iis enim,
quae saepius iam pepererunt, illud, inprimis vltimis
graviditatis mensibus, ita apertum est, vt digito ex-
plorantis saepe membranae ipsae tangi possint. In
aliis vero per omnem fere grauiditatem clausum ma-
net. Hinc in grauiditatis signis examinandis, Cl.
Auctor magis ad duritiem vel mollitiem huius orifi-
cii, quam ad os vteri clausum vel apertum attendit.
Est enim illud in femina non grauida, vel si fetus
extra vterum in tuba aut ouario haeret, nec non si
molam vterus continet, duriusculum et quasi cartila-
gineum atque in acumen terminatur, nec in latitu-
dinem expanditur, vti in grauido vtero esse solet.
Placentae fabricam eiusque cum vtero cohaesionem p. 45.
ex HUNTERI obseruationibus describit, quae Ill.
HALLERUS Elementis Physiologiae inseruit *).
Caput fetus in grauiditate non subito, sed sensim, p. 50.
versus os vteri deflecti, cum recentioribus assumit.
Circumuolutione vero hac peracta, fetus vehemen-
tius mouetur et species dolorum spuriorum oritur.
Fetu excluso, orificium vteri, laxo et abscisso intesti- p. 62.
no simile, in vagina pendet, labiumque eius poste-
rius semper longius et tenuius anteriore deprehen-
ditur.

*) vid. Tom. VIII. Additament. p. 220.

- p. 66. dicitur. Ipsa proxima partus naturalis causa adhuc latet, a qua praeternaturalis causa, quae abortum vel partum praematurum efficit, praeternaturali scilicet uteri irritatio, probe distingui debet. Plenaria extricatio omnium fibrarum carnearum uteri non proxima, sed praedisponens tantum causa in utero est. An forte pondus fetus eiusque artus irritabilitatem partium, quarum contractione partus
- p. 107. absoluitur, excitant? Ex funiculo abscisso, si fetus facies coeruleum colorem habet et tumet, aliquot sanguinis uncias emittere iubet, quae sanguinis missione apoplexia sanguinea, quae eiusmodi pueri imminet, optime praecauetur.
- p. 127. In altera libri huius parte, qua de iis, quae in partu praeternaturali et difficili observanda sunt Auctor Cl. exponit, praeternaturalem partum non eum vocat, qui pedibus praeuiis fit, sed eum, in quo fetus pedibus vel instrumentorum ope educitur. Si pelvis apertura superior angusta sit, inferiorem ut plurimum ampliore et vice versa esse, quod LEBMACHER iam docuit, Cl. Auctor confirmat. Ex ostiosum in pelvi partus difficilis causam fuisse et in osse temporis fetus foueam inde natam esse, Cl. LEBMACHER observavit. Inter causas quoque partus difficilius Cl. Auctor rigiditatem seu duritiem cartilagineum refert, quibus ossa pelvis inter se coniunguntur, quae a se invicem in partu recedere putat.
- p. 153. Vaginam adeo angustam, ut vir in coitu nunquam penem immittere posset, Cl. Auctor, femina haec grauida facta partuque imminente, sponte ita intra decem et octo horas dilatari vidit, ut partus feliciter
- p. 153. perageretur. Vaginam, in media parte coalitam, Cl. LEBMACHER, sectionis ope, in partu ipso subsequente diuisit. In alia hymen, cartilagineum quasi factum, conceptionem non impediens, sed partum retardabat, qui, dissecta hac membrana, forficis ope
- feli-

feliciter procedebat. In agripparum partu grauida-p. 159.
 que conuulsionibus correpta, pedibus iam et trun-
 co progressis, caput tamen et brachia spasmodica va-
 ginae constrictione ita retinebantur, vt Cl. Auctor
 brachia difficulter tantum soluere, nec, nisi conuul-
 sionibus sopitis, caput extrahere posset. In inflam-p. 169.
 matione orificii vterini, quae sub partu difficili acci-
 dit, iniecta *aqua vegeto-mineralis* GOULARDI in-
 signem vsum praestitit. Vaginam dilaceratam ori-
 ficiūque vteri, a vagina separatum, vidit Noster, ex
 nimis violenter tentata refusione brachii prolapsi.
 In haemorrhagia vteri tinctura cinnamomi, quam p. 196.
 SWIETENIUS Ill. *) commendauit, Noster in-p. 200.
 signi cum fructu vsum est, asseritque se plures hae-
 morrhagias hoc remedio compescuisse, ea excepta
 specie, quae ex situ placentae super orificio vteri
 oritur; in qua tamen hoc remedium debilitatem,
 vomitum et lipothymias leuat. Dolores quoque
 ad partum veros hac tinctura excitari, experientia
 Auctorem docuit. Leuem haemorrhagiam sub par-p. 201.
 tu ex rupto vasculo orificii vterini et in alia puerpe-
 ra ex vase, in orificio vaginae sito, oriri vidit. In
 utroque tamen casu haemorrhagia sponte sistebatur.
 Praegnantēs conuulsionibus ultimo grauiditatis p. 216.
 mense, vel mox ante partum, correptae, fere omnes
 pereunt. Plures tamen seruari posse, experientia nos
 docuit. Si nulli ad partum dolores adsint, os coccygis
 reprimat et hac retropressionē dolores excitare ten-
 tat. Puerperam, quae statim a partu conuulsioni-
 bus

*) vid. Comm. in Aphorism. Boerhav. T. IV. ad
 §. 1327. *Bonum effectum vidi si unciam mediam tin-
 cturae cinnamomi in unciis sex aquae stillatitiae melissae
 vel similis diluerem, et cochlear talis mixturae omni bi-
 horio exhiberem. Refocillat tale remedium, roborat,
 nec tamen motum sanguinis augendo nocet.*

bus afficiebatur, venaeſeſſione bis inſtituta maxima-
 que naphthae vitrioli doſi exhibita, Cl. Auct̃or prae-
 p. 237. ſentaneo eripuit periculo. Suturarum coalitum in
 capite fetus fieri et partus difficilis cauſſam eſſe poſ-
 p. 238. ſe, variis obſervationibus confirmatur. Humeros
 ſaepe in fetu iuſto latiores et partus difficilis cauſſa
 eſſe poſſunt, quod ROEDERERUS rariffime tan-
 p. 241. tum accidere aſſeruit. Si fetus abdomen, aqua in
 eius cauitate collecta, turget, fetusque adhuc viu-
 ope acus triquetrae longiſſimae canali incluſae *) ab-
 domen eo in loco, in quo paracenteſis inſtitui ſolet
 Noſter aperire, aquam emittere et partum deinde
 abſoluere iubet. In mortuo vero perforatorium
 vulgare ſufficit, nec forfex incurua a WALLBAU-
 MIO delineata neceſſaria eſt **). In partu fetus vi-
 vi capite praeuiſo, Cl. Auct̃or meconium excerni vi-
 dit, cuius tamen excretio, vt plurimum, inter ſigna
 fetus mortui, vel debilis, aut natibus praeuiſis proce-
 p. 272. dentis numeratur. Si fetus vero natibus primum
 progreditur, ſemper verſionem inſtituit, ſi ea adhuc
 fieri poteſt, nec vnquam partum naturae relinquit
 In puellis, tali partu editis, ex compreſſione clitoris
 nonnunquam ita intumeſcit, vt eiſmodi puellae pro
 pueris habitae et baptizatae fuerint. Egregia pro-
 feſto ſunt et quae imitentur digna, quae de verſio-
 ne et ſitu fetus incommodo in rectum dirigendo Cl.
 Auct̃or monet. Proponit enim varios modos, eos
 peruerſos ſitus fetus, in quibus pedes difficulter
 prehendi poſſunt, facili negotio in alium commo-
 diorem

*) A FRIEDIO patre ad veſicam aquarum aperien-
 dam propoſita eſt. Vid. THESES. tab. XVIII
 fig. 29. §. 332.

**) vid. EIUSD. Verſionem Germanicam libri Cl. LE-
 VRET cui titulus: obſervations ſur les cauſes des ac-
 couchemens labor. p. 461. Conſer Comm. Suppl. Dec. I.
 p. 648.

orem mutandi. Veremur tamen, ne haec omnia
 ntum ibi succedant, vbi adhuc aliqua aquarum
 ortio adest, refusionesque eiusmodi seu *praepara-*
ones, vti Galli loquuntur, adhuc fieri possunt.
 ulti enim, quae ad optimas artis regulas excogi-
 ta sunt, et si experimentum in machina (*phanto-*
e) feceris, optime succedunt, in vtero parturien-
 , arctius circa corpus fetus contracto, (vti etiam
 se Cl. PLENK alio loco monet) nullo modo fie-
 possunt. Tentanda tamen sunt ea, quae hac de
 Cl. Auctor passim *) profert, cum, licet non
 mper, tamen nonnunquam succedere forte que-
 t. In versione, imprimis si abdomen fetus orifi-
 am vteri respicit, pedes non nimia violentia attra-
 debent, ne caput subito resiliat, ex qua re lipo-
 ymiam ortam fuisse, Cl. LEBMACHER obserua-
 . Methodum, a Cl. ADOLPH propositam, fu-
 culum vmbilicalem intra ipsum vterum, si fetus,
 lo circumuolutus, partum impediat, dissecan-
 **), nunquam in partu ipso applicari posse, recte
 met. Quodsi enim caput nondum descenderit,
 um hoc non perfecte cognosci, eo vero descenso,
 nus non immitti potest. Hinc Cl. Auctor par-
 n hunc naturae potius permittit, vsque dum ca-
 e vagina emineat, vbi vel funem soluit, vel dis-
 at, fetumque cito extrahit, et aliquot cochlearia
 guinis e fune dissecto profluere finit, cum alias
 smodi fetus apoplectici pereant. In funiculo p. 340.
 olapso ex quinquaginta fetibus vix vnum LEB-
 ACHERUS obseruare potuit. Idem Cl. Vir in p. 353.

T 2

par-

) v. c. p. 285. 289. 296. 297. 304. 306. 323. 329.
 334. cet.

*) Manum cultello armatam immittere, funem disse-
 care et versus fetum ligare iubet. vid. I. T. ADOLPH
 diff. de funiculo vmbilicali vel intra vterum ligando.
 Helmstadii. 1767. 4. Hoc tamen a Beat. Auctore
 nunquam in partu ipso tentatum, sed in museo tan-
 tum excogitatum esse, facile patet.

- partu feminae, in qua pelvis amplissima erat, placenta, ante caput dolorum vi ad exitum usque pelvis propulsam, vidit, placenta perforavit, fetumque per ipsam placenta protraxit, quod, nisi in hoc unico casu, si placenta orificio accreta sit, ob insignes vasorum ramos, qui sub hac perforatione dilacerantur, fieri debere, Cl. Auctor recte docet. Placentam in utero Cl. LEBMACHER ad 15 dies sine noxa insequente remanere vidit. In inuersione uteri repositione digiti non mediae tumoris parti applicandi sunt, sed margini uteri et ita inuersus uterum sensim iterum a margine incipiendo inuertendus est. Monet Cl. Auctor, sub hac operatione feminas saepe deliquium animi pati, imo nonnullas quam perire, quod insigni nervorum cerebri cum nervis cordis et pulmonum consensu adscribit, idque ex letalitate vulnerum uteri, ex subitanea morte nonnullarum feminarum in coitu immoderato, in quibus nulla apoplexiae signa aderant et feminae exemplo probat, quae post repositionem uteri prolapsi subito conuulsa periit. In partu gemellorum funiculum fetus primo progressi versus placenta, ante fetus secundi partum, ligandum esse putat, quod tamen non necessarium esse, putamus cum, vel in hoc casu, placenta, fetu, ad quam pertinet, excluso, sanguinem fugere desinat. Pluribus exponit Cl. Auctor signa fetus viui, mortui aut sub ipso partu mortui, quae tamen cum iam maxima ex parte nota sint, omittimus. Partum ad decimum sextum mensem nonnunquam protrahi posse putat. Instrumenta, quorum applicationem decem sunt: forceps Leuretiana et perforatorium (LEVRETII*). Describit quoque euacuationem thoracis et abdominis, quam dissectioni fetus, ab aliis descripta praefert. Visceribus enim thoracis et abdominis

*) Perce-crane à deux lames.

protractis, spatium paratur ad manum immittendam
 ersionemque instituendam, quam methodum disse-
 ctioni spinæ dorsi, quæ periculi plena, nec semper vti-
 lis est, omnino praeferimus. **S M E L L I I** forcipem in p. 418.
 o tantum casu adhiberi posse putat, vbi caput iam in
 eluim descenderit, quod de breui et recta tantum
 alet. In duabus tabulis aeneis instrumenta, qui-
 us Auctor Cl. vtitur, sellaque et lectulus obstetri-
 us delineantur.

XI.

istoria naturali degli uccelli trattata con meto-
 do e adornata di figure intagliate in rame e
 miniate al naturale, Tomo primo. Al Al-
 tezza Reale del Serenissimo Pietro Leopoldo
 Principe Reale d'Ungheria e di Boemia,
 Arciduca d'Austria e Granduca di Toscana.
 In Firenze l'anno 1767 nella stamperia Mou-
 ckiana. fol. maior. 1 Alph. 2 pl. tab. aen.
 CXX. viuis coloribus pictae.

h. e.

nithologia methodice digesta atque iconibus
 aeneis, ad viuum illuminatis, ornata. Tomus
 primus. Ad Regiam Celsitudinem Serenif-
 simi Petri Leopoldi Regii Principis Hunga-
 riae atque Bohemiae, Archiducis Austriae,
 Magni Ducis Etruriae etc.

ta est historiae naturalis nostro seculo felicitas, vt
 non solum corporum naturalium cognitio in
 plurimorum labore et inuentis augeatur, sed et
 melior reddatur atque descriptionibus accuratissimis
 elegantissimisque figuris illustretur. Hoc vero, vti

omnibus historiae naturalis partibus, ita prae ceteris
ornithologiae contigisse fatendum est. Quem enim
ea fugiunt, quae intra paucos annos FRITSCHIUS
EDWARDUS, BRISSONUS et quorum librum
proxime indicaturi sumus BUFFONUS et
D'AUBENTON hac in re praestiterunt, quorum
industria multae iam cognitae aues, accuratius descriptae
et depictae, pluresque plane, vel ex parte,
cognitae in lucem protractae fuerunt. Atque inter
hos, qui nostro seculo avium historiam felici successu
coluerunt, clarissimos viros referendus quoque
est Ill. IOANNES GERINI Marchio et Patricius
Florentinus, qui anno huius seculi quinquagesimo
primo e viuis discessit. Hic enim multo studio, et
sine parvis sumptibus, magnam copiam picturarum
collegit, in quibus plurimas aues easque rarissimas
depingendas curavit. Vfus vero est hac in re pos-
simum arte pictoris egregii Cl. IOANNIS FERRETTI.
Ne autem eruditus orbis frustraretur
et voluptate ex his tabulis capiendis, annuentibus
haeredibus defuncti, Cl. Viri XAVERIUS MONTANETTI,
LAURENTIUS LAURENTI et VINCEN-
TE VANNI harum figurarum editionem in-
susceperunt, ea ratione, ut totum opus, cuius pri-
mum volumen indicamus, sex constaret voluminibus
comprehenderetque ultra centum avium iconum
a GERINO collectas, passim tamen aliis figuris, a
ceteris communicatis, quae vero, asterisco adiecto, a
CASSINIANIS distinguuntur, auctas. Omnes autem fig-
urae ad RAII fere methodum dispositae sunt, pri-
mumque hoc volumen *falconis* LINNAEI genera
ad quod ille *aquilas* refert, *vulturis* porro, *strigibus*
lanii genera, omnemque hac ratione accipitru-
LINNAEI ordinem continet; quibus addita sunt
paradisaeae, *cuculi* et *caprimulgi* genera atque plu-
rimae *psittacorum* species. Singulis voluminibus f

mones de rebus diuersis, ad historiam auium natura-
lem spectantibus, praemittentur, quem excipient
ipae auium in tabulis delineatarum descriptiones,
additis nominibus et definitionibus aliorum Aucto-
rum, nec non Gallicis Anglicisque, nominibus. Ita-
lica et latina lingua exaratae sunt, nec in iis figurae
tantum et colorum delineationem verbis expressam
inuenies, hanc enim picturas adiectas superuaca-
neam reddere, Cl. Auctor arbitratur; sed magis de
moribus, vñbus oeconomìcis aliisque proprietati-
bus harum auium, ad quae alii v. c. BRISSONUS
cet. non attendunt, agitur, breuiter tamen, nec
ita, vt multae nouae obseruationes ibidem reperian-
tur. Descriptionibus auium, quae ad singula gene-
ra pertinent, ex aliis Auctoribus additae sunt eae
species, quarum figurae hic desiderantur. Occur-
runt tamen in figuris et descriptionibus plures aues,
quae non species, sed varietates tantum sunt. Figu-
rae plurimae satis elegantes nobis visae sunt, prae-
stantiae tamen gradu ita differunt, vt nonnullae ex
iis vix mediocres dici queant.

Primo huic volumini praemissa est dilucidatio et
definitio vocum, quibus ornithologiae scriptores,
vti solent, plurimaeque Auctorum systemata breui-
ter delineantur. Continet hic tomus CXX tabulas,
in quibus sequentes aues depictae sunt: Tab. I. *Aquila*
regia communis siue *chrysaëtos vulgaris*, *aquila chrysaë-* P. 35.
tos BELLONII (an *falconis chrysaëti* LINN. varietas?) pe-
dibus non lanatis. Tab. II. *Falco chrysaëtos* LINN.
Tab. III. *Falco melanaetus* LINN. Tab. IV. *Aquila ra-*
pax ex albo maculata, siue *naeuia* (an praecedentis varie-
tas?). Tab. V. *Aquila Etrusca* siue *aqua corpore*
fusco, *capite colloque toroso*, *rostro pedibusque coeru-*
lescentibus Auctoris (an femina prioris?). Tab. VI.
Pullus aquilae (*chrysaëti*). Tab. VII. *Falconis ful-*
vi LINN. Syst. XII. varietas β *Canadensis*. Tab. VIII.

Falco leucocephalus LINN. Syst. XII. Tab. IX. *Vultur niger* siue *leporarius* Auctoris (an der große Lämmergeyer Heluetiorum – *vulturis aurae* varietas?). Tab. X. *Vultur percnopterus* LINN. *fulvus baetico Bellonii* congener RAILL. Tab. XI. *Vultur barbatus* LINN. Tab. XII. *Vultur papa* LINN. Tab. XIII. *Vultur aura* LINN. Tab. XIV. *Vultur aquilinus cinereus* Auctoris; an femina *falconis montani Aegyptiaci* HASSELQUISTII, quem LINNAEUS ad *vulturem percnopterus* refert? Habitat in Etruriae maritimis, et boum ibi pascentium dorso infidet eosque ab insectis, in cute eorum nidulantibus, liberat. Tab. XV. *Vultur aquilinus fuscus* Auctoris an *vulturis percnopteri* LINN. varietas? Tab. XVI. *Accipiter fringillarius vulgaris*, *sparuerius recentiorum*, an *falconis nifus* LINN. femina? Tab. XVII. *Accipiter fringillarius minor*; an *accipiter minor* BRISS. *falco minutus* LINN.? (an non potius *mas falconis nifus*?) Tab. XVIII. *Accipiter emerillus* s. *smerillus mas*; *aesalon* BRISS. (an *accipiter nifus* LINN.) Tab. XIX. *femina prioris*. Tab. XX. *Accipiter muschetum* vulgo et *Aldrouando dictum* referens (*accipiter nifus*, LINN. sed multum a prioribus tab. XVI – XIX differt.) Tab. XXI. *Falco palumbarius* LINN. femina. Tab. XXII. Idem *accipiter palumbarius* nouis pennis obductus. Tab. XXIII. *Falco peregrinus* GESNER. BRISSON. cet. (an *falco barbarus* LINN.? sed cera obscura est.) In Italiam ex Graecia transmittitur, mitis est, et ad hominum nutus facile venatur. Tab. XXIV. *femina eiusdem*. Tab. XXV. *Accipiter peregrinus alter*; an *Falco barbaricus* s. *scythicus* vel *tartaricus* Auctorum. Tab. XXVI. *Falco lanarius* LINN. Tab. XXVII. *Falco barbarus* LINN. Tab. XXVIII. *Falco sacer dictus* Auctorum. Tab. XXIX. *Falco gentilis* LINN. Tab. XXX. *Accipiter albus moscouiticus ex nigro maculatus*; an *falco gyrfalco* LINN.

LINN. Tab. XXXI. *Falco pygargus* LINN. femina.
 Tab. XXXII. *Falco boeticus* rostro magno aquilarum
aemulo (varietas forte *falconis lanarii* LINN.) Tab.
 XXXIII. *Falco boeticus capite albo*; superioris varie-
 tas; an *falconis leucocephali* BRISS. variet C. spec. 4.
 Tab. XXXIV. *Falco gibbosus*, BRISS. variet B. spec.
 4. Tab. XXXV. *Falco vulgo Albanella dictus*, an *falco*
albus BRISS. Tab. XXXVI. *Falco Albanella rufe-*
scens dictus. Tab. XXXVII. *Falco Albanella torquata*
dictus, an *falco buteo*. LINN. Tab. XXXVIII. *Falco*
miluus corpore supra fusco, subtus albido, maculis longi-
tudinalibus fuscis, cauda integra Tab. XXXIX. *Falco*
miluus LINN. Tab. XL. *Falco haliaetus* LINN. Tab.
 XLI. *Falco aquilinus fuscus*. Tab. XLII. *Falco aqu-*
linus rufescens. Tab. XLIII. *Falco aquilinus aetate*
canescens. Tab. XLIV. 1. *Falco coerulescens*, LINN.
 2. *Falco hudsonius* EIUSD. Tab. XLV. *Falco in Etru-*
ria Barletta dictus. Tab. XLVI. *Falco vulgo in Etru-*
ria Barletta cinerea, siue plumbeo colore. Haec et p. 66.
 quae in sequentibus tabulis delineantur species seu
 potius varietates gregariae sunt, et in vna grege
 plures coloribus multum inter se discrepantes con-
 spiciuntur. Tab. XLVII. et XLVIII. sunt varietates
Barlettæ. Tab. XLIX. *Falco tinnunculus* LINN.
 Tab. L. Varietas *Tinnunculus cauernalis* siue *monta-*
nus. Tab. LI. Varietas *Tinnunculus murorum* vel *tur-*
rium. Tab. LII. Mas vel varietas eiusdem. Tab. LIII.
Lanius excubitor. LINN. Tab. LIV. Varietas prioris
 vel *lanius Ludouicianus* LINN. Tab. LV. 1) *Lanius*
collurio. LIN. 2) *Collurio varius*, BRISS. an prioris
 varietas? Tab. LVI. *Lanius ferrugineus maior*, f.
lanius maior capite rufo Auctoris. Tab. LVII. 1) *La-*
nus caerulescens LINN. *Lanius senator* LINN. Syst.
 X. 2) *Lanius cristatus*. Tab. LVIII. 1) *Lanius sul-*
phuratus LINN. BRISS. 2) *Ampelis carnifex* LINN.
 Tab. LIX. *Lanius rufus* LINN. Tab. LX. 1) *La-*
 T 5 nius

nus Madagascariensis coeruleus BRISS. 2) *Lanius curvirostris* LINN. Tab. LXI. *Lanius Senegallus* LINN. *Senegalensis ruber* BRISS. Tab. LXII. 1) *Lanius Manillensis* BRISS. 2) *Lanius Canadensis* LINN. Tab. LXIII. *Paradisea apoda* LINN. Tab. LXIV. 1) *Manucodiata nigra falso existimata* (an *muscicapa paradisi* LINN.?) 2) *Paradisea pedibus resectis*, vt in museis vulgo asseruatur. Tab. LXV. *Alia avis paradisiaca falso existimata.* 2) *Vidua Brasiliensis*, an *emberiza paradisaea* LINN.?) Tab. LXVI. *Paradisaea regia* LINN. Tab. LXVII. *Cuculus canorus* LINN. Tab. LXVIII et LXIX *eiusdem* varietates. Tab. LXX. *Cuculus glandarius* LINN. Tab. LXXI. *Cuculus ex nigro et albo mixtus cristatus*; quae species exotica quidem est, sed tamen 1739 circa Pisam nidificauit. Tab. LXXII. *Cuculus niger* LINN. Tab. LXXIII. *Cuculus Persa* LINN. Tab. LXXIV. *Cuculus Coromandanus* LINN. Tab. LXXV. *Cuculus paradiseus* LINN. Tab. LXXVI. *Cuculus Mindanensis* LINN. Tab. LXXVII. *Cuculus cristatus* LINN. Tab. LXXVIII. *Cuculus caeruleus* LINN. Tab. LXXIX. *Cuculus vetula* LINN. Tab. LXXX. *Cuculus Sinenfis* LINN. Tab. LXXXI. *Strix bubo* LINN. Tab. LXXXII. *Bubo minor* f. *vulgaris*. Tab. LXXXIII. *Bubo alter* seu *pennis mutatis*. Tab. LXXXIV. *Bubo Virginianus* BRISS. Tab. LXXXV. *Strix otus* LINN. Tab. LXXXVI. an *Strix funerea* LINN.? Tab. LXXXVII. *Noctua flaua* seu *syluestris* varietas prioris. Tab. LXXXVIII. *Noctua cinerea* (varietas). Tab. LXXXIX. *Noctua alba*. Tab. XC. *Noctua Canadensis* BRISS. quam LINNAEUS ad *strigem funeream* refert. Tab. XCI. *Strix aluco* LINN. Tab. XCII. *Aluco albus* varietas. Tab. XCIII. *Strix nyctea*. Tab. XCIV. *Strix aluco* Auctoris forte etiam ad speciem a LINNAEO ita nominatam pertinet. Tab. XCV. *Strix stridula* Auctoris. Tab. XCVI. *Strix rufa* praecedent-

cedentis forte varietas. Tab. XCVII. *Strix falco noctuæformis dicta*. Tab. XCVIII. *Strix freti Hudsonis* BRISS. Tab. XCIX. *Caprimulgus Europæus* LINN.. Tab. C. eiusdem varietas β . LINN. Tab. CI. *Psittacus seuerus* LINN. Tab. CII. *Psittacus macao* LINN. Tab. CIII. *Psittacus ararauna* LINN. Tab. CIV. *Psittacus domicella* LINN. Tab. CV. *Psittacus lory* LINN. Tab. CVI. *Psittacus garrulus* LINN. Var. γ . *Moluccensis* BRISS. Tab. CVII. *Psittacus Brasiliensis viridis capite coeruleo et albido*. Tab. CVIII. an *psittacus nobilis* LINN.? Tab. CIX. *Psittacus viridis Brasiliensis capite albo*. Tab. CX. an *Psittacus Carolinensis* LINN. Tab. CXI. *Psittacus flavus maculis subviridibus conspersus, fronte albida Brasiliensis*. Tab. CXII. *Psittacus erithacus* LINN. Tab. CXIII. *Psittacus Guineensis cinereus rubro varius* EDWARDS. Tab. CXIV. an *psittacus amazonicus* LINN. Tab. CXV. *Psittacus aestivus* LINN. Tab. CXVI. *Psittacus Brasiliensis* LINN. Tab. CXVII. *Psittacus cristatus* LINN. seu *cacatua*. Tab. CXVIII. *Psittacus (cacatua) rubro cristatus* BRISS. Haec avis in p. 96. vivario magni Ducis Etruriae ad minimum 133 annos vixit. In eodem vivario extat *araraunae* species adhuc incolumis, quae annos supra centenos iam ibi viuit. Tab. CXIX. *Cacatua minor* BRISS. Tab. CXX. *Psittacus accipitrinus* LINN.

XII.

ANTONII STÖRCK, Sacr. Caes. Reg. Apost.
Maiestatis Consiliarii aulici, archiatri, nec non
in nosocomio ciuico Pazmariano physici, li-
bellus, quo continuantur experimenta, et
obseruationes circa noua sua medicamenta.
Vindobonae, typis Ioan. Thom. de Tratt-
nern, Caes. Reg. aulae typogr. et bibliopolae,
1765. 8 mai. pl. 18.

p. 2. **L**audabili sane instituto, Cl. Auctor, et indefesso
labore, salutares effectus medicamentorum suo-
rum, *cicutae* scilicet, *aconiti*, *colchici*, *hyoscyami* et *stra-*
monii, nouis obseruationibus, octo huius libelli capi-
tibus comprehensis, vberius explicare et confirmare
suscepit: in quo istas tamen, quibus stramonii vsus,
in melancholicis et epilepticis morbis, magis pro-
bari, commendarique potuisset, aegerrime prorsus
desiderauimus.

p. 7. Praemissis igitur capiti primo cautelis, quibus,
ante propinationem venenatarum suspectarumque
plantarum, semper vsus est Cl. Auctor; et exposito
capiti secundo *cicutae verae* charactere essentiali,
foetore scilicet murium domesticorum, quem planta,
loco calido flaccescens, vel inter digitos contrita,
vndique spargit; illam totam fere absque vlla prae-
paratione tuto exhiberi, et conseruam quoque, sy-
rupum atque oleum coctum, nec non aquam destil-
latam fragrantissimam, ex Cl. LEBERI inuentione,
in curandis pessimis vlceribus, decocto vel infuso
ipso plus, quandoque efficientem, et inde parari
posse, docet. Et caput tertium demum obseruatio-
nes ipsas, quibus *cicutae* utilitas comprobatur, vno
plus, quam triginta exemplis proponit. Quae cum
omnia recensere nequeamus, notamus saltem, No-
strum

strum hanc in mammae scirrhis dolentibus, cancro-
 fis cas. I. XXVI. XXVII; eiusque exulceratione cas.
 IV; cancro nasi aperto cas. II; exostosis articulo-
 rum pedum, cum foedissimis vlceribus et carie cas.
 III. XV; foedissimis oris fauciumque serpentibus vl-
 ceribus, vna cum veli palati penduli pluribus in lo-
 cis perforatione, aphthisque pessimis cas. V. VI;
 glandulis colli, axillarum mammarumque, cas. VII.
 VIII. scirrhis cancrofis; cum febre lenta et
 sputis foetidis cas. XIV; nec non cum capitis dolo-
 ribus et respiratione sibilosa cas. XXIX. coniunctis;
 item in tumoribus hypochondriorum, ventrisque
 duris cas. XVII. XVIII. XX; in visu debili cum pupil-
 larum dilatatione cas. IX. optimo cum successu adhi-
 buisse: cum contra pueri duodecim annorum glan-
 dulas submaxillares partis dextrae induratas, annuo
 licet cicutae vsu, parum tantum imminuere cas.
 XXVIII; aegrumque visu debili et oculorum bulbis
 difformibus, protuberantibus cas. X. praeditum,
 aliumque, in cuius oculi sinistri pupilla valde dilatata
 corpus ex flauo coeruleum, subpellucidum, rotun-
 dum haerebat, cas. XI. eodem remedio prorsus non
 restituere posset. Sic quoque in spina ventosa cas.
 XII; rhachitide cas. XIII; gonorrhoea inueterata
 cum bubonibus in vtroque inguine cas. XIX; vrinae
 mucosae foetidae reddendae difficultate, cum testi-
 culis induratis tumidis cas. XXII; fluore albo mali-
 moris cum vteri orificio dolente ardenteque cas.
 XXIII. saluberrimos effectus, integrae scilicet sani-
 tatis restitutionem, praestitit. Praeterea diuturnos
 etiam dolores rheumaticos cas. XVI; cum articulo-
 rum rigiditate et melancholia coniunctos cas. XXIV;
 verrucae exulceratae vlcus, foetorem intolerabilem
 spargens cas. XXI; aliudque eiusmodi cancrosum
 vlcus manus dextrae foetidissimum cas. XXX. integre
 sustulit. Eademque hac planta feminam triginta
 annorum,

annorum, ex octo septimanis vomitu omnia reiicientem cas. XXV. paucis diebus integre restituit; et binos pueros a natiuitate fere turpissima tineae capitis, et foedissima scabie laborantes cas. XXXI. quinque septimanarum spatio insigniter iam alleuauit. De quibus omnibus quidem Cl. Auctori sincere gratulamur, dolemus vero largum, diuturnum, frequentissimumque *cicutae verae* usum restitutionis loco, spem nostram in eiusmodi casibus saepenumero fefellisse.

p. 62. Corollaria vero, ex praecedentibus deducenda, et signa boni maliue euentus, nec non cautelas in variorum horum morborum curatione attendendas. Capite quarto vberius explicauit, monuitque; cicutam interdum ad carnem fungosam, ex vlceribus rebellibus abigendam, cum spiritu salis acido, vnguento Aegyptiaco, vel aqua phagadaenica miscendam, opiique grana quaedam addenda esse, si hac ratione dolores excitentur.

p. 92. Praestantiam extracti aconiti, flore coeruleo, quatuordecim casus capitis quinti propositi satis euincunt. Hoc enim in tophis cas. I. IV. XIV. vlceribus nasi, faucium, veli palati penduli exesi, aliisque vlceribus venereis dolorificis cas. V. XI; doloribus articulorum rheumaticis, membrorumque arthriticis cas. II. III. VI. VII. IX; et praesertim capitis cas. X. XII; vt et dolore ischiatico cum femoris extenuatione. Cas. XIII. partim solum, partim vero cum aequali, vel paullo maiore mercurii dulcis quantitate mixtum, plenariam restitutionem; in spina ventosa cas. VIII. vero insignem alleuationem praestitit. Nos ipsi quoque experti, testari possumus, hoc extractum in doloribus rheumaticis arthriticisque egregios effectus edidisse. Et laete adhuc recordamur, nos a medio iulii 1763 puerum decennem, iam Academiae candidatum, spina ventosa ossis zygomatici dextri,

dextri, ossium radiorum, vlnarum, tibiatarumque am-
barum, ossium carpi et metacarpi, nec non phalan-
gum fere omnium digitorum manus dextrae, fere
vndique exulcerata laborantem solius huius extracti
vnciis duabus cum dimidia novem mensium spatio
integerrimae sanitati restituisse.

Salutares effectus extracti hyoscyami capite sexto p. 122.
contra spasmos, melancholiam, maniam, epilepsiam,
septem casibus tam confirmare, quam illustrare
quaesivit Noster. Quilibet vero perspicit, hoc re-
medio nequaquam veram epilepsiam vel melanco-
liam diuturnam, sed delirium tantum febrile fortius
cum convulsionibus, ab exanthematibus retrogressis
cas. I; cordis palpitationes cum spasmō dolente bra-
chii sinistri cas. II; melancholiam incipientem ex
malo hysterico cas. III; somnum anxium turbulentum
ex malo hypochondriaco cas. IV; convulsionē, ex
semestri spatio ancillam qualibet quarta vel quinta
nocte inuadentes cas. V; tussim siccam titillatoriam,
cum pectoris dolore cas. VI; recentissimamque ma-
niam cas. VII. hoc remedio depulsam esse, in quibus
vtique sanitatis restitutio plerumque non adeo diffi-
cilter apta methodo obtineri solet.

Colchici autem autumnalis virtutes capite septi- p. 141.
mo decem casibus confirmare annis est. Puerum
enim octennem, superata febre scarlatina, hydropi-
cum cas. I; virum sexaginta, feminamque sexaginta
trium annorum, hydropicos, asthmaticosque cas. II.
III; asthmaticum sexaginta quatuor annorum cum
indiciis manifestis hydropis pectoris cas. IV; puel-
lam ventre, pedibusque tumidis anxie respirantem,
cum breui tussicula cas. V; feminam quinquaginta
annorum, ventris hydrope et tussi vehemente labo-
rantem cas. VI; similem ancillam, hydropicam asth-
maticamque quinquaginta annorum; nec non vetu-
lam asthmaticam cas. VII. VIII. IX; tandemque etiam
ancillam

ancillam leucophlegmaticam cas. X. hoc remedico integerrimae sanitati restituit. Nos vero ex frequentate et admodum diuturno huius remedii usu satis conuicti sumus, oxymel colchicum squillitico nequaquam praeferendum esse.

P. 161. Capite octauo demum Noster obseruata ab exteris communicata, recenset. Ex his duo tantum casus ad extracti hyoscyami; varii ad oxymellis colchici; plures ad extracti aconiti vel solius, vel cum mercurio dulci, vel extracto cicutae mixti; quamplurimi vero ad cicutae salubritatem comprobendam pertinent; quos cuiuslibet lectioni commendamus. Notamus saltem ea, quae Cl. KRAFFT, Tergestinus, de varia cicutae efficacia obseruauit. Afferit enim 1) cicutam in locis vmbrosis crescentem, illam efficaciorē esse, quae tota die solis, praesertim meridiani radiis, exposita est. 2) Quo calidior climatis, foliue, in quo cicuta crescit, aer sit, eo minorem esse cicutae efficaciam. 3) Succum cicutae, ex manipulis tribus pro qualibet dosi, per linteum recens expressum, haustumque illico iusculo, vel theae potui admistum (ter, quaterque interdum in morbis pertinacissimis per diem sumendum), efficaciorē esse extracto, praesertim negligenti encheiresi praeparato. 4) Extractum recens, parua copia, verno tempore paratum, efficacius, penetrantiusque esse veteri, mensibus aestiuīs ex planta iam adulta, et magna copia parato. Tandemque etiam idem Cl. KRAFFT ex decocto cicutae in vase clauso, pulcherrimos effectus in scirrhis mammarum tumoribus, glandulis subaxillaribus induratissimis, scirrhusa vteri, praesertim orificii eius duritie iam carcinomatosa, obseruauit, si vapor eiusdem per cannulam plus minus longam, vasi adaptatam, excipiat, locoque adfecto immediate adplicetur.

XIII.

ANTONII STÖRCK, Sac. Caes. reg. Apost.
Mai. Consilarii aulici, archiatri, in nosoc.
ciuic. Pazmariano physici, Scient. botan. Flo-
rent. Academ. scient. Sien. Acad. Princip.
Hass. etc. membri, inclyt. Facult. medic.
Decani emeriti, et hoc tempore in antiquiss.
ac celeberr. Vniuersit. Viennensi Rectoris,
libellus, quo demonstratur: herbam, veteri-
bus dictam flammulam Iouis, posse tuto et
magna cum vtilitate exhiberi aegrotantibus.
Viennae, typ. Io. Thom. Nob. de Tratt-
nern, 1769. in 8. pagg. 53. tabul. aen. 2.

Pergit Cl. Auctor in vtilissima sua efficaciorum P. I.
plantarum, minus vsitatarum, solertissima disquisi-
tione, iam experimenta proponens, quae cum *flam-
mula Iouis* instituit, quibus etiam alia quaedam de
Stamno albo subiunxit.

Praemissa itaque Cap. I. flammulae Iouis, cuius P. 7.
nomen etiam addidit, a Pharmacop. Io. Iac. Well,
scriptio, remedia exinde, scil. infusa foliorum
florum, tenuiora fortioraque, extractum e succo
antae recentis expresso, et puluerem foliorum pa- P. II.
re docet; quorum doses ita determinat, vt ab in-
so vasculum vnciarum quatuor; extracti saccharo
ixti granum dimidium; foliorum autem pulueris a
anis tribus ad grana decem bis, ter vel quater de
e ab aegrotantibus tuto hauriri queant.

Tentaminibus igitur quibusdam cum cane sano,
ruo, et porco, caput continuo agitante, oblata-
re respuente, interno vsu; nec non aui tenerrima, P. 12
crescentiam fungosam fabae mediocris magnitudi-
e in vertice gerente, externa pulueris inspersione,
Tom. XVII. Pars II. V felici-

feliciter cedentibus, illa quoque cum hominibus aegris instituire nullus dubitavit.

Internus autem huius remedii, et quidem infusus, usus, in tollendo diuturno admodum, gravissimoque capitis dolore, tribus feminis Cas. I. II. et XVII. perquam salutaris fuit, quarum primam, licet a causa venerea ortum traheret, intra sex dierum spatium plenarie restituit. Sic quoque internus infusus, cum externa foliorum pulveris insperfectione coniunctus, usus cancrum labii superioris pessimum Cas. III. et IX. cum tuberculis nasi exulceratis, e malo venereo ortis, hunc licet paullo tardius aegriusque, plenarie tamen sustulit, et in cancro labii inferioris pessimo Cas. XXIII. spem integrae sanationis fecit. Idem quoque externus internusque usus ulcera ichorosa, serpentia, foetidissimaque cum labio inferiore cancroso, Cas. IV. V. e lue venerea orta, nec non cum tophis venereis Cas. VII. iuncta, saluberrimos effectus produxit; et ulcera crurum putrida, fungosa, serpentia, sordidissimaque, Cas. VI. VIII. et XVIII. perfecte consolidavit; quin imo vlcus gangraenosum, cum insigni tibiae prope malleolum externum carie Cas. X. exfoliatione facta, feliciter sanavit. In excrescentiis autem exulceratis, cancris, fungosisque, Cas. XI. XII. et XIX. non adeo salubris fuisse videtur. Prior enim aegra impatiens non curata abiit, posteriores vero duo nequaquam restitui potuerunt. Ulcerum serpentium, acerrimumque ichorem stillantium, nec non a scabie annosa ortorum Cas. XIII. et XIV. crebra cum infuso flammulae Iouis, quod et interne hauriendum propinabatur, ablutio, sat citam perfectamque sanationem procuravit. Arthritidem veneream duodecim annorum Cas. XV. infusi quidem haustus, puriformem urinae excretionem promouens, plenarie sustulit, alterius autem viri Cas. XVI. simillimum

mor-

norum, nec leuare, nec tollere potuit. Pulvis autem herbae flammulae Iouis glandi penis tumidae, Caf. XX. exulceratae, excrefcentiisque fungofis femiputridis foedae, infperfus tantum, malum intere curauit, vlceraque vrethrae Caf. XXI. infufi hauus, eiusdemque in vrethram iniectione, aliquoties fauauit; femorisque articulationem superiorem a tumore duro, et vlcere finuofa immobilem Caf. XXII. eiusdem propinatione iam mobiliorem reddidit. Tandemque etiam exulceratus fungofusque mammae cancer Caf. XXIV. a dexterrimo chirurgo RECHBERGER fola pulueris infperfione fanatusprehenditur.

Puluerem itaque huius herbae excrefcentias fungofas fubcarneas confumere, vlcera fordida purare, reddere, non tamen carnes viuas fanasque rodere, fed cuticula tegere; hinc omnibus caufticis, huc vifque cognitis, praeferendum, perfaepe cancrum exulceratum, vlceraque maligna folum curare, nec tamen remedium vniuerfale in eiusmodi morbis effe; vlceribus infperfum fubinde primis diebus magnum ardorem excitare; infufum autem interne fumtum diuturnos quandoque capitis dolores, vt et offium pertinaciffimos, a lue venerea fuperftites, vlcera chorofa, fcabiem pertinaciffimam curare; varias corporis acrimonias corrigere; in aliquibus vrinam, in aliis fudorem, paucis aluum mouere; eundemque effectum puluerem vel extractum interne datum exhibere, nec vllam corporis actionem turbare, vel mali quidquam producere Nofter perhibet.

Radiciſ poſtea dictamni albi effectus Cap. 2. p. 36. propoſiturus, poſt plantae itidem a I. I. Well factam deſcriptionem, delineationemque, eſſentiam et vium medicatum exinde parare docet, aſſeritque, ſe uerum decem annorum Caf. I. vndecim ſeptimanaum ſpatio ab epilepfia diuturna et vehemente ſo-

lius essentiae ope penitus liberasse; puellam vero quindecim annorum, Cas. II. eodem morbo ultra biennium laborantem, eadem ratione restituere non potuisse. Melancholicam contra sex et triginta annorum Cas. III. eadem essentia, excitato largissimo menstruorum fluxu, et copioso urinae profluvio, perfecte restituit. Febrem quoque intermittentem binorum infantum, nec non pueri decem annorum, Cas. IV. et V. ventre infimul a longo tempore tenso et magno laborantis, pulvere radicis dictamni albi felicissime fugavit. Eodem quoque remedio Cas. VI. puellam, ventre duro magnoque praeditam, et Cas. VII. puerum octennem, a vermibus, addito interdum pulvere radicis ialappae, prorsus liberavit. Cas. VIII. feminae quinque et triginta annorum menstrua, quibus biennium caruerat, sex septimanarum spatio integre restituit. Feminam vero Cas. IX. septem et viginti annorum fluore albo inueterato et mensstruis irregularibus, cum molesta hypogastrica tensione laborantem, eodem pulvere alleuavit qui-
dem, menstrua autem magis regularia reddere non potuit *). In appendice tandem cicuta bonos, repetitosque, etiam in ulcere sinuoso pedis sinistri Ill. VAN SWIETEN, effectus, reliquorumque remedium suorum commemorat atque collaudat.

*) Pulverem radicis dictamni albi in ciendo menstruorum fluxu, imminuendoque infantum abdomine magno, duro, tenso, quidpiam valere, nos ipsimet iam aliquoties experti sumus.

XIV.

Journal de Médecine, Chirurgie, Pharmacie,
etc. par Mr. A. ROUX, Docteur Regent de
la Faculté de Médecine de Paris, etc. Tome
XXV. à Paris, 1766. chez Vincent. 8. Al-
phab. 1. plag. 13. Tome XXVI. 1767. Al-
phab. 1. plag. 13. tab. aen. 1.

i. e.

Diarium ad artem salutarem, chirurgiam, phar-
maciam, cet. pertinens. Auctore Cl. A.
ROUX. Tomus XXV et XXVI.

Mense iulio 1766. haec inprimis notatu digna Tom.
videntur. XXV.

4. *Observationes* Cl. LE MOYNE *de efficacia ca-* p. 34.
taplasmatidis cicutae et decocti radice lapathi in tumori-
bus et ulceribus mammarum. Hoc cataplasma com-
ponit Cl. Auctor e cicuta, auena excorticata, farina
hordei ac decocto lapathi, idque mammis ulcerosis
applicat, simulque usum decocti lapathi cum lacte
commendat, atque hoc modo tres feminas feliciter
sanavit.

5. *Observatio* Cl. DAUNON *de vulnere capitis* p. 38.
um fractura ac depressione utriusque laminae ossis fron-
tis. Virum octo et viginti annorum, cui disruptum
est sclopetum intra manus, vulneravit pars tubi
sclopeti ad frontem. Nulla interea passus est sym-
ptomata, praeter paralyfin momentaneam brachii
et cruris sinistri. Altero die dilatauit Cl. Auctor
vulnus, ac vidit, depressam esse partem ossis fron-
tis. Exemtis itaque sensim frustulis osseis quindecim
ac rite tractato hoc vulnere, tandem exfoliatio
durae matris secuta est, oriebatur callus, et vulnus
intra decem hebdomadas cicatrice clausum est.

P. 46. 6. *Observatio de sublata epilepsia usu causticorum*, a Cl. ROCHARD *communicata*. Puero quatuordecim annorum, scabie et creberrima epilepsia laboranti, applicavit Cl. Auctor caustica ad nucham et brachia, simulque dedit apta remedia interna. Suppuratione itaque diu servata, vtrumque malum tandem victum est et aeger convaluit.

P. 71. 9. *Observatio de ulcere vesicae*, a Cl. MARTIN. Vir satis robustus incidit in febrem, qua superata, accessit ischuria, in dies crescens cum pessimis symptomatibus. Cl. Auctor tandem accersitus, cathetere saepius eduxit urinam, dedit clysmata emollientia, venamque secavit et semicupia adhibuit. Tandem multum puris urinae se admiscuit, et vlus vesicae prodidit. Iniecit itaque aquas Balarucenses. Accessit postea febris vehementissima, per octo et quadraginta horas persistens, cum largissimis et foeditissimis sudoribus, qua superata, aeger recuperavit mingendi vim et conualescens nosocomium reliquit.

Mense augusto

P. 174. 9. *Observatio de vulnere colli* Auctore EODEM. Miles ad cartilaginem thyroideam tantopere vulneratus est, vt sumtus potus saepius e vulnere emanaret. Cl. Auctor hoc vulnus apte tractavit, ac tandem eius coalitio secuta est. Attamen breui post denuo ruptum est et aegrum e vita sustulit. Cadaveris dissectio ostendit, cartilaginis thyroideae alam dextram esse perforatam, eiusque membranam internam diuisam ac diuulsam.

P. 177. 10. *Observatio de contrassura cranii in parte opposita, quam secutus est abscessus cerebri sub fractura, et sanguinis extrausatio in loco contusionis*, a Cl. NOLLESON. Quidam vulneratus est ad os parietale dextrum, ac statim incidit in deliquium animi,

mi, cum haemorrhagia oculorum, aurium et narium, motusque corporis interceptione. Cum venae sectio repetita, clysmata et fomentationes abdominis nihil efficerent, trepanatione ossis parietalis usus est Cl. Auctor, et, sanguine extrauafato educto, symptomata cessarunt. Attamen eadem redierunt post quinque dies, et accessit lethargus, febris ac phrenitis. Cl. Auctor itaque metuit, contrasissuram factam esse, vtpote quod dolor percipiebatur ad os parietale oppositum. Adhibito ideo ibidem modiollo, multum puris inde effluxit, ac aeger intra triginta dies pristinam recuperavit sanitatem.

Mense septembri

2. *Observatio de graviditate coniuncta cum ana-* p. 206.
sarca, erysipelate, ulcere phagedenico, et inflammatione
intestinorum atque deiectione perpetua, Auctore Cl.
GUINDANT. Femina quatuor et triginta annorum laborabat leucophlegmatia totius corporis, erysipelate ac ulcere cruris, et abdominis tumore ac dolore, idque iam per quatuor menses. Cum catamenia iam per aliquot tempus essent suppressa: Cl. Auctor suspicabatur graviditatem, et fetum iam mortuum esse, hinc vasa iliaca premi, atque haec symptomata excitari. Adhibuit itaque fomenta abdominis et cruris, simulque interne dedit oleum amygdalarum, idque optimo cum successu. Peperit enim paulo post aegra foetum mortuum, sine doloribus magnis, ac sine praegressis aquis. Cum lochia retinerentur, suavitatis emmenagoga, eorumque usu mox restituebantur. Potu deinde aquae frigidae incidit aegra in asphyxiam et syncopen, sed, sumtis remediis cardiacis, ac usu cremoris tartari, paulo post sanitati plane est restituta.

3. *Epistola Cl. ROBIN ad Cl. POSTEL DE* p. 222.
FRANCIERE, de taenia. Aeger febre putrida

verminosa laborans, ante mortem aliquoties particulas taeniae eiecit. Cadauere eius dissecto, visus est ad pylorum aceruus compactus, albus, pomi magnitudine, et taenia, quae ab hoc aceruo usque fere ad anum se extendebat in tractu intestinorum. Longitudo huius taeniae atque acerui euoluti aequabat circiter triginta pedes. Praeterea simul inueniebantur aliquot lumbrici. Hinc patet, taeniam non omni ex parte vermem solitarium esse dicendam.

P. 234. 6. *Epistola Cl. DAUNON ad Cl. ROUX, de haemorrhagia periodica pollicis pedis dextri, quae accessit post ulcus cancrosum.* Vir octoginta quinque annorum, dolore capitis acuto et otalgia affectus est cum febre; accessit deinde saluatio copiosa et respirationis ac deglutitionis difficultas insignis. Vuula erat maxime relaxata, tonsillae fere gangraenosae, aderatque ulcus cancrosum ad basin linguae. Omnia haec incommoda aptis remediis externis et internis feliciter cessabant, excepto ulcere, vtpote quod margine calloso inclusum erat. Attamen cuncta haec mala denuo aegrum vexabant, donec, post magnum dolorem pollicis pedis dextri, e macula eius rubra sanguis arteriosus copiose prorupit, atque tum aeger conualuit. Eadem haemorrhagia per viginti menses periodica facta est, eademque symptomata semper sedauit. Sed aeger tandem ex virium imbecillitate mortuus est.

P. 242. 7. *Observatio de fractura ossis parietalis, in qua ab ictu gladii portio magna ossis demta cerebrumque denudatum est, a Cl. NOLLESON.* Militi, cui ictu gladii excissa erat portio pericranii et ossis parietalis non mediocris, denudauit imperitus chirurgus cerebrum, ac vulnus puluillis, aqua vitae imbutis, deligauit. Altero die secauit prominens e vulnere cerebrum, et similibus puluillis vulnus compressit. Hinc

Hinc orta sunt grauiſſima ſymptomata, donec acceſſitus Cl. Auſtor pericranium variis locis incidebat, puluillos ſiccos vulnere imponebat, et apta eius tractatione exfoliationem offis, tandemque plenariam vulneris cicatrifationem conciliabat.

10. *Obſeruatio de fractura complicata cruris cum* P. 254.
gangraena, a Cl. LEAUTAUD. Operarius ſex et triginta annorum, in rixa fregit crus dextrum in media parte tibiae, vt os integumenta perforaret ad quatuor digitos uſque. Dilatauit Cl. Auſtor vulnus, ferra ademit partem offis prominentem, atque aptam reductionem ſuſcepit. Nihilominus acceſſit gangraena octauo die, ac perpetuo increuit. Separata igitur parte corrupta, uſus eſt embroche ſpiritus vini camphorati, tinctura croci et aloes, ac eſſentia baſſamica STAHLII, cet. quibus remediis tandem oſſa coaleſcebant vulnusque cicatrice ita claudebatur, vt aeger hoc crure optime vti diſceret.

13. *Epiftola* Cl. MARECHAL DE ROUGE-P. 275.
RES de vulnere capitis cum fractura offis frontis, ſanato ſine auxilio trepani. Puer decennis hoc malo laborabat, atque cum eius pater trepani applicationem plane repudiaret, nihil remedii adhibitum eſt, praeter linteum carptum, aqua vitae diluta imbutum, quo ſenſim exfoliatio offis, tandemque plenaria ſanatio facta eſt.

Menſe octobri

3. *Epiftola* Cl. YSABEAU, *de muliere nonagin-* P. 316.
ta duo annorum, cui prorupit dens molaris. Quae cum iam diu paſſa eſſet magnos dolores maxillae ſuperioris, tandem vidit, ex alueolo tertii dentis molaris excreſcere dentem permagnum.

7. *Obſeruatio de haemorrhagia uteri, conuulſioni-* P. 331.
bus ſtipata, et uſu aquae frigidae curata, a Cl. GAUTHIER. Inuoluit enim hanc feminam pene moribundam

bundam panno, aqua frigida imbuto, ac statim cessabat haemorrhagia, et conuulsiones tollebantur, aegraque conualuit.

P. 359. 9. *Observatio de acu deglutita, atque in ventriculo remansa, ope brassicae recentis et emetico statim reiecta,* a Cl. LE TUAL. Femina quaedam cum cibis deglutiuit acum, ac sensit magnos dolores ventriculi, qui, sumto potu aquae calidae, magis incresebant. Accessit tandem febris cum sudore frigido et motibus conuulsivis. Cum iam instaret ventriculi inflammatio, Cl. Auctor aegrae venam brachii et paulo post venam pedis secavit. Secabat deinde folia brassicae transuersim, eaque in aqua, butyro mixta, paululum coquebat, simulque soluebat decem grana tartari emetici in aqua calida. Deglutiuit itaque aegra brassicam sic praeparatam, nec antea masticauit, et postea sumsit emeticum, ac statim reiecit folia brassicae, et dolores imminuebantur. Cum Cl. Auctor timeret, malum nondum satis esse superatum, idem remedium denuo repetiit, atque acus tandem vna cum brassica feliciter est reiecta, et aegra plane conualuit.

P. 364. 10. *Observatio chirurgica de sarcomate uteri, quod speciem polypi habebat, atque de veris remediis, quae ad eius medelam sint adhibenda,* a Cl. NOLLESON. Femina quatuor et viginti annorum post dolores abdominis sensit, protrudi ex utero corpus compactum et crassum, quod chirurgus examinavit et pro polypo uteri agnouit, cuius pedunculus erat brevis, durus et ambitu sex pollicum. Ligauit itaque collum huius tumoris filo sericeo, atque ligaturam in dies magis constrinxit, dieque 22do polypus sponte sub ligatura delapsus est, ac sensim uterus pristinam vim recuperavit. Exstirpationem horum tumorum maxime dissuadet, ob haemorrhagiam nimiam hinc metuendam.

Mense

Mense nouembri

3. *Epistola* Cl. MARTEAU ad Cl. PETIT, p. 423.
Consistens observationem de grauiditate diu ultra consue-
tum tempus prolongata. Femina viginti et sex anno-
rum concepit mense nouembri, fetus mense mar-
tio vitam suam motibus prodidit, et mense augusto
iam dolores ad partum inceperant, sed non prius,
quam medio maio anni sequentis, puellam viuam
peperit, vt itaque haec grauiditas per octodecim
menses continuauerit.

4. *Observatio de superfetatione felis* a Cl. MAR- p. 432.
RIGUES. Felis peperit quinque pullos, quibus
ademptis et necatis, nihilominus lac remansit in vbe-
ribus matris, ac tumor relictus est in abdomine in
dies increscens, donec haec felis post tres hebdo-
madas denuo peperit pullum, eumque nutriuit.

5. *Observatio de fractura complicata ossium cra-* p. 435.
nii, a Cl. POMMIER. Operarius saxo tantopere
vulneratus est ad caput, vt statim sensibus priuare-
tur. Inciso pericranio, apparuit fractura partis os-
sis frontis, ossis parietalis sinistri et portionis squa-
mosae ossis temporum, ibique simul aliquae partes
depressae erant. Cl. Auctor trepanauit os frontis,
ac tandem apta medela et accurata diaeta exfoliatio
ossium facta est, et mense octauo vulnus cicatrice
claudebatur, ac aeger perfectam sanitatem recupe-
rabat.

6. *Observatio de celeri effectu corticis Peruuiani* p. 442.
in dolore periodico, a Cl. BERTRAND. Femina
laborabat iam per octodecim annos dolore periodi-
co supercilii, qui oculum vnum et regionem tem-
poralem sensim occupabat, alter vero oculus inte-
ger erat. Hic dolor incipiebat quotidie hora nona
matutina et hora septima vespertina cessabat. Omni-
bus remediis iam frustra tentatis, adhibuit tandem
Cl. Auctor vsum corticis Peruuiani, huiusque ope
hunc morbum depulit.

8. Ob-

P. 449. 8. *Observatio de vulnere parotidis sanato sine fistula*, a Cl. MARTIN. Tricenarius a vitro rupto est vulneratus, vulnere obliquo, ab angulo maxillae inferioris dextri lateris usque super arcum zygomaticum ita protenso, ut masseter et parotis ex parte discinderentur. Margines cutis forfice incidit Cl. Auctor, et fines partium discissarum arcta et apta ligatura vniit, simulque venam sexies secavit. Altero die intumuit quidem inferior pars parotidis, attamen non orta est fistula, sed hoc vulnus rite tractatum tertia hebdomade cicatrice clausum est, et aeger sanitatem recepit.

P. 454. 10. *EIUSDEM observatio, de vulnere oculi, cum symptomatibus peculiaribus coniuncto*. Miles octo et viginti annorum vulneratus est ad oculum sinistrum, et altero demum die in nosocomium se contulit. Tunc palpebra visa est nigra ac tantopere tumida, ut bulbus oculi vix detegi posset, et tunica coniunctiva maxime intumesceret. Aeger interea vomitu, convulsionibus et deliriis vexabatur, neque tamen detegi poterat laesio cranii; tandem accessit hemiplegia lateris dextri, quae, restituto tandem oculo laeso, tamen ex parte continuabat. Itaque putat Cl. Auctor, instrumentum laedens, per fissuram orbitalem superiorem transiens, laesisse duram matrem ac cerebrum, unde ortae sunt convulsionibus, deliria et hemiplegia.

P. 458. 11. *Observatio de exstirpatione plenaria uteri, sphacelo affecti*, a Cl. ANSELIN. Femina quadraginta quatuor annorum, laborabat prolapsu uteri per aliquot annos. Ultima graviditas ob insignem diarrhoeam cum tenesmo erat molestissima. Accedente partu, prolapsus uteri hunc maximelaboriosum reddidit. Cum enim ligamenta uteri valde relaxata essent, uterus fere totus e vagina prominebat, eiusque orificium difficillime dilatabatur. Tandem
cum

cum dolores ad partum fetum eiicerent, vterus simul inuersus est, quo reducto, lochia rite fluebant. Post aliquot dies subito accessit suppuratio copiosa et foeditissima cum febre, pulsu debili et sudore frigido, quae gangraenam minabantur. Optima quidem adhibita sunt remedia, minime tamen sphacelo vteri satis prospicere poterant, ac ipse vterus quindecimo die vndique se exfoliabat. Vagina erat sana vsque ad vteri orificium, atque tunc sustentaculo destituta, plane se inuertebat, et e pudendis pendebat ad quinque pollices vsque, ac sistebat tumorem, oui gallinae Indicae magnitudine, qui deinde carcinomate occupabatur. Ligauit itaque Cl. Auctor hunc tumorem ad basin vaginae et ligaturam sensim magis constrinxit, eumque septimo die sine haemorrhagia scalpello extirpauit. Vsu tandem corticis Peruuiani, remediis cardiacis, et iniectionibus antisepticis, haec femina intra septem hebdomadas plane conualuit.

12. *Epistola* Cl. TONDU, *sistens observationem* P. 464. *de emphysemate sanato, ope incisionis.* Iuuenis octodecim annorum curru vehens, fugientibus equis, hinc delapsus, simulque diu protractus, et a curru laesus est. Tumefactus erat a capite vsque ad pedes, ac difficili respiratione, singultu et dolore acuto regionis hypogastricae vexabatur. Thorax et abdomen peculiarem edebant sonum. A parte media pectoris lateris dextri vsque ad os ileum, et ab umbilico vsque ad vertebrae aderat fugillatio maxime rubra. Huius centrum incidit Cl. Auctor ad sex vel septem pollices vsque, et e contextu celluloso parum sanguinis multumque aeris exiit. Aptam tandem medela adhibita, hoc emphysema sensim immutatum est, et aeger intra duodecim dies plane conualuit.

Mense

Menſe decembri.

p. 509. 2. *Obſervatio de tetano* a Cl. GUINDANT. Virgo viginti annorum rigiditate laborabat totius corporis, cum reſpiratione difficili, pulſu duro, motu conuulſivo maxillae inferioris et periodica contractione dentium, vt vix deglutire poſſet. Accedebant permagni dolores renum et ſumma inquietudo, attamen excretio alui et renum nunquam interrepta eſt in hoc tetano. Plurimis remediis iam fruſtra tentatis, dedit Cl. Auctor oleum amygdalarum dulcium cochleatim, ac ſpinam dorſi inunxit baſamico neruino, et lac, chaerefolii decocto mixtum, pro potu ſuaſit. Quae cum parum efficerent, applicauit deinde furis veſicatoria, atque his morbum hunc pertinaciffimum tandem plane ſuperauit, aegramque ſanauit.

p. 518. 4 *Epiftola* Cl. BAYLE ad Cl. ROUX, ſiſtens deſcriptionem fetus neonati vivi, qui cerebro erat deſtitutus. Erat partus praematurus et laborioſiſſimus, atque per aliquot minutas tantum vixit. Ad primam colli vertebram luxatam fractamque, et ad apophyſin baſilarem haerebat folliculus oui magnitudine, ac duro inuolucro obdutus, maſſam pulpoſam continens, quae cerebellum ſiſtebat. Cranium cerebro erat deſtitutum et vacuum, nec niſi glandula pituitaria, nucis moſchatae magnitudine, inſtruſtum. Medulla ſpinalis non erat mutata. Oculi ex orbitis eminebant; maxilla ſuperior duos dentes inciſiuos oſtendebat. Pulmones, aquae innatantes, vitam fetus declarabant. Viſcera abdominis a ſtatu naturali non recedebant. Capſulae ſuprarinales maximae erant et renes obtegebant; vrether alteruter ex hac capſula oriebatur, calami ſcriptorii craſſitie, atque continebat calculum.

p. 532. 6 *Epiftola* Cl. LE CLERC, ſiſtens obſervationem de dilaceratione vteri in partu, quam ſequebatur mors matris et

infantis. Femina quadraginta quatuor annorum ex hebdomadas vltra tempus consuetum vtero gestabat fetum, ac subito sensit vehementem dolorem, quo tumpebantur aquae et magna haemorrhagia sequebatur. Fetus haerebat ad collum inter ossa pubis et prominentem partem superiorem ossis sacri, vt nullo modo pari posset, ac versus os ischium magna percipiebatur dilaceratio vteri. Mater vero viginti quatuor horis post rupturam vteri mortua est. Sectio cadaueris non erat concessa.

8. *Relatio* Cl. JOLY *de sarcomate polypofo et p. 551.*
scirrroso vteri. Femina quadraginta quinque annorum post suppressionem menstruorum, per octo menses continuatam, passa est haemorrhagiam magnam, cum febre, haemoptoe, haemorrhagia narium, erysipelate et abscessu variarum partium, inprimis crurum, vbi abscessus gangraenosi fiebant. Accessit paulo post denuo haemorrhagia vteri, atque tum eduxit Cl. Auctor sarcoma polypofo et scirrhum, hydatidibus repletum, quod decem libras pondere aequabat, et deinde aegram apta medendi methodo sanitati in spatio trium mensium restituit.

In Tomo XXVI sequentia inueniuntur, quae Tom. hic recenser merentur. XXVI.

Mense ianuario 1767:

4 *Epistola* Cl. DE ROUGERES, *fistens nonnullas p. 44.*
obseruationes, de usu humectantium in morbis neruorum. Septem hic producuntur obseruationes, quae partim ostendunt, quaenam damna attulerit intermissio humectantium in variis morbis, partim declarant, quam magna vtilitate interdum adhibita sint. Obs. I. Etenim primiparae post magnos labores ope vnci eductus est infans mortuus, cum insigni

infigni laesione vaginae, recti et perinaei, vt tandem harum partium gangraena periret aegra. Obs. 2. Alia peperit infantem mortuum, et lochia suppressibantur, quibus restitutis, accessit cephalalgia pertinacissima. Adhibitis vero pediluuiis et demulcentibus remediis, haec femina est sanata. Obs. 3. Alia grauida post iram incidit in motus convulsivos ac periit. Dissecto cadauere, repertus est infans mortuus, ouaria hydrope affecta, dura mater exsiccata, ac multum feri, in cerebro extrauasati. Obs. 4. Puerpera, suppressis lochiis, sumsit decoctum hyssopi, sed frustra; post vsum vero remedium diluentium et demulcentium lochia sunt restituta, aegraque conualuit. Obs. 5. Alia, quae ab ira sibi suppresserat lochia, simili modo sanitatem recuperavit. Obs. 6. Sartor laborans perpetua cephalalgia, dolore ventriculi, deliquiis animi et palpitatione, balneis frigidis, vfu feri lactis et apoze-matum humectantium conualuit. Obs. 7. Femina, affectionibus vaporosis vexata, mero vfu aquae frigidae curata est.

P. 52. 5. *Observationes de vfu humectantium in morbis spasmodicis*, a Cl. BRUN. His enim sustulit Cl. Auctor cephalalgiam, malum hypochondriacum, malum hystericum, tympanitem, cardialgiam, oedemata periodica, febrem continuam, vomitum perpetuum, lochia retenta et alios morbos.

P. 74. 7. *Observatio de hydrocephalo*, a Cl. DESLANDES. Abdomen puerperae maximopere erat extensum; rupit itaque Cl. Auctor vesicam aquarum, ac profluxit ingens aquae copia; tandem cum extraheret fetum cum pedibus, restitit eius caput ob tumorem mollem, rotundum, permagnum, qui vertebrae quartae dorsi adhaerebat. Immisit itaque manum vtero, dirupit tumorem, e quo aquae emanabant, ac ita absoluit partum. Hic infans mortuus

us laborabat hydrocephalo et labio leporino cum palato fisso; abdomen vnum tantum renem continebat, qui duplicem magnitudinem habebat, ac duobus vteribus erat instructus. Icon huius fetus hic adiicitur.

Menſe februario.

4. *Obſervatio de fluxu catarrhali veficae* a Cl. p. 136.

ANDREUTTE. Vir viginti nouem annorum poſt refrigerium incidit in febrem, quae quadraginta octo horas continuabat, et ſudore copioſo finiebatur. Aer ſimul laborabat incontinentia vrinae, quippe quae interea inuito ſtillabat guttatim e vefica, tandem acceſſit dyſuria et dolor magnus in regione veficae. Cl. Auſtor adhibuit remedium laxans, deinde decoctum demulcens et fomenta externa. Vrina excreta maxime pituitoſa erat. Apta vero diueticæ, per aliquot tempus adhibita, aegrum tandem ſane reſecerunt.

7. *Obſervatio, quae demonſtrat, fracturas imperſectas offium cylindricorum fieri poſſe*, a Cl. p. 159.

RENAULT. Quidam ab equo delapſus eſt, atque compreſſit pondere totius corporis brachium dextrum. Cum poſt tres hebdomadas ſentiret dolores, tandem numerus fractus eſt ſub collo per leuiſſimum motum, et faſciis atque quiete ruriſus coaluit. Cum vero vires brachii a lapſu praegreſſo uſque ad tempus fracturae in dies decreuiſſent: credit Cl. Auſtor, hanc fracturam iam inceptam fuiſſe a lapſu poſto, nec ſtatim ſanari potuiſſe, cum aeger perpetuis itineribus et equitationibus a quiete detineretur. Suadet itaque, vt in ſimili caſu pars, in qua ob dolorem perſiſtentem ſuſpicabatur Cl. Auſtor fracturam minus perfectam, ita tractetur, quaſi os ipſum eſſet fractum.

8. *Obſervatio de ſarcomate*, a Cl. TELMONT p. 164.

DE SAINT IOSEPH. Hoc ſarcoma inſignis magni-

nitudinis haerebat ad inguen finistrum viri, ac partim durum, partim molle erat, atque excitabat dolores colicos et vomitus. Praegressa erat hernia inguinalis, ac deinde enatus est hic tumor sensim increscens. Repudiabat aeger eius extirpationem, ac incidit postea in pleuritidem, et sensit dirissimos dolores in hoc tumore, quem occupabat ex parte gangraena, vnde effluebat materia foetidissima. Dilatauit Cl. Auctor sinum tumoris, et extirpauit partes eius, gangraena corruptas, et altero die denuo excidit scalpello tantam copiam substantiae tumoris, vt fere sex libras pondere aequaret. Attamen cum gangraena iam occuparet viscera abdominalia, periit aeger sexto die post extirpationem. Substantia baseos tumoris erat carnosa, et musculis abdominalis adhaerebat.

P. 177. 12. *Observatio de abscessu insigni, sine incisione sanato*, a Cl. RUBY. Vir laesus est ictu ad basin maxillae inferioris, in cuius musculis oriebatur abscessus. Cum vero interius sponte exiret pus variis locis, repudiavit Cl. Auctor incisionem, et potius usus est leui compressione externa huius abscessus ad euacuandum pus, et, apto regimine seruato, aeger post octo dies conualuit.

Mense martio.

P. 223. 2. *Observatio de tetano vero*, a Cl. PUIOL. Virgo sedecim annorum sensit rigiditatem maxillae inferioris, quae sensim occupabat reliqua membra, donec totum corpus tantopere rigescebat, vt vix aliquid deglutire posset, nec clysmata amplius immitti possent. Hunc tetanum sensim dissipauit Cl. Auctor crebris venesectionibus, clysmatibus, inunctionibus et potionibus sudoriferis. His accensa est febris, quae tandem sudoribus morbum vinxit.

P. 240. 5. *Observatio de ischuria vesicae, excitata per fabam urethrae immissam*, a Cl. COSTE. Cum rusticus post

post masturbationem immisisset rigidae vrethrae abam, merae libidinis causa, eamque non amplius retrahere posset, orta est ischuria cum pessimis symptomatibus. Postquam aeger fassus erat, quae fecerat, Cl. Auctor incidit vrethram, atque eduxit abam, ac vrina statim copiose emanauit, et aeger paulo post conualuit.

6. *Observatio de carie a causa externa*, Auctore P. 244.

Cl. DAUNOU. Iuuenis nouendecim annorum sibi se laesit crus dextrum ad mediam tibiam, ac sensit dolores insignes. Imposito cataplasmate resolvente, dolor cessit, sed humerus sinister intumuit, atque adhibito simili auxilio, dolor et tumor in scapulam dextram migrarunt, tandem ad crus laesum redierunt. Accessit deinde febris continua et diarrhoea. Dilatato vulnere cruris, effluxit sanies copiosa et caries magnae partis tibiae se declarauit. Aptata vero melius sensim exfoliatum est os tibiae, ac denuo regeneratum, ut aeger tandem hoc crure pristino modo uti posset.

7. *Observatio de ulcere cancroso labii inferioris*, ap. 256.

Cl. BAYLE. Rusticus diu passus est hoc malum, quod Cl. Auctor tandem scalpello feliciter extirpauit, sed fatetur, haemorrhagiam rami arteriae maxillaris externae discissi hanc operationem fecisse maxime molestam.

Mense aprili.

3. *Epistola* Cl. LANDEUTTE ad Cl. RICHARD P. 335.

DE HAUTESIERK *de herpete*. Diuidit Cl. Auctor herpetem in *farinosum, volentem, miliarem et viuum*, qui vel *erodens* et humidus est, vel *cancrosum*. *Farinosus* leuiter attollit cutem, hanc rubefacit, vesiculasque paruas, cum leui calore coniunctas, excitat, quibus exsiccatis, cutis ita desquamatur cum pruritu, quasi farina obiecta esset. *Volans* ut plurimum fa-

ciem occupat, vbi excitat pustulas paruas, quae suppurant et celeriter exsiccantur. - *Miliaris* siue crustosus, est aceruus pustularum, quae inprimis occupant lumbos, pectus, genitalia et inguina, magnumque producant pruritum. Pustulae deinde in crustas transeunt difficillime tollendas. Herpes *viuus* est vel *erodens*, cuius pustulae mutantur in crustas humidas, quae tegunt vlcuscula contextus cellulosi cutis; vel *cancrosus*, vbi sanies e pustulis et crustis profluit, vicinas partes corrodit, ac vlcera callosa reddit. Herpes inprimis ab acrimonia biliosa et muriatica gignitur, quae lympham inspissat. Remediis purgantibus, balneis, aquis mineralibus, vel potu diluente, et inprimis cura lactis herpetem depellere solet Cl. Auctor. Pilulas e cicuta in hoc morbo maxime profuisse, ipse saepius expertus est.

Mense maio.

P. 430. 4. *Observatio de vertigine a vermibus excitata*, a Cl. ROZIERE DE LA CHASSASNE. Virgo quadragenaria incidit in vertiginem, quae sensim magis increfcebat, ac visum ipsum imminuebat. Cum, praeter reliqua symptomata, pruritus narium insignis simul adesset, Cl. Auctor vermes suspicatus est. Dedit itaque infusum foliorum fennae cum pulpa tamarindorum, ac statim reiecit aegra duos vermes magnos ex ore, ac repetito eodem remedio, vertigo plane est dissipata.

P. 434. 5. *Relatio de effectibus vaporum carbonum*, a Cl. NACHET. Serui duo, in conclaui angusto dormientes, in quod carbones ardentes immiserant, altero die iam in agone inueniebantur, inprimis alteruter. Stupore enim affectus erat, sensu priuatus, ac vomitu reiecerat materiem biliosam; pulsus erat parvus, respiratio difficilis, ac simul aderat frigus extremitatum, stertor, et corporis rigiditas. Vt itaque

Cl.

Cl. Auctor restitueret hos aegros, illos aeri exposuit, ac pectori et abdomini creberrime imposuit lintea aqua frigida imbuta, atque extremitates fricavit, ac simul dedit saepius spiritum salis ammoniaci volatilem, et liquorem anodynum HOFFMANNI, quo quidem initio excitabantur motus convulsiui, sensim autem vires vitales hinc augebantur, et applicata venaesectione atque clysmate acri, facta est insignis euacuatio, et aegri sensim plane conualuerunt.

7. *Observatio de vulnere, quod cavitatem abdomi-* P. 448.
nis penetrabat, cum duplici discissione intestini coli, ope
cultri facta, a Cl. LAFFEY. Vinitor vulneratus est cultro in regione lumbari sinistra, et magna pars intestinorum ex abdomine propendebat. Chirurgus accersitus dilatauit vulnus ad reponenda intestina prolapsa, ac vidit, colon in duobus locis esse pertusum, nimirum in media parte et quatuor pollices super hanc laesionem, atque ex his orificiis exiisse foeces et octo lumbricos. Vfus itaque est sutura pellionum, atque reductis intestinis, gastroraphia vulnus vniit, idque, impositis puluillis, vino tepido imbutis, deligauit. Crebris tandem adhibitis clysmatibus, fomentis abdominis et accurata diaeta, hoc vulnus coaluit, ac aeger in triginta septem diebus plane conualuit.

8. *Observatio de laesione carotidis externae dex-* P. 452
trae ex vulnere lateris dextri colli, ope cultri facto,
a Cl. CAESTRYCK. Vir cultro laesus est in latere dextro colli, ac simul discissa est carotis dextra externa, vt insignis haemorrhagia oriretur, nullo modo compescenda. Cl. Auctor tandem accedens aperturae carotidis imposuit agaricum praeparatum et pannos gradatos, aptamque addidit fasciam atque diaetam humectantem praescripsit, et post aliquot dies hoc vulnus cicatrice clausum est. Cum vero aeger iusto citius negligeret compressionem aptam

huius loci, sensim ibi oriebatur aneurysma, quod vero diu applicata compressione tandem plane disparuit.

p. 455. 9. *Observatio de abscessu cerebri, quem excitabat particula ab interna lamina ossis parietalis a gladio laesi, separata*, a Cl. NOLLESON. Miles laesionem ossis parietalis sinistri accepit gladio; cum vero integumenta nec essent discissa, nec nisi contusio exterius appareret, laesio haec neglecta est. Attamen septimo die accessit febris insignis cum oedemate faciei. Incidit Cl. Auctor contusam pericranii partem, sed frustra, atque increvit febris cum deliriis, vomitu et conuulsionibus coniuncta. Venaesectio repetita, adeoque sectio venae iugularis nihil efficiebant. Applicauit itaque ossi parietali modiolum, ac vidit, laminae internae partem esse separatam, ac in cerebro haerere, qua exempta et vulnere rite tractato, aeger tandem plane sanatus est.

p. 459. 10. *Observatio de duobus polypis in virgine partim ex naribus, partim ex ore exstirpatis*, a Cl. ICART. Puella tredecim annorum iam a pueritia polypo narium et palati laborabat, ac iam febre lenta et summa corporis macie vexabatur. Exstirpatio vtriusque polypi feliciter ac sine magna haemorrhagia facta est. Attamen quarto die accessit enormis haemorrhagia, nullo modo compescenda, donec aegra incidit in syncopen. Applicauit itaque Cl. Auctor turundas stypticis imbutas, ac sensim bona vulnorum suppuratio secuta est, et aegra post tres hebdomadas plane conualuit.

Mense iunio.

p. 528. 6. *Noua methodus lithotomiae per apparatus altum, praesertim in feminis adhibenda et demonstrata in scholis medicis*, a Cl. BASEILHAC. Aegra nimirum, in situm horizontalem posita, incidit Cl. Auctor

Et or integumenta inter musculos pyramidales, a media parte regionis hypogastricae vsque ad synchondrosin ossium pubis, acu deinde ac postea scalpello vesicam vsque ad collum aperit ad ductum specilli, per vrethram immissi, tandem introducit digitum ad calculum detegendum, quem denique forcipe educit. Labia vulneris coniungit emplastro glutinante, et vrethrae immittit tubulum. Hac enim methodo lithotomiam saepissime feliciter peregit.

8. *Observatio de vulnere abdominis peculiari ratione curato a medico Indico, communicata a Cl. BOURDIER.* Miles sibi ipsi induxit ense vulnus abdominis, e quo exibant intestina. Quae reduxit medicus Indicus, ac, ne rursus prolaberentur, peculiari usus est encheiresi. Separavit nimirum integumenta circa hoc vulnus a musculis, vulnere imposuit laminam plumbeam, et cutem exterius vniit futura cruenta, ac vulnus brevi tempore coaluit. Cum post aliquot tempus idem homo suspenderetur, vidit Cl. Auctor in sectione cadaueris, hanc laminam plumbeam inter musculos et integumenta quasi incrustatam esse. Fortasse haec methodus in herniotomia ad retinenda intestina utilis esse posset, si quis hac uti auderet.

10. *Observatio de lithotomia, quam praecedebant et sequebantur symptomata peculiariora, a Cl. PAMARD.* Puer vndecim annorum a calculo maxime vexabatur, ac febre lenta et macie. Edueto itaque calculo ope lithotomiae, Cl. Auctor sustinuit aegrum merito decocto oryzae. Sed septimo die accesserunt variae fistulae intestini recti et vulneris, ut foeces undique emanarent, et vulnus in vlcus mutarent. Aptis autem fomentis et iniectionibus hic puer post tres menses plane restitutus est.

12. *Excerptum epistolae Cl. CORDON de tribus infantibus unius matris, quorum pars extremitatum*

cute erat destituta. Femina peperit sex infantes, quorum prior et secundus sani erant, tertius a genibus usque ad pollices pedum, et a carpo usque ad extremos digitos cute carebat. Quartus optimè erat formatus et valens; quintus vero et sextus similiter modo, uti tertius, cute priuati erant. Partes denudatae suppurabant tertio die, atque quarto et quinto moriebantur hi tres infantes.

XV.

Traité des sensations & des passions en général & des sens en particulier. Ouvrage divisé en deux parties. Par Mr. LE CAT, Ecuyer, Docteur en Médecine, chirurgien en chef de l'hôtel de Dieu de Rouen, lithotomiste, pensionnaire de la même Ville, Professeur démonstrateur royal en anatomie & chirurgie, Correspondant de l'Académie royale des sciences de Paris, Doyen des Associés regnicoles de celle de chirurgie, des Académies royales de Londres, Madrid, Porto, Berlin, Lyon, des Académies Impériales des curieux de la nature & de Saint Petersbourg, de l'Institut de Bologne, Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences de Rouen. T. I. à Paris 1767. 8. pl. 17. praef. pagg. 95. Tab. aen. 2. To. II. Traité de Sens en particulier. à Paris 1767. 8. 1 alph. 5. plagg. praef. pagg. 56. Tab. aen. 18. To. III. la theorie de l'Ouïe, Supplement à cet article du traité des Sens. à Paris 1768. 8. pl. 19. praefat. pagg. 32. Tab. aen. 13.

i. e.

Tractatio de sensationibus et passionibus in genere, et de sensibus in specie. Opus physiologicum, auctore LE CAT. To. I. II. III.

Ultimum et diu expectatum opus est Cl. CAT, quem paullo post editionem eius perdidit eruditus orbis, illud, quod iam indicamus *). Locupletius longe, variisque ditatum novis observationibus, inuentisque extitisset, ni fatale, anno huius seculi sexagesimo secundo, incendium omnia scripta, huc pertinentia, irreparabili damno destruxisset. A quo tempore in refarciendis iisdem occupatus solertissimus Auctor, vehementer doluit, septuagenario scriptori eam vim ingenii non inesse, quae ad explenda alia officia requiratur. Prima itaque pars nova est, altera iam olim anno 1739 edita, hic non mutata, secusa traditur, animaduersionibus adiectis aucta, tertia, quae theoriam auditus exhibet, nunc addita. Primum fuit, illa vero reportauerat praemium ab academia Tolosana anno 1757. Animus erat, organorum sensoriorum omnium tabulas aeneas proponere, quae vero nondum sculptae sunt, viscerumque historias physiologicas, quibus etiam carere nos iubet Cl. Auctoris mors. Quum autem hinc inde in minoribus commentariis suas sibi proprias opiniones declarasset ille, eas etiam tantum breuiter repetimus saepe, ut ratio disquisitionis appareat, et ex cohaerenti dissertatione dignitas operis constet, ad quod iam accedimus.

Praemittitur toti operi dissertatio de utilitate et necessitate anatomes, qua in genere tantum huius scientiae perpenditur necessitas, quatenus a medicis et chirurgis illa requiri debet, nec non omnibus pe-

X 5

ne

*) vid. Comment. nostr. Vol. XV. p. 177.

ne hominibus aliquam eius cognitionem vtilem fore probatur. Deinde generalia physiologiae momenta et initia eiusdem doctrinae primo operis tomo explanantur.

- Primo nimirum Cl. Auctor de potentiis seu viribus oeconomiae animalis exponit, quo nomine solida, fluidaque, nec non fluidum, quod omnia movet, nerueum scilicet, complectitur. Solidum est, cuius partes firmiter inter se cohaerentes, quiescunt, simplex fibra ex glutine nutritio nascitur, intimior partium connexio et humiditatis absentia differentias faciunt. Ex coniunctionis ratione vasculosa et muscularis fibra fit, longior breuiorque futura per ingredientem succum, qui distendendo fibram tonum solidorum efficit. Nata hinc resistentia, elasticitas est, *organica* dicenda, a *primitiva* diuersa, quae renititur solutioni partium componentium. Dum extrema mobilia solidae partis ad centrum redeunt, *contractio* eius fit, in vasculo vero parietes alterne ad se inuicem accedentes et recedentes, *oscillationem* producunt, ad quam vtramque actionem elasticitas confert, modos in solidis Cl. Auctor iconibus illustrat, simulque, in quantum fluida accedere debeant, solidaque animare, docet. In fluidis autem considerandis eam admittit differentiam, vt *liquores* nominet, sensibus subiectos corporis animalis succos, reliquos subtiles autem *fluida* nuncupet. Illi duplicis generis globulos habent, simplices et compositos, seu aquosos tantum, et quorum mixtioni terra oleum, sal, gummi, resina, accedit: principia, quae ex alimentis nascuntur. Perfectionis gradus in liquoribus diuersi sunt, ex chylo lac, tandemque perfectissimus conficitur sanguis. Transparens et leuiter lacteus chylus est, quod multam aquam habet, fibrosam materiem et globos seu corpuscula irregularia,

ia, per compressionem color eius mutatur, quare lac
 inde fit, cuius etiam molecule maiores sunt, plus
 compressae et rotundiores factae, globulos sanguinis p. 70.
 constituunt, trituratione tamen non fiunt, nec nitro
 eris colorantur, quin potius *calore vitali*, vt in ouo
 incubato patet, seu *fluido caustico*. Huius caloris
 praesentiam et gradus thermometer definit, cui
 utem addi debet accessio quoque fluidi vitalis.
 Quum autem fluidum causticum globulum sangui-
 nis in spongiam conuertit, et phosphori ad instar
 calcinat, inde arbitratur Noster, declarari posse di-
 versitates succorum variorum, in corpore animali
 occurrentium. Solida vero et fluida in motum de- p. 80.
 lucenda sunt, quum per se perpetuo quiescant, id
 quod *fluida* in specie sic nominata ab Auctore, prae-
 stant, quo nomine liquores inuisibiles complectitur.
 Horum duas species habet, altera in animali per at-
 ritum excitatur, volatilium particularum evolu-
 tione, altera extus accedit, aër, materia subtilis et
 spiritus vniuersalis, vtriusque coniuncta actio flui-
 dum causticum constituit. Aër quidem globulos
 liquorum diuidit, impeditque attritum, id tamen non
 sine solidorum actione, sine qua humores coagulan-
 tur et concrescunt, haec iterum opus habent viui-
 ficante fluido, quod in nervis est, *fluido* scilicet *ani-*
mali. Hoc etiam si sensibilitatem corporis facit, p. 85.
 praeterea, quod mutationem admittit, mechanici
 quid in se habet, quod ab vsitatis stimulis amplius
 non moueatur, tandem autem corpus nostrum in-
 corruptum seruat, hinc *fluidum conseruans et vitale*
 dicendum est, inprimis quod est immutabile. De- p. 93.
 pendet itaque oeconomiae animalis integritas ab
 harum potentiarum aequilibrio. Triplici potest
 hoc ratione considerari, vt vel sit vasa inter et fluida
 contenta proportio, vel fluidum causticum inter
 et vitale, vel fluidum inter quod motum, et quod
 sensum

sensum producit. Demonstrare autem iam alibi suscepit Cl. Auctor, motum a fluido nerueo praeestari, cauum neruorum transeunte, sensum vero a fluido, parietes distendente, seu spatium, quod vascula nervosa intercipit. Diuersi aequilibrii gradus, in sexu, aetate etiam et multoties discrepantes, temperamentorum rationem continent, vitae et mortis limites constituunt, quod fuse ostenditur.

p. 109. Fluidi animalis dignitas porro vberiore exposcit peruestigationem, cuius sedes in encephalo habetur. Huius existentia clara et distincta est, natura paullo obscurior. Oritur autem ex spiritu mundi vniuersali, immutabili, omniumque motuum fonte, qui sese cum aliis subtilibus corporis animalis succis commiscet, et hinc motus producit. Applicatur corpori per respirationem, et inde communicatur sanguini, restituens sanguinem venosum in arteriosum in pulmonibus, vehitur per aortae ramos ad cerebrum, in quo separatae purae et meracae eius particulae nunc fluidum animale componunt. Sed, quod summa eius subtilitas impedit, quo minus per se sensus motusque efficiat, opus est quibusdam quasi vinculis, quae in solidis aequae, ac fluidis partibus

p. 122. inueniuntur. Solidae, in quibus sese vnit hoc fluidum, partes, *dura est atque pia mater*, ceu inuolucra cerebri et neruorum, id quod ex eo clarum esse videtur Nostro, quod neque medulla nerui optici neque retina sentit, hinc etiam nec reliquorum neruorum medulla. Parietes enim neruorum organon sensus, et cauitas neruorum organon motus haberi debent, quod parietes ex longe subtilioribus vasculis, non nisi subtilius fluidum admittentibus, consent, quod *fluidum sentiens* est, alterum in cauo fluens, utpote crassius, fluidum *mouens* constituit. Ganglia, quae recte a LANCISIO cerebro substitui dicun-

dicuntur, diuersitates fluidi sentientis faciunt. Fluidae partes, quae fluido animali admiscentur, illudque simul conficiunt, a sanguine debent repeti, quum, p. 128. ligata maiori arteria, musculi sensus et motus pereat, fit autem haec coniunctio praecipue in *glandulis*, quales etiam in cerebro sunt, quarum diuersitates Cl. Auctori persuadent, vt differentias facultatis mentis inde deducat, ipsumque cerebrum *glandulam matrem* habeat. Hae tamen glandulae non fecernunt, sed humoribus tantum spiritus addunt, et fluidum animale suo connubio mutant, id quod glandularum quoque cutanearum officium esse perhibetur, nec non de omnibus reliquis valere. Tumidum etiam glandularum habitum aliunde ac a neruis prouenire non posse, multis monstrare momenti satagit Noster, et sicut cerebro ganglia, ita his glandulas substitui contendit.

Quum itaque fluidum animale ab organis et fluidis, quae in societatem veniunt, impressiones recipiat, omnis inde sensationum et animi pathematum natura illustratur, fuse admodum. Fiunt nempe particulares inde fluidi animalis *modificationes*, cuius characteres fluido eiusdem speciei protinus communicantur, omni que temporis momento varietates percipere possunt. Multam utique adhibuit operam Cl. Auctor, in determinandis tum gratis, tum ingratissimis animi adfectibus, in quibus ebullire et intumescere quasi, vel comprimi et densari animale fluidum supponit, in eo propemodum laudandus, quod phaenomena affectuum mentis, in corporibus nostris occurrentia, sollicite collecta explicare et suae accommodari hypothese fuerit annisus, simulque nec tremorem neruorum, nec refluxum fluidi neruei, ab aliis adsumtum, sufficere probat.

Impressiones, in sensibus externis factae, ad cerebrum delatae, ibidem repetuntur, vt cerebrum sit
echo

- echo aliorum organorum, quare post haec sensus, quos vocamus, interni plenius considerantur, seu functiones mentis, in *perceptione* et *actione* conspicuae. Etsi vero a fluido animali certo pendeant hae mutationes, modum tamen coniunctionis definire non audet, et prioris hypotheseos confirmationem in mentis quoque actionibus quaerit, nec non
- p. 223. de sede animae disputat. Hanc autem inuolucris cerebri insidere autumat, quod, vt supra recensuimus, organon sensationum sunt, quod ab inflammatione meningum delirium nascitur, quod ebrietas sensum et motum delet, quod varia tensio meningum ex diversa modificatione fluidi animalis amentiam producit, quod mentis actiones repetitiones sunt impressionum, in neruorum inuolucris factarum. Id, quod etiam morborum exemplis demonstrare annuitur Cl. Auctor. Inuolucra vero cerebri fluidum animale recipiunt per neruos, huc accedentes, per fila membranarum, quae ad cerebri substantiam penetrantia vasa comitantur, tum per liquores vasorum, v. c. in plexu choroideo, in sinu cauernoso et sic porro, ex quo simul facile deduci potest, quare fetus sine cerebro vixerint. Nec obstare coniicit Noster vulnera durae matris, vel arte inflata, quod exigua sunt, neque tamen sine noxa, quum aliquando innocue pars cerebri destruat.
- p. 232. Ultimo tandem loco de sensationibus immediatis, sympathia et praesagiis sermo fit. Si igitur per sensus mouetur anima: *mediata* fit sensatio, vti in organis sensoriiis per efficaciam corpusculorum clarum est, quae sensum excitat, *immediata* si fluidum animale sine his afficitur. Mens ipsa dum mouetur, *intellectualis* sensatio est, *animalis*, *pathetica* aut *praecordialis*, si anima sensitiua patitur, si machina vero afficitur, *animo vegetalis* appellatur Nostro, vt in nutritione, suppuratione cet. Ad primam classem

sem pertinent praefagia, diuinandi potestas, ad alteram, virgula diuinatoria, vel si sanguis fluit ex cadauere ad praesentiam occisoris, dum commouetur aliquis accessu parentis, alias incogniti, ad tertiam sic dicta efficacia sympathiae, si v. c. puluis sanguini, ex vena misso, admixtus, sudorem excitat, idiosyncrasia sic dicta, dum aliquem amamus, vel auersamur sine causa euidenti. In his autem, quamuis explicationem completam dari non posse, concedit, tamen modificationes fluidorum singulares, et relationes ad se inuicem perpendendas et assumendas esse, monet.

Secundus operum physiologicorum tomus Cl. To. II.

LECAT, specialem sensuum, quos vocant, externorum, disquisitionem continet, quae quidem plures iam ante annos, triginta nimirum et quod excurrit, prodijt atque sic accepta fuit reddita eruditis, vt non solum aliquoties subiiceretur prelo, verum etiam in idiomate anglico ederetur. Quum itaque in multorum manibus versetur ille liber, quae in illo singularia praestiterit Cl. Auctor, vix opus esse arbitramur, ceu omnibus nota, vt multis huc referamus, praesertim, quod sine omni mutatione reusus, hic idem fuerit liber. Placuit tamen Nostro, ad finem libri nouas adiungere adnotationes, quibus vel confirmentur, vel illustrentur, vel defendantur contra aduersarios dicta, de quibus itaque rationem breuiter reddere nostri esse iudicamus.

Quod corpus reticulare, sub cuticula deprehen- *p. 526.*
 tendum, tunicae externae neruorum propaginem
 esse assumit, nunc mucosum corpus a succo neruo-
 so, ex papillulis exsudante, proficisci addit. Diuer- *p. 527.*
 sas linguae papillas ex obseruatione *ALBINI* et
AURAN clarius describit, iisdem et vascula sangui-
 nera accedere et inuolucrum obduci, quod filamenta
 earum

- p. 532. earum distinguat, a pia matre datum. Nasalem
neruum ophthalmici rami quinti paris in naribus
- p. 541. non terminari, sed ad nasum extus ferri monet, et
alibi PEREIRAE singularem furdos mutosque lo-
quentes reddendi artem laudat. Vbi deinde ad
eam, quae multis celebrata est encomiis, baseos cra-
nii tabulam accessit, contra eas, quae obiectae sunt
a Cl. MECKELIO, animaduersiones sese defendit
libere simul profitetur, se vt hominem, ab erroribus
non alienum esse, nihilo tamen minus a natura
non abhorrere hanc delineationem demonstrat
nec Meckelianam quinti paris neruorum delineationem
ex omni parte perfectam esse, probat. De
inde materiam lucis et ignis differre denuo docet,
et per experimenta speculorum causticorum lucem
lunae calorem non excitare ostendit. Quum etiam
contra NEWTONUM asseruisset Noster, circulos
coloris in prisma seiungi non posse, nunc eidem
adstipulans, mentem suam explicat, in ea tamen
perseuerans sententia, reflexionem radiorum in re-
fractionis ratione inuersa versari. Ad anatomiam
oculi pertinet animaduersio, album choroideae cir-
culum corneae inferi, eiusque superficiem quasi in-
ternam constituere, remota quoque choroidea ad
internam faciem corneae tumidum circulum super-
esse, corneam etiam sub sclerotica continuari. Cho-
roideam porro in laminas diuidi, quarum vna iri-
dem, altera coronam ciliarem faciat. Hinc suspi-
catur choroideam in corneam definere, et iridem
constituentem laminam humorem aqueum secerne-
re, quoniam vero corona ciliaris ad retinam acce-
dit, nerueorum spirituum motoriorum inde facilem
esse accessum. Ex congelatis oculis confirmatur
anterior camera posteriorem amplitudine su-
- p. 602. perare. Ad visus organon et sentiendi facultatem,
quam notum est choroideae tunicae tribuere Cl.

E CAT, in ipsa hac tunica ulterius stabiliendam, quae argumenta adiiciuntur, quibus diluantur III. HALLERI aliquae obiectiones, praecipue vero monet, multos sentiendi vim et imaginis picturam confundere, priorem solum choroideae, posteriorem retinae competere. Dum enim alba retina reflectit radios, eam visui non posse inferuire, tangi quoque admodum parum a transeuntibus radiis, ut visum distinctum reddere nequeat, hos potius in choroidea absorberi. Retinae officium admodum mobile statuit, in reparando humore vitreo et crystallino, in adducendo fluido motorio. Nec concedit, sibi nunquam visum, crassum atrumque inter choroideam et retinam, ab HALLERO adsumtum augmentum. Nouo quoque tentamine probat, pallidam ad ortum retinae conspicuam, veram medullae nerui productionem esse, eiusdem ac retina corioris, tunicas autem nerui hoc loco constringi. Choroideam tunicam neruis non egere porro adferre, quod illa sensilis nerui paries est, vascula eam componentia contextu nervoso ligari, qui sensum accipiat. Nouum est phaenomenon, si vno oculo p. 625. c. sinistro microscopio applicato, intuearis obiectum, tunc in charta alba, oculo dextro supposita, pingitur imago, obiecti, sub microscopio detenti, ut depingi queat, quod tamen non omnibus que succedere asserit.

Praeterimus reliqua phaenomena optica, quorum plura adhuc eleganter ab Auctore declarantur, quod et commode satis huc referri nequeunt, et ex non adductis sollicita cura Nostri apparet. Omnis item CHESELDENI observationes hominis caenati ex philosophicis transactionibus n. 402. art. I. huc referuntur.

Properamus enim ad nouam auditus theoriam, To. III.
 ae supplementi loco sensuum pertractationi addi-
 Tom. XVII. Pars II, Y tur.

tur. Reportauit autem ea praemium anno huius seculi quinquagesimo septimo ab academia inscriptionum et elegantiorum litterarum Tolosana, quam non vniuersam tantum theoriam, sed singularum etiam partium, organon constituentium, specialem utilitatem explicatam volebat, in qua re illi satisfecit Noster.

Diuiditur autem in tres partes tractatio, quarum prima structuram organi anatomicam, altera obiectum auditus siue sonum, tertia actionem obiecti in organon seu mechanismum perpendit.

- Structuram ita persecutus est Cl. Auctor, ut de duris siue osseis partibus primum, de mollibus deinde exponat, in singulis miramur subtilitatem descriptionum et adhibiti studii, nec non egregias partium specialissimasque delineationes, ex quibus aliquid quas, quo natura rei plenius intelligatur, normam naturali maiores esse voluit. Pauca vero de his adducemus, quae nobis ex pluribus magis videntur animaduertenda esse.
- P. 33. Ita in neruorum ad aures pertinentium expositione describit nerui maxillaris inferioris quinti paris, et rami eius posterioris alium quem, ab aliis non adnotatum, et a DUVERNOY cum neruo recurrente linguali confusum, minorem et retrorsum arcuatum ramulum, qui et glandulae parotidi ramulos largitur, et deinde per minorem fissuram, in summo loco fissurae articularis maxillaris reperiundam, ad meatum auditorium properat, in
- P. 42. posteriore musculo mallei desinentem. Ossiculis auditus periostrum induci, nunc quidem nemo dubitauit eius vero subtilitatem et ingenitam his ossiculis duritiem eorum incrementum coercere, Noster arbitrat
- P. 55. tur, nec non vasis sanguiferis variis, hic descriptum organum auditus irrigari, simul autem tympanum accedente arteria carotide interna et vena iugulari
- P. 56. tanquam duobus balneis egregie foueri. Portiones duran

ram nerui acustici vidit neruulum quendam in vebulum misisse, num idem sit, quem BERTINUS canalem semicircularem abire conspexit, dubitat, osculo tamen mallei interno ramulum largiri, icondemonstrauit. Ipsa quoque dura mater ad aquae-P. 59.
tum productionem mittit, quae portionis durae m quinti paris tribus ramis coniunctionem efficit, e non cum quarto et sexto pari, atque cum interstali. Siquidem hunc follicita dissectione Cl. Auctorem euit, ab eadem meningis continuatione fila recessse. Tradidit etiam Noster amplam et subtilem rae portionis, nec non quinti paris descriptionem. paris quinti origine notat neruearum fibrillarum, p. 66.
ter se iunctarum, simplicem plexum, et qui accessurae matris confirmatur, plexum gangliformem, planum et quadratum. Recurrens neruus acusticus, siue chorda tympani variis controuersis casionem dedit, num ex quinto pari ad septimum legetur aut contra, non obstante autem acuto in eo coniunctionis angulo, a dura portione nerui acustici eum demitti, adsumit, quod etiam in aliquo P. 74.
iecto, vti icone ostendit, distinctus et separatus o linguali neruo recurrens hic processerit. Ipsa inde chorda tympani mox ad membranam eiusdem nominis arte adhaeret, mox ab ea separata egreditur. Est etiam cavitatis tympani adulti etantis aliqua differentia, quod in illo haec cavitates, pote magis ossea, minor reddatur, hinc chorda in ante longius ac in adulto decurrat. Nerui tantum atque durae matris productio, quae ad aquae-tum accedit, perpetuum nunc nexum portionis rae, recurrentis acustici, quinti paris, intercostalis rui, noni paris, primi, nec non ceruicalium et tui paris efficit, ex quibus conditionibus vterius infectaria fluunt, quae sequuntur.

p. 78. Altera scilicet pars soni naturam contemplatur
atque in tres articulos diuiditur, quorum primus
obiectum soni, seu corporum sonorum naturam
contemplatur, alter medium seu fluidum sonum
transmittens, disquirat, tertius formas corporis so-
nori, transmittendis et multiplicandis sonis idoneas
perpendit. In singulis generales aliquas regulas
proponit, experientia deinde et observationibus
confirmat.

Corpus sonorum percussum, distincte resonat
quod ab elasticitate pendet. Hinc, si corpus fi-
num edere debet, totum in vibrationem coniicitur
cuius diuersitas etiam discriminis soni rationem ha-
bet. Simul autem intestinae oscillationes partium
integrantium, quas vocant, corporis sonori debeant
accedere.

p. 88. Est vero fluidum, sonos transmittens, aer, qui
ablato, soni vis perit, neque tamen crassus ille atmos-
phaericus, sed eius rarior subtiliorque particula
quod confirmatur variis tentaminibus, quum crassus
etiam per membranas tympanum et labyrinthum
obducentes transire nequeat. Haec autem cum
crassiore aeris parte arctissime cohaeret, licet ipse
varios subtilitatis gradus habeat, siquidem simul di-
ferentes sonos transmittat; in singulo etiam gra-
elasticitas et oscillatio peculiaris particularum ee-
Docetur porro, sonum aequae ac lucem per lineas re-
ctas propagari et quidem determinato tempore; ee-
dem, vt illam, modo reflecti; nec per superficies
solidam solum, sed etiam per diuersi generis cor-
pora echo formari.

p. 117. Tandem in eo, quod vibrationes corporis soni
conferuentur, vel etiam fortiores euadentes augeas-
tur, diuersa forma consistit. Vtrumque contingit
aut radiorum sonorum reflexione, v. c. in fornice
quo refertur antrum spirale, quod Syracusis extru-
batur.

atur a Dionysio, cuius etiam icon adiicitur, aut
oscillationibus crebrioribus, in ipso corpore sonoro
excitatis, aut harum causarum mutua coniunctio-
ne in organo acustico.

In quantum autem his principiis adhibendis no-p. 134.
tri faueat organi auditus structura, tertia iam parte
explicatur a Cl. Auctore, qua veram partium organi
monstrandi vtilitatem singularem adhibuit operam,
ecutus normam, quae naturae est, ab exteriori sci-
cet aure ad interiora progrediens. Auriculae con-
formationem eam esse docet, quae in reflectendis
etque ad meatum auditorium transmittendis radiis
sonoris occupatur, incisuras cartilaginei meatus ad-
esse arbitratus, ne compressa auricula laedatur, an-
gulum vero desinentis ad tympanum meatus, augere p. 144.
im numerumque oscillationum. Tympani mem-
brana, naturae nervosae, ovalis formae, transuersis ex-
bris composita si supponitur, percussa harmonice
respondet oscillationibus, hinc simillimis sonis pro-
ducendis adaptata, praecipuum organum sensationis
indicatur. Ossicula auditus ob situm suum compa-
rantur a Nostro, illi, quae tabulae externae in fidi-
us supponitur columnulae, *ame* gallofranci nuncu-
ant, sed ea musculorum actione, ossibus datorum,
minuitur ad sonorum perfectam reddendi rationem.
Quorum *externus mallei*, membranam tantum hanc,
quoad superiorem partem tendit, *anterior mallei*
manubrium antrorsum ducendo, membranam pla-
nam, *internus* vero introrsum concavam reddit, sin-
guli agentes compositas actiones exserunt, *stapedis*
vero *musculus* simul concurrit, et membranam ovalis
praeaminis tendit et relaxat, nec non omnium ope
morda tympani mutatur, tenditurque. His ta-
men motibus fluidum interius non comprimitur aut
sensatur, ipsa potius tympani membrana diuersis
sonis eorundemque efficaciae adaptatur. In tympa p. 168.

ni deinde cauo, vt in omnibus reliquis corporis nostri, aer internus subtilis, ex vasis exspirans inuenitur, cui opitulatur balneum caloris ex vicinia carotidis et iugularis venae. Tuba Eustachiana in palato aperta, ad renouationem huius confert, certis sub conditionibus, qui solertissime a labyrintho auertitur quippe non satis conueniens, nec satis subtilis. Interim omnes internae osseae organi partes fauendo promouendis oscillationibus, quae in cellulis mastoideis multiplicantur, sicut in labyrintho, canalibus semicircularibus et praecipue in cochlea artificiosissima, in qua plus, quam 9632 vibrationes, sonis harmonicae, excitari poterunt, vibrationes nimirum, per impulsu membranae tympani communicatae aeri interno, totum occupanti labyrinthum. Ad quam quidem rem non parum confert, canalium semicircularium orificium superioris et inferioris canalium commune, quod directe afficitur. In auibz deficiens cochlea suppletur copiosis circa tympanum cauernis osseis, membrana inuestitis. Quum denique sine neruo sensatio non fiat, menti communis, tandem neruorum distributionem, et denique summam ex consensu cum multis aliis neruis et per ne omnibus, enatam vtilitatem perpendit. Noster non tantum suarum opinionum firmitatem certior rem reddens, sed etiam ex naturae cognitione euincens.

Remedia ad finem grauiori auditui, applicatae instrumento, succurrendi, per inuentas, a se, machinas acusticas, exhibet, quae ad normam organi artificii efformatae, hic delineatae inueniuntur, nec sine iconismis satis intelliguntur.

Praecipua tantum hic adduximus momenta, quo Cl. Auctoris adhibita constet solertia, nec singulares eius sententias diiudicauimus, quo liberum, omnia ponderanti curatius, sit iudicium. Non possumus

sumus tamen, quin de tabulis adiunctis aeneis quaedam adiiciamus, quarum explicationes additae multos iuuabant anatomes studiosos, siquidem et his in plenius intelligendis explicationibus egere nequeas.

Sunt tabularum aenearum tredecim, quarum *prima* caput osseum, quoad externam superficiem ostendit, *secunda* os temporum, quoad diuersas superficies sistit, *tertia* idem os dissectum proponit, sex diuersis sectionibus, quinque ex homine desumptae sunt, meatus auditorii externi et internae cochleae structurae egregias delineationes exhibentes, *sexta* ex gallo indico tympanum reticulatum refert. Plures internae auris partium delineationes, tredecim nimirum sequuntur tabula *quarta*, quibus membrana ceruminosa et durae portionis canalis inter alia, ossiculorum auditus et cochleae figurae exhibentur. *Quinta* auris externa, cum vicinis partibus mollibus, musculis, vasis nervisque traditur. Quo vero vno quasi obtutu organi acustici coniunctio et viae viae dignoscantur, *sexta* demonstrat transuersam sectionem auris internae per nares, palatum os et laryngem continuatam, quae vero non satis distincta esse videtur. In *septima* quatuor figurae sunt et tum molles tum durae auris externae et internae partes quaedam occurrunt, praecipue musculi vicini et nervi recurrentis acustici siue chordae tympani et maxillaris inferioris decursus. Sed, quod portio dura acustici nervi multos habet cum aliis nervis nervus, tabula *octava* a latere faciei et capitis, resectis ossibus, nervorum et vasorum propagines, inprimis portionis durae iam dictae et nervi quinti paris declarat, nec non in minoribus delineationibus chordae tympani, nervi vidiani plexus maxillae vidiani, aliarumque partium subtiliorum icones speciatim exhibet. Nervum vidianum, durae matris chor. p. 268. lam, cum vicinis partibus nexam esse credidit Cl.

p. 268. **LE CAT**, monitus autem elegantibus **Cl MECKELII** inuentis, qui neruum appellabat, aperta hac productione mollem gryseamque, a pia matre pro-
 venientem, substantiam inesse vidit, qualis pariter est ad neruum intercostalem abiens ramulus. Ar-
 teriae maxillaris internae ramificationes quoque hic
 p. 276. occurrunt, simulque notat chordam pterygoideam, ad foramen caroticum pergentem, ansam circa hanc arteriam durioris indolis constituere, qua dissecta, substantia mollis rubicunda piaë matris soboles appareat, quae neruos imitetur, vt ea propter a **MECKELIO** *ramus profundus nerui vidiani* dicatur. In sex etiam figuris *tabula nona*, duri acustici nerui progressum et eius per duram matrem cum quinto paræ connexionem illustrat, vt appendix duræ matris et quinti paris ganglion amplum, rubicundum et semicirculare, a dura matre formatum, conspiciatur. *Decima* tandem omnium neruorum medullae oblongatae exitum a latere docet, cerebro et cerebello reclinatis, ossibus posterius resectis, nec non vasorum etiam diuisiones. Haec ad anatomen pertinent, Reliquae tabulae ad auditus theoriam spectant, antrum Dionysii et instrumenta acustica referunt.

Passim etiam **Cl. Auctor** aliarum iniecit delineationum mentionem, quae neruorum septimi quintique paris varias anastomoses sint monstraturae, quae debeant physiologico maiori operi adiungi. In vniuersum autem optandum fuisset, vt placuisset **Cl. Auctori** lineares, quas vocant, adicere suis iconibus delineationes, quippe quibus, ne literis numerisque obscurarentur partes subtiliores, fuisset cautum.

XVI.

Noua physico medica.

Februario 1769 societas scientiarum *Bruxellis* fundata atque in duas classes, historicam nimirum et physicam, diuisa est. In quibus omnia, quae ad geographiam, antiquitates, historiam ecclesiasticam, civilem ac naturalem prouinciarum Austriacarum, in Belgio sitarum, vniuersalem et specialem cognitionem climatis eiusque situm, physicam experimentalem, botanicam, mathesin puram atque impuram spectant, proponuntur et examini eruditorum subiiciuntur.

Praemium, quod expectare licet, est moneta aurea viginti quinque numorum aureorum, in cuius vno latere effigies Sacrae Maiestatis Imperialis *MARIAE THERESIAE*, Augustissimae scientiarum patronae, cernitur, et in altero latere spectatur palma, quam cingunt haec verba: *Societat. Bruxell. palma ex largit. Princip.* Leges huius societatis quod attinet, eas cum aliarum societatum legibus conuenire, ad nos perlatum est.

Primus *Eiusdem* conuentus die 5 maii 1769 est habitus, in quo duae propositae sunt quaestiones. Quarum vna ad nos pertinet, et haec est: *quaenam sint principes fodinae metallicae in prouincia Namen; quotuplex sit earum natura atque indoles, quaenam altitudo atque profunditas earum, quaenam genera stratorum super his inueniantur et quid in his obseruandum?* Quae cum societati in elaborationibus missis non penitus exhausta videretur, ab ea 1770 denuo est proposita praemio duplicato.

Praeterito 1770 anno *Roterodami* ab amico quodam artium atque scientiarum cum priuilegio Statuum Belgicorum Societas *Bataua* physico-experimentalis est constituta.

Ad hanc stabiliendam atque praemia distribuenda pecunia ab hoc amatore data est, nec non hoc dictum; *Certos feret experientia fructus*. Experientiae itaque fundamento nisa, disquiret haec societas experimenta, quae spectant ad instrumenta artium et officinarum, quatenus consulunt patriae saluti, agriculturae et rei maritimae; porro observationes examinabit ex physica, chemia, naturali historia, botanica, anatomia, physiologia, praxi medica et chirurgica simul cum remediis, quae nouitatem produnt, depromtas. Nec non astronomiae habebit rationem ad emendandam rem maritimam doctrinamque militarem.

Tres quaestiones, 1771, 1772 et 1773 propositae eo redeunt, ut inquiratur in modum, *patriam ab aquis quibuscunque irruentibus defendendi*.

Non ita multo ante IOANNES HILL, botanica clarus, consilia dedit, Academiae regiae scientiarum constituendae *Londinensis*, cuius patrocinium Regi, protectio vero principibus et nobilioribus exteris, praesidium Cl. HILL deberetur.

Centum et triginta ex nobilissimis Angliae, qui *superiores* Academiae dicuntur, sunt eligendi, a quibus quotannis quinque aurei Anglorum, seu triginta simul expendi debent. Cl. HILL, ut praeses huius Academiae, sex viros, cuilibet promisso praemio annuo quinquaginta librarum, ad disquirendas elaborationes sibi adiunget, quos harum potissimum disciplinarum gnaros esse oporteat; nimirum historiae naturalis, philosophiae, astronomiae, rei maritimae, agriculturae et chemiae.

Porro Cl. HILL, ut praeses, omnia diriget, quae ad Academiam spectant, cum eruditis totius Europae litterarum habebit commercium, et quotannis vnum, fortasse et plures vulgabit commentarios.

Pro

Pro hoc studio postulat Cl. HILL ducentas libras et quadraginta pro adiuncto, quem sibi eliget. Praesidium sit perpetuum, nisi Academia illius mutandi nanciscatur opportunitatem. Superiores in posterum non nisi communi suffragio eligantur, illaque pecunia, quae aditu illorum parata esse debeat, impendatur ad bibliothecam et museum apud Cl. HILL comparandum.

Nec minus acta focii et omnes omnino, quibuscum Academiae est commercium, gratis accipiant. Fructus vero, qui ex his actis editis redundare possint, in usum Cl. HILL cadant.

Caeterum quavis septimana a prima ad tertiam horam Academia ibi, ubi habitat Cl. HILL, eo praesente, conveniat. Quodsi vero iter aut morbus eum impediant, praeterea enim nihil excusat, alium denominet. Reliquarum legum condendarum in posterum habebit rationem Cl. HILL.

Quamquam regia chirurgorum Academia *Parisiensis* eam quaestionem, quae vnguentorum et emplastrorum abusum spectabat, in missis elaborationibus non penitus exhaustam iudicavit, ideoque denuo, ut iam retulimus *) proposuit, tamen Cl. BILLARD chirurgus primario rei maritimae et regii equitatus a Brest praemium aemulationis addixit, cum eius explanatio huius quaestionis Academiae non penitus displiceret.

Paruas vero monetas, quas haec Academia quoque distribuit quotannis, attribuit Cll. viris GOYENOT, CHAMBAN, BLANCHARD, chirurgis, Cl. AURRAN, medicinae Doctori Argentoratensi, et Cl. SYLVESTRE, artium Magistro atque chirurgiae studio.

Ad

*) vid. Comment. nostr. Vol. hoc p. 161.

Ad hanc quaestionem, quam Academia elegantiorum literarum, scientiarum et artium *Marsiliensis* 1770, vti retulimus*), repetiit, ita concinnatam: *Quae sit optima methodus vini prouincialis parandi atque tractandi tam quoad usum, quam exportationem*, respondit cum assensu Academiae Abbas DU ROZIER, qui vel hanc ob rationem praemium reportauit.

Qua occasione repetiit *Eadem* quaestionem 1770 propositam: *Quomodo optime paretur sapo, et qualis sit usus cinerum in officinis saponariis?**) (sur la meilleure maniere de fabriquer le savon et le meilleur usage des cendres des savonneries)*, huicque addit duas alias quaestiones, ad annos 1771 et 1772 pertinentes, quarum vna haec est: *quinam sit optimus modus ficum colendi et quaenam sint caussae eius corruptionis, ac quomodo ea possit caueri, (sur la meilleure maniere de cultiver le figuier, les causes de son déperissement et les moyens d'y remédier;)* altera est: *quaenam optima oliuarum cultura sit, et quomodo possint infesta, arbori aequae ac fructibus infesta arceri? (sur la meilleure maniere de cultiver l'olivier et de le préserver des insectes, qui s'attachent à l'arbre et au fruit.)*

Singularum praemium est moneta aurea trecentarum librarum Gallicarum. Commentarii sunt mittendi, impensis solutis, per totum ianuarium 1773 ad Cl. MOURRAILLE, qui Academiae perpetuo ab epistolis est, ita, vti apud alias Academias solemne est.

Inter quaestiones, Academiae scientiarum, artium et literarum elegantiorum *Diuionensis* eam, quae ad praemium 1775 reportandum ab Ea est cum viris eruditis communicata, ad nos pertinere intelleximus. Quapropter eam quoque solummodo, missis reliquis,

*) vid. Comment. nostr. Vol. XV. p. 550.

**) vid. ib.

repetimus. Quamquam enim et hanc moralem ac politicam potissimum spectare partem non negamus, tamen ob sanitatem vitamque, omnino independentes, eiusdem hic mentionem fecisse non poenitebit.

Est nimirum ita comparata: *quaenam sint commoda, consuetudinis satis usitatae et antiquae, corporis exercendi et ludorum publicorum instituendorum, variis populis solemnum et diuersis temporibus usitatorum.* (*Quels sont les avantages, que les mœurs ont retirés des exercices et des jeux publics, chez les différens peuples et dans les différens tems, où ils sont été en usage.*)

Tradidit Academia diu antetempus hanc quaestionem ideo, quoniam eo certius atque securius elaborationes accuratas huius quaestionis se nacturam esse arbitratur. Omnes, praeter socios, hanc ad rem declarandam inuitantur, et commentarii a Cl. M A R K E T medicinae doctore, qui Academiae ab epistolis est, ante primum diem aprilis eiusdem anni, cuius supra mentionem fecimus, exspectantur. Praemium, quod huius quaestionis causa distribuetur, moneta quidem est librarum Gallicarum quadragenarum secundum voluntatem fundatoris. Quoniam autem, consentiente eo, quaedam ob rationes est constitutum, per nouem annos pretium illius imminuere, trecentis libris constabit in posterum haec moneta. Id quod et distributionem praemii 1771 retardauit. Reliquae mittendorum commentariorum leges supra iam a nobis *) sunt narratae.

Artium liberalium et scientiarum amatores *Amstelodamenses* elaborationem quaestionis 1770 propositae: *quaenam sit natura, indoles atque procreatio insectorum, quae multis abhinc annis in Belgio palos aggerum, puteorum maritimorum canaliumque nec non ipsas*

*) vid. Comm. nostr. Vol. XV. p. 709.

ipsas naues perreptent et perforent? Quomodo et quam ob rem hic magis, illic minus intrent lignum, ac tandem quaenam sit optima, simplicissima nec nimis sumptuosa liquorum compositio contra ea? a DAVIDE MESSE hortulano Academiae, quae Franequerae floret, Societatum Groningensis et Vlissingensis foedali, missam, hocque dicto inscriptam: *sine ope Dei hominum industria nulla est*, dignam iudicarunt, quae praemio ornaretur. Id quod Cl. MESSE, antequam consilia sua experientia sint comprobata atque confirmata, se accepturum esse negat. Nec non alia tractatio ignoti Auctoris, hac notata sententia, *ad salutem patriae digna iudicata fuit*, priori adjungenda videtur societati, si Auctori nomen suum profiteri placebit.

Quaestiones, 1771, et 1772 exhibitae, sunt hae: vna attinet optimum conjugium ad obtinendam bonam familiam infimae plebis, civium et nobilium in sui et totius omnino societatis humanae salutem; altera spectat ad oras maritimas Seelandiae emendandas.

Praemium, optimae responsioni dicatum, est moneta aurea triginta numorum aureorum.

Roterodami Viri Cl. PATYN et DEMONCHY doctores medicinae ac directores societatis Batavae physico experimentalis nuper constitutae *) professiones medicinae sunt nacti. Ad quas adeundas vterque habuerunt orationes, ac prior quidem die 22 octobris 1770 egit *de certitudine ac firmitate medicinae clinicae ex doctrina morborum in morbis*; posterior vero die 29 eiusdem mensis et anni *de imaginaria frigoris potentia nocente, eiusque praeoccupatae opinionis in minus stabilem Batauorum, praecipue diuitum, sanitatem summo influxu verba fecit.*

Cl.

*) vid. supra p. 345.

Cl. vero VINCK, cui eadem ibidem die 2 maii 1770 prouincia data fuerat, hoc munere se ipse abdicauit veniamque obtinuit.

Hagae Comitum, Cl. I. B. SANDIFORT, fratri EDUARDO SANDIFORT, qui in posterum Lugduni in medicina docenda publice versabitur*), successit.

Göttingae, die 19 iunii 1771. Experientissimus AUGUSTUS GOTTLIEB RICHTER professionem medicinae ordinariam nactus est.

Tubingae, Cl. CHRISTIANUM FRIDERICUM REUSS professionem medicinae extraordinariam accepisse nuper**) retulimus.

Quod munus adiit Vir Cl. secundum vniuersitatis huius institutum dissertatione inaugurali *de diapysmate*, (gallice *poudre*) quam Respondente Nobilissimo *Septimo Christiano Gottlob Seegero* die 13 maii 1771 defendit, atque oratione: *de carice arenaria* (*riedgras*) loco *sassaparillae usurpanda*, quam habuit die 17 maii eiusdem anni.

Ab episcopo Abbatiae Fuldenfis *Fuldae* hortus botanicus est constitutus, et Experientissimus WERNERUS botanices professor nominatus.

Londini HENRICUS PEMPERTON medicinae doctor ac professor die 9 aprilis 1771 desiit viuere.

Cüstrini die 4 augusti 1771 vitam cum morte commutauit Cl. IOANNES HENRICUS GOTTLIEB.

*) vid. Comment. nostr. hoc Vol. p. 163.

**) vid. Comment. nostr. Vol. XVI. p. 710.

LIEB A IUSTI, variis scriptis clarus et chemiae ita studiosus, vt ipsa coecitas eum non plane ab ea abduceret.

Dresdae, CHRISTIANUS HENRICUS EISEN-
LENBURG, rerum metallicarum consiliarius phy-
sica doctrina atque historia naturali clarus, morbi
diuturnitate ita consumebatur, vt diem obiret supre-
mum die 29 Iulii 1771, cuius varia scripta aeque ac
benevolentia et humanitas erga omnes, qua nihil
prius atque antiquius habebat, ita omnibus constant;
vt omnino dignus videatur, cuius memoria posteri-
tati commendetur.

Non nuper viri, rebus publicis bene consulentes,
de modo merfos resuscitandi praecipue cogitarunt,
atque varia variis in locis huius rei optime efficien-
dae dederunt consilia, quae iamiam *) retulimus.
Cum autem admodum magna subitae atque violentae
mortis sit varietas et summa eorum, talem per-
pefforum, infelicitas ideo augeatur, atque quasi con-
firmetur; quoniam fugiunt eos ciues, iisdemque au-
xilium ob honestatis suae maculam euitandam pror-
sus denegant, iussit Clementissimus FRIDERICUS,
Dux Saxoniae Gothanus, modum tradere, quo magi-
stratus et ciues non solum his miseris, sed omnibus
omnino, quacunque ratione mortem subitanam ac
violentam expertis, absque mora ac salua eorum ho-
nestate inferuire, eosque a mortuis quasi excitare te-
neantur, insimulque remedia vulgare, quae quam
celerrime, donec chirurgus aut medicus veniat, a
quolibet sunt adhibenda.

Quae quidem omnia hic repetere ideo incon-
gruum duximus, quoniam partim non pauca in locis
supra

*) vid. Comment. nostr. Vol. III. 517. IX. 579 seqq.
XV. p. 170. et 360.

supra a nobis commemoratis, iam sunt indicata, partim, quoniam pleraque, hic proposita, cum iis, quae PHILIPPUS GABRIEL HENSLERUS medicinae doctor et regius Danicus physicus Altonensis *) collegit atque tradidit, conueniunt. Huius vero libri summam, in quo neonatorum quoque, qui mortui videntur, venenatorum, fulgure atque tonitru tactorum, magnas haemorrhagias passorum, vomitoriis porro purgantibus imprudenter adhibitis, animique commotionibus nimis, potissimum terrore atque timore mortuorum, mentio facta, iisque mendendi, si fieri potest, methodus est praescripta, proxime cum Lectoribus communicare pollicemur.

Aequae magnam atque admirandam humanitatem praese fert simile institutum Augustissimae Imperatricis MARIAE THERESIAE, quae ciues clementissime iussit, omni quo, fieri potest, modo, meritis et omnibus omnino, qui subitam ac violentam mortem experti videbantur, inferuire, eosque, si possunt, vitae restituere. Id quod, ut tanto certius praestetur, quanto seuerius iussum est, constituit Augustissima pro singulo, cui ita latum est auxilium, viginti et quinque florenorum offerre praemium.

Hafniae ibi, ubi hortus botanicus erat, hoc 1771 anno schola veterinaria est condita, in modum scholae veterinariae Lugdunensis, in qua de morbis potissimum armentorum epidemicis praelectiones habebuntur.

Memo-

*) Anzeige der hauptsächlichsten Rettungsmittel derer die auf plötzliche Unglücksfälle leblos geworden sind oder in naber Lebensgefahr schweben. Altona 1770 8.

Memoria IOANNIS ASTRUCI, Medici regis
 Franciae Consilarii, Professoris Medicinae
 senioris in Monte Pessulano et Professoris re-
 gii Parisiensis.

Qui artem ac disciplinam, quam tractandam sus-
 ceperunt, ita excercent, ut non modo victus
 necessarii et quaestus causa, quod sordidum est et
 servile, eam facitasse reperiantur, sed, quod inge-
 nuos homines ac liberales decet, cognoscantur in
 ea excelluisse, praeter multa alia, quae cum ac-
 cuiusque artis studio coniuncta sunt, et ingenii et
 animi oblectamenta, hoc etiam habent praecipui
 ut cum per vitam praemiis improbo animi et corporis
 labore dignis adficiantur, tum post obitum om-
 nis posteritatis memoriae quam diligentissime com-
 mendentur. Neque enim, quod querulorum turba
 nostris temporibus saepius fortasse, quam unquam
 auditum est, iactare solet, usquequaque verum est
 aut ubique, nihil scilicet magnopere vel ad gratiam
 vel ad honores consequendos referre, vtrum aliqui
 literis leuiter imbutus, an totus in iis reperitur
 cum usus rerum doceat et quotidiana experientia, si
 externa fortunae commoda spectes, cum his saepe
 numero peius, quam cum illis agi. Accidit sane
 quod dolendum est, ut vterque parem nonnunquam
 et contemptus et honoris fortunam experiatur, neque
 tamen aetas nostra usque adeo iniusta ac peruersa di-
 ci posse videtur, ut viros in aliqua arte aut discipli-
 na primarios aut praemiis omnibus priuari, aut in
 obscuro latere perpetuo sinat. Id cum ex aliis ma-
 gnorum virorum exemplis constat, tum ex ASTRUCI
 Viri Cel. vita, quam breuiter describemus, patebit
 Namque et hic non solum dum viueret, iusta inge-
 nii, industriae et eruditionis praemia tulit, sed et
 dignus iudicatus est cum ab aliis, tum a nobis, cuius
 nomen

nomen ab obliuione vindicatum posteris tanquam exemplum follertis, industrii, periti atque felicis medici et ad cognoscendi voluptatem et ad imitandi aemulationem proponeretur.

IOANNES ASTRUCUS natus est a. 1684 in oppidulo, Salviae (*Sauve*), quod in Prouincia Occitaniae inferioris situm est, ex familia haud obscura. Patrem habuit eius loci sacerdotem e Protestantium, quorum ibi magnus numerus erat, partibus. Is paulo ante, quam edictum Nannetesianum reuocaretur, commutata religione philosophum se gessit, et iurisprudentiae operam impendens nihil prius atque antiquius habuit, quam vt ambos, quos habebat, filios, omnibus, quibus puerilis aetas impertiri debet, doctrinis erudiret. Quo studio patris atque diligentia id effectum est, vt vterque filius in studiorum, quod sequendum quisque sibi elegisset, genere, insigniter excelleret. Nam natu minor, ante Nostrum mortuus, inter principes Ictorum Tolosae fuit. Sed de Nostro videamus. Hic quidem, fundamētis literarum humaniorum sub patris cura et auspicio rite iactis, Montem Pessulanum petiit, vbi, probata summis illius academiae doctoribus industria, a. 1700 magister philosophiae creatus est. Duobus annis post, cum in artem salutarem gnauiter incubuisset, dignitatem Baccalaurei obtinuit, quam hoc ipso anno 1702 dissertatione *de fermentationis causa* condecorauit. Quae cum a VIEVSSENIO viro artis anatomicae longe peritissimo, cuius tractatio *de nervis* iam prodierat, esset impugnata, ab ASTRUCO defensione admodum liberali vindicata est. Licentiatus deinde a. 1702 d. 12 octob. factus et ad gradum Doctoris Medicinae adscensurus, eum a. 1703. d. 25 ian. facile obtinuit. Hinc, quod sollertissimus quisque vir ac rei medicae studiosissimus

antequam quotidianis aegros visendi curis districtus teneatur, facere consuevit, summam in eo posuit industriam, ut ex lectione librorum tam veterum quam recentiorum quaecunque viderentur utilia, in usus futuros colligeret. Id quod ei tantum profuit, ut, cum ad scribendum animum applicasset, non solum digna, quae dicerentur, facilius occurrerent, sed et scripta ab eo cum propter argumenti delectum, tum propter scientiae subtilitatem optimo cuique ac peritissimo probarentur. Namque dissertatio illa a. 1710 *de motu musculorum* conscripta tanto intelligentium fauore excepta est, ut Cl. MANGETUS eam non dubitaret theatro suo anatomico inferere. Eodem anno in conuentu Academiae regiae scientiarum, cuius socius erat, tractationem *de digestionem* praelegit, quam deinde, delato sibi munere Professoris anatomiae et medicinae in Academia Tolosensi, publicauit. Quae commentatio cum magnas mouisset controuersias, atque inter primos, qui huic rei aduersarentur, Celeb. PITCARNUS, quamquam mutato nomine, se offerret, huic Noster in epistola ad adessorem quendam facultatis Parisiensis perhumaniter scripta, respondit, quae quidem epistola Tolosae a. 1715, typis descripta prodiit. Quae quidem scripta quamquam pauca numero, at interioris doctrinae documento luculenta tantam ASTRUCO auctoritatem conciliarant, ut viri Celeberrimi, CHIRACUS et VIEUSSENIUS de acido, quod hic ex solo sanguine destillari posse existimabat, valde inter se dissentientes, eum huius rei arbitrum statuendum putarent. Quam etsi non dignam tantam contentione iudicabat, tamen ne frustra appellatus videretur, acidum hoc solum nasci e terra bolari, cum capite mortuo sanguinis destillati mixta, decreuit. In quo decreto an VIEUSSENIUS acquieuerit, non constat, a CHIRACO autem Nostrium postea non minoris

minoris factum esse vel id indicio sit, quod ab eo, cum sibi a. 1715 in aulam esset concedendum, petiit, ut se comitem sibi adiungeret. Idem cum a. 1717 Montem Pessulanum vocatus scholas ibi aperuisset, tanta solertia, tantoque cum successu docuit, ut propter singularem in docendo perspicuitatem ad hoc munus natus ab omnibus praedicaretur. Non praetereundum hoc loco videtur, quod tum temporis nonnullas auditoribus tractationes dictitavit calamo excipiendas, tanquam de physiologia et therapia, quas cum aliis communicatas nolebat. Quarum tamen alteram de *therapia* LA MOTTE medicus quidam sub suo nomine in publicum edidit mutatis quidem, ne verus auctor diuinari posset, variis locis. Eadem vero, fraude detecta, Geneuae postea, licet inuito Nostro, ASTRUCI nomine inscripta prodiit. Pertinent huc dissertationes inde ab hoc anno usque ad a. 1723 sub praesidio eius defensae, quas hic enumerare, cum commodiorem locum in indice infra subiecto habeant, non placet. Illud autem intelligi volumus, ASTRUCUM, licet omnes doctrinae medicae partes diligenter coluerit, tamen praecipuo quodam studio et amore historiae naturalis et disciplinae metaphysicae flagrasse. Quod hic propter duas dissertationes, quarum una a. 1719 de *sensatione*; altera 1729 de naturali et praeternaturali iudicii exercitatione exiit, nec non propter iudicia, quibus a viris et dignitatis grauitate et doctrinae excellentia principibus ornatus est, monuisse sufficiat. Etenim fama eius in dies crescente, et discipulorum laudibus et profectibus per totam Europam propagata, a. 1720 a Rege praemio annuo honorario septingentarum librarum Gallicarum, ornatus est, et Celeb. DODARTUS, medicus aulae francicae primarius, de eximia, quae in homine esset, historiae naturalis patriae cognitione certus, anno insequenti

aquis prouinciae Occitaniae medicatis Nostrum praefecit. Contagio circa hoc tempus Massiliae grassante et per hanc prouinciam omnem fere diffuso, cum nemo non vereretur, ne totam Franciam malum corripere, huic quomodo occurri posset, Nostrum a. 1722 praeclara dissertatione demonstrauit. Sed quamuis Mons Pessulanus ASTRUCUM foueret, tamen ingenio suo ad maiora adspiranti parum facere satis videbatur. Itaque, hoc relicto, Lutetias Parisiorum magno cum librorum apparatu, quos, conferendis cum viris doctis sermonibus, emendaturus erat, adiit. Neque hic in obscuro latebat. Quando autem illi non tanta, quantam volebat, librorum in bibliothecis perlustrandorum potestas erat facta, aliaque, de quibus hic commemorare nihil attinet, minus ex sententia euenerant, anno 1729, Regi Poloniarum et Electori Saxonum medicus primarius vocatus cessit. Vnde tamen haud ita multo post in commodam sibi hic viuendi conditionem sentiens, rursus Lutetias petiit. Atque eodem tempore sibi contigit, ut propter multa, quae Tolosensibus attulisset, commoda, in senatum Tolosensem allegeretur. Quem honorem breui post dignitas medici apud Regem Franciae consilarii consecuta est. Quid? Viro Cl. GEOFFROY facultatis medicae Decano et Professore regio Parisiensi, a 1731 ad doctrinae physicae et medicae damnum ingens defuncto, ASTRUCUS omnibus, qui grauitatem huius muneris intelligerent, dignus prae ceteris existimabatur, cui haec prouincia tuto posset tradi. In qua administranda se talem praebuit, ut nec plus sperari posset, nec spei responderi felicius. Etenim per sex annos omnium morborum historiam, curationemque eorum auditores ita docuit, ut non solum populares, sed et peregrini, aliis academiis iam frequentatis, constanti illius fama allekti ad audiendum eum confluerent.

fuissent. Neque vero minus in exercenda arte versatus fuit. Quod praeter dignitatem medici regii consilarii, de qua mentionem fecimus, cum alia hoc ex genere scripta declarant, tum in primis tractatus de lue venerea a. 1736 cum eruditis communicatus. Cuius quidem praestantia vel ex eo apparet, quod latine scriptus in plures alias linguas conuersus habetur. Sed licet variis officiis, controuersis, nec non aegrorum lectulis obeundis occupatus teneretur, tamen non ita impediri se passus est, quin literis, quas in deliciis habebat, vacaret. Namque commentariis super Antiquitatibus et Historia Nat. provinciae Occitaniae tantum temporis, tantumque laboris impendit, ut iam senex factus, vel in grauissima hieme, mane ad horam tertiam, museo non calefacto, iis conficiendis intentus reperiretur. Neque minus operae et industriae collocarat in conscribenda facultatis medicae Montispeffulanae historia, quae, cum ipse vel ob contentionem medicos inter et chirurgos, quinque epistolis a se illustratam edere nollet, vel ob alia impedimenta non posset, post obitum eius cura Cl. LORRY prodiit. Anno 1743 adfessor facultatis Parisiensis communi omnium suffragio lectus est. Quod cum oppido paucis, iisque maximis viris contingat, praeter cetera, quae ad tuendum tale munus pertinent, officia, id egit, ut nullus haberetur conuentus, cui non adesset, nec quidquam eorum, quae ibi agerentur, negligeret. Quid? quod cum ad extremam senectutem peruenisset, nihil de laboris studio, assiduitateque remittens praeter plures diuersi argumenti commentationes, non sine plausu exceptas, insigne illud opus, quod omnium recte iudicantium punctum tulit, *coniecturas suas de originibus*, quas Moyses in conficiendo librorum suorum primo secutus videtur, edidit. Denique a facultate Parisiensi inquirendi in contro-

uerfias infitionis variolarum negotio ſibi demandato, in iis comprimendis, componendisque vltimo vitae anno plurimum temporis conſumſit. His igitur rebus effecit, vt et vita eius amicis eſſet cara, ac rei literariae non minus, quam aegrotantibus vtilis, et mors his omnibus luſtuofa, nobis etiam, qui virum ſemper amatum ſuſpeximus, admodum acerba. Obiit d. 15 maji a. 1766 aetatis 82 Matrimonium inierat cum IOANNE SCANELIA virgine ſue gentem ſpectes ſue virtutem lectiſſima, ex qua duos liberos, filium et filiam ſuſcepit. Haec matrimonio iuncta DE SILHOUETTE viro gente Nobili, munere Aulico, cum proximo ante patris obitum anno e vita diſceſſiſſet, haud parum ad valetudinem eius frangendam et debilitandam contuliſſe creditur; ille autem patri ſuperſtes dignitate Praeſidis honorarii iudicii ſupremi, aliisque honoribus viuit ornatus.

Index ſcriptorum, quae edidit b. ASTRUC.

Theſis med. de cauſſa fermentationis, Monſpel. 1702. 12.

Mémoires ſur les petrifications de Boutonnet petit village près de Montpellier, ib. 1708. 8.

Conjectures ſur le redreſſement des plantes inclinées à l'horizon. Mémoire des l'Academie, 1708. ib.

Diſſertatio phyſico anatomica de motu muſculari, ib. 1710. 12.

Traité de la diſteſtion des animaux pour montrer, qu'elle ſe fait par le moyen d'un levain, à Paris, 1710. 12.

Mémoire ſur la cauſſe de la diſteſtion des alimens, à Montpellier 1711. 4.

Traité de la cauſſe de la diſteſtion, ou l'on refute le nouveau ſyſteme de la trituration et du broyement, et ou l'on prouve, que les alimens ſont digérés

- gérés et convertis en chyle par une véritable fermentation, à Toulouse 1714. 8.
- Epistolae, quibus respondetur epistolari dissertationi
THOM. BOERI de causis concoctionis ib. 1715. 8.
- Diff. chirurg. de fistula ani Monspel. 1718. 12.
(*Quae anglice reddita prodiit Londini 1738. 8.*)
- Diff. med. de hydrophobia, ib. 1719. 12.
- Quaest. med. de naturali et praeternaturali iudicii
exercitio. An iudicii exercitium deprauatum a
cerebri mechanismo et qua ratione pendeat? ib.
1720. 4.
- Dissertation sur la peste de Provence, ib. 1722. 12.
- Thesis med. de phantasia et imaginatione, ib. 1723. 8.
- Dissertation sur la contagion de la peste, ou l'on
prouve, que cette maladie est véritablement con-
tagieuse et ou l'on repond aux difficultés, quel' on
oppose à ce sentiment, à Toulouse 1725. 8.
- Mémoires pour l'histoire naturelle de la Prouince
de Languedoc, divisés en trois parties, ornés de
figures et de cartes en taille douce, à Paris 1737. 4.
- Cinq lettres dans le procès de médecins contre les
chirurgiens ib. 1737. 4. (*Singulatim prodierunt
primum, postea coniunctim cum aliis editae sunt hoc
titulo:*)
- Lettres de JEAN ASTRUC, Jean LOUIS PETIT
et autres sur les disputes, qui se sont élevées entre
les médecins et chirurgiens avec leurs reponses,
ib. 1738. 4.
- De morbis venereis libri nouem, in quibus differi-
tur tum de origine, propagatione et contagione
horumce affectuum in genere: tum de singulo-
rum natura, aetiologia, et therapia, cum breui
analyfi et epicrifi operum plerorumque, quae de
eodem argumento sunt scripta. Editio altera au-
ctior et emendatior, in qua additae sunt duae dis-
sertationes nouae. Tom. I. II. Lutet. Parisio-
rum

- rum 1740. 4. (*Secundum quam editionem versum Franco Gallica facta est, quae, repetitis vicibus recusa, ultima 1755. 12. et anglica per SAMUELEM CHAPMANN Londini in duobus voluminibus 1755. 12. et germanica per IO. GOTTLÖB HEISE Francofurti et Lipsiae 1764. 8. prodiit. Prima vero huius libri editio, sex libros tantum continens edita est ab Auctore, 1736. 4.*)
- Tractatus pathologicus. Genevae 1743 et 1753. 8. Parisiis 1766. 12.
- Tractatus therapeuticus, Genevae 1743. 8.
- Questio med. an ex anatome subtiliori ars medica certior? Paris 1743. 4.
- Quaestio med. an sympathia partium a certa nervorum positura in interno sensorio? ib. 1743. 4.
- Etat des contestations entre la faculté de médecine et la communauté des chirurgiens, à Paris 1747. 4. (*Testo b. Autoris nomine hic liber prodiit.*)
- La nécessité de maintenir dans le Royaume les écoles de chirurgie, qui y sont établies dans la faculté de médecine, ib. 1749. 4.
- Quaest. med. an morbo colicae pictonum dicto vaesectio in cubito ib. 1752. 4.
- Conjectures sur les mémoires originaux dont il paroît, que Moïse s'est servi pour composer le livre de la génèse, avec des remarques qui appuient ou qui éclaircissent ces conjectures, à Bruxelles et à Paris, 1753. 12.
- Dissertation sur l'immaterialité et l'immortalité de l'ame, à Paris 1755. 4.
- Doutes sur l'inoculation de la petite vérole, proposés à la Faculté de médecine de Paris, ib. 1756. 12.
- Quest. med. an saccharum alimentum? ib. 1759.
- Traité de tumeurs et des ulcères ou l'on a tâché de joindre à une théorie solide la pratique la plus sûre

- sûre et la mieux éprouvée avec deux lettres. 1) sur la composition de quelques remèdes, dont on vante l'utilité et dont on cache la préparation 2) sur la nature et le succès des nouveaux remèdes qu'on propose pour la guérison des maladies vénériennes Vol. I. II. 1759. 12. (*Huius libri versio Germanica tradita est Dresdae et Varsouiae, 1761. 8. a GEORG. LUDOV. RUMPELT.*)
- Traité des maladies des femmes, où l'on a tâché de joindre à une théorie solide la pratique la plus sûre et la mieux éprouvée. Avec un catalogue chronologique des médecins, qui ont écrit sur ces maladies, à Paris 12 Vol. 7. (*Quatuor huius operis partes prodierunt 1761, quinta et sexta 1765 septima vero 1766 hoc titulo :*)
- L'Art d'accoucher, réduit à ses principes où l'on explique les pratiques les plus sûres et les plus utiles dans les différentes espèces d'accouchemens, avec l'histoire sommaire de l'art d'accoucher et une lettre sur la conduite, qu'Adam et Eve durent tenir à la naissance de leurs premiers enfans. (*Anglica translatio huius libri prodit, Londini 1762. 8. latina Venetiis, 1763. 8. germanicae Dresdae 8. per CHRISTIAN. FRIED. OTTO.*)
- Lettre sur l'espèce de mal de gorge gangreneux, qui a régné parmi les enfans l'année 1748 à Paris 4.
- Memoires pour servir à l'histoire de la faculté de médecine de Montpellier, revus et publiés par Mr. LORRY, ib. 1767 4.

XVII.

Continuatio indicis scriptorum physico medicorum, quae anno 1768 prodierunt.

Tentamina medico chirurgica de felici in quibusdam animantibus vteri extractione, deque partium regeneratarum et cicatricis natura. Auctore IOSEPHO LAVALLINO, in Regio Florentino nosocomio chirurgo, clinicae magistro atque historiographo. Florent. 8 mai. c. f.

IOS. NICOL. LAURENTII specimen med. exhibens synopsin reptilium emendatam cum experimentis circa venena et antidota reptilium Austriae corum. Vienn. 8. c. f.

LUDOV. CAROL. VAN LELYVELD diss. sistens observationes quasdam de salibus lixiuiis plantarum. Traiect. ad Rhen. 4.

IO. NEPOM. ANTON LEUTHNERS *Abhandlung und Beobachtungen von der Ruhr unter dem Bauernvolke in der Churfürstlich Churbayerischen freyen Reichsgraffschaft Haag, im lahre 1767 München 8.*

La nouvelle maison rustique, ou oeconomie générale de tous les biens de campagne; la maniere de les entretenir et de les multiplier, donnée ci-devant par M. LIGER. Neuvième edition. Vol. II. à Paris 4.

An essay on diseases incidental to Europeans in hot climates with the method of preventing their fatal consequences. By I. A. M. LIND. An appendix concerning intermittent fevers. A simple and easy way to render salt water fresh and to prevent a scarcity of provisions in long voyages at sea. Lond. 8 mai.

Eiusd. Versuch über die Kranckheiten in heißen Ländern. Aus dem Englischen übersetzt. Leipz. 8.

CAROLIA LINNE' systema naturae per regna tria natu-

naturae secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus et differentiis. Tom. III. Holm. 8.

Eiusd. diss. de coloniis plantarum. Resp. Io. Flygare Vpsal. 4.

Eiusd. diss. de medico sui ipsius. Resp. Io. Gryffelio. ib. 4.

Eiusd. diss. rariora Norvegiae sistens. Henric. Toning. ib. 4.

PETR. LOEFLING iter Hispanicum eller resa til spanska Landerna vti Europa och America förättad ifrån Aor 1741. Til Aor 1756. med. beskrifningar och rën äfver de märkvärdigaste växter utgifren efter des Frånfälle af CARL LINNAEUS. Stockholm 8 c. f.

L. LUCAS *Versuch von Wassern. Zweyter Theil von kalten Wassern. Aus dem Englischen übersezt von D. IO. ERNST ZEHER. Altenburg 8.*

CHRISTIAN. GOTTLIEB LUDWIG progr. inaug. de cruore post venae sectionem aucto et imminuto. Lips. 4.

Eiusd. progr. inaug. de suctione vulnerum pectoris. ib. 4 c. f.

Eiusd. progr. de rei herbariae studio et vsu ib. 4.

Eiusd. progr. inaug. de elaboratione succorum plantarum in vniuersum. Pars I. Radix Caudex, Folium. ib. 4.

Erstes Tausend neuer chymischer Versuche und Erfahrungen, so mit allem Fleisse angestellt und sorgfältig aufgezeichnet worden von D. M. Leipzig 8.

The doctrine of inflammation, founded upon reason and experiences and intirely cleared from the contradictory systems of BOERHAAVE, VAN SWIETEN and others. By DANIEL MAGENSE. M. D. Lond. 8 mai.

ACOB MALLEEN's geurgia Finnica. Abo.

Ein

- Ein Dutzend Beobachtungen, welche das Hirn betreffen, von FERDINAND MARTINI. Kopenh. 8.*
- Neues systematisches Conchyliencabinet, geordnet und beschrieben von FRIEDRICH HEINR. WILH. MARTINI, der Arzneygelahrtheit Doctor und Practicus in Berlin, und unter dessen Aufsicht nach der Natur gezeichnet, und mit lebendigen Farben erleuchtet durch ANDREAS FRIEDRICH HAPPEL der Berlinischen Academie Naturalienmaler, Nürnberg. 4.*
- SEBASTIAN. IO. BAPT. LEVIALLE DE MASSMOREL de aquis montis aurei. Montpel. 4.
- ABRAHAM MATTHIEU diss. inaug. sistens febri malignae morbillosae anno 1766 et 1767 in inferiore Alsatia epidemicae historiam. Argentorat. 4.
- T. MAXWELL'S answer, to Kirkland's essay on fevers. Lond. 8.
- Nomenclatura critica morborum ocularium, or a critical index to the distempers of the eyes. By JOHN HENRY MAUCLERC. Lond. 8.*
- CHRISTIAN GOTTLOB MENGELS *oekonomische Gedanken. 6ter Theil. Kopenhag. 8.*
- Nouveau traité du poulx, par M. MENURET. Paris 12.*
- Dissertation sur la génération et la transformation des insectes de Surinam, des Indes etc. dans laquelle on traite des vers et des chenilles de Surinam, des plantes, fleurs et fruits, dont ils vivent et dans lesquelles on les a trouvés; on y parle aussi des crapauds, lézards, serpens, crocodilles, araignées et autres petits animaux du même pays, peints sur les lieux d'après nature et gravés depuis supérieurement par les plus habiles de l'art: on y a joint un traité de changemens des poissons en grenouilles et des grenouilles en poissons par MARIE SIBYLLE MERIAN, actuellement*

ellement complet en 76 planches in fol. compris trois planches de tables pour expliquer les noms et couleur des plantes, fruits etc. pour ceux, qui desireront les colorer eux mêmes. à Paris.

Traité des arbres resineux conifères, extrait et traduit de l'Anglois DE MILLER, avec des notes, observations et experiences par M. le Baron DE TSCHUDI. ib. 8 c. f.

IO. GEORG. MODEL *Fortsetzung seiner chymischen Nebenstunden.* Petersburg 8.

IO. FRIDR. MOLLER diff. inaug. de vera Peruuiani corticis vi specifica. Götting. 4.

Traité des eaux minerales avec plusieurs mémoires de chymie relatifs à cet objet par M. MONNET. à Paris 8.

Opusculs de chirurgie par Mr. MORAND. Première partie. ib. 4. c. f.

IO. GOTTFR. MORGENBESSERS *Gedanken von der Nothwendigkeit der Zubereitung vor der Einpropfung der Kinderblattern, nebst einer Anzeige seiner Vorlesungen.* Breslau 4.

Eiusd. *Kurze Betrachtung über die Art der Zubereitung vor der Einpfropfung der Kinderblattern. Nebst einer Anzeige seiner Vorlesungen.* ib. 4.

IO. SIGISMUND. MÜLLER diff. inaug. raram de calculo vesicae obseruationem atque epicrisin sistens. Argentor. 4.

NATALIS IOSEPH. DE NEKER *deliciae Gallo-Belgicae, s. tractatus generalis plantarum Gallo-Belgicarum ad genera relatarum cum differentiis specificis nominibus triuialibus, pharmaceuticis, locis natalibus, proprietatibus virtualibus ex obseruatione, chemiae legibus, auctoribus, praeclaris cum animaduersionibus secundum principia Linnaeana.* Argentor. 8 Voll. 2 c. f.

OCTAV. NERUCCI *historia febris epidemicae senensis*

nensis anno 1766 et 1767, et oratio pro studio-
rum instauratione. Sen. 8 mai.

FRANC. IOS. OBERKAMP collectio dissertatio-
num inauguralium medicarum Lugduno-Batauo-
rum. Franc. ad Moen. 4. Tom. I.

GOTTLOB. EUSEB. OELTZE commentatio iuri-
dica de partu vivo, vitali aut non vitali, praeci-
pue ratione transmissionis haereditatis. Ien. 4.

FERDIN. CHRH. OETTINGER diss. inaug. de ir-
ritabilitate vegetabilium in singulis plantarum
partibus explorata vltterioribusque experimentis
confirmata, Resp. Io. Frid. Gmelin. Tubing. 4.

Dissertation physique et botanique sur la maladie
néphrétique et sur son véritable spécifique le rai-
sin doux, par DOM. IOSEPH. OPIER. à Paris
8. Vol. I.

Iudicium subter medicum, de veritatibus et monitis
practicis male iudicantem, iudice FRANC. IO-
SEPH. OSWALD. München. 4.

TIMOTH. CHRIST. CUIL. OVERKAMP diss.
inaug. de duplici ritu expositionis aegrotorum in
vias publicas et incubationis seu ἐγκοιμήσεως eo-
rundem in templis medelae adipiscendae caus-
arum olim peractae celebrataeque nonnulla expositae
sistens, Resp. Laurent. Christ. Tingstadius. Gry-
phiswald. 4.

Précis de chirurgie pratique, contenant l'histoire
des maladies chirurgicales, et la maniere la plus
en usage de les traiter; avec des observations et
remarques critiques sur differens points. Ouvra-
ge diuisé en deux parties. La premiere traite
des maladies chirurgicales en général; la seconde
des toutes les especes de maladies, qui attaquent
le corps humain, et qui exigent le secours de la
chirurgie. Avec figures en taille-douce. Par
M. P** à Paris 8. (Auctore Cl. PORTAL.)

Refle-

Réflexions sur les affections vaporeuses, ou examen du traité des vapeurs de deux sexes, troisieme edit. publiée en 1767 par Mr. P*** (POMME') à Amsterdam. 12.

NATALIS PAGLIARUCCI diff. inaug. de calculo. Vienn. 8.

Observations et experiences sur diverses parties de l'agriculture par Mr. FORMANOIS DE PALTEAU. à Paris. 12.

Saggio di nuove osservazioni escoperte del NATAL. GIUSEPPE PALUCCI. In Firenze. 8.

Histoire de la petite vérole, avec les moyens d'en préserver les enfans et de l'anéantir en France avec la traduction du traité DE RHAZE'S. Traduit de l'Arabe par Mr. I. I. PAULET, Doct. en Médecine à Paris. 12. Voll. 2.

Eiusd. mémoire pour servir de suite à l'histoire de la petite verole; dans lequel on démontre la possibilité et la facilité de préserver un peuple entier de cette maladie. ib. 8.

Kurtzgefaßte Abhandlungen über verschiedene, den Ackerbau betreffende, Gegenstände, zur Veranlassung und Beförderung einer vollkommenern Aufklärung der darinn behandelten Materien, abgefaßt und in der Versammlung der Königlich-Dänischen Acker-academie vorgelesen von P. E. PETERSEN. Flensburg. 8.

O. PFEFFINGER meditationes circa morbum variolosum. Resp. et Auctore Isaac Ottmann. Argentor. 4.

ERNEST. PLATNER progr. anima, quo sensu crescere dicatur? Lips. 4.

ANT. GUIL. PLAZ progr. inaug. non omnia in re medica bono semper exemplo fieri. Prolusio Ina. ib. 4.

Tom. XVII. Pars II.

A a

ANT.

ANT. GUIL. PLAZ progr. inaug. de fostris.
Lips. 4.

Méthode nouvelle et facile d'administrer le vif argent aux personnes attaquées de la maladie vénérienne. On y a joint vne hypothèse nouvelle sur l'action de ce metal dans les voies salivaires. Ouvrage traduit du latin de M. I. I. PLENCK par Mr. LA FLIZE, maître en chirurgie de Nancy à Paris 12.

Eiusd. Anfangsgründe der Geburtshülfe. I und II. Theil. Wien 8 c. f.

De variolarum insitione praelectio habita VII die novembris anni 1767 ab HOMOBONO PISONI. Patau. 8.

HO. CPHP. POHLIUS diss. inaug. de causis obstructionis lentae. Resp. Io. Gottfr. Lehmann, Lips. 4.

Eiusd. progr. inaug. de communicatione cellularum contextus cellulosi. ib. 4.

Eiusd. progr. inaug. de sede obstructionis inflammatoriae. ib. 4.

Essai sur la nature et les progrès de la gangrène humide vulgairement dite pourriture, par Mr. H. I. POINTE. à Amsterdam et à Lyon. 8.

Observations on the nature and consequences of those injuries to which the head is liable from external violence. By PERCIVAL POTT, M. D. Lond. 8 mai.

Eiusd. Some few general remarks on fractures and dislocations. ib. 8 mai. c. f.

Eiusd. Abhandlung von der Mastdarmfistel. Aus dem Englischen übersetzt. Wien, 8, c. f. (Versionis huius Auctor est, JOSEPH. IACOB. PLENK).

Eiusd. Abhandlung von den Hauptwunden, worinnen von der Beschaffenheit und den Folgen derselben, von den Quetschungen, von den Brüchen, Spalten und

und Eindrückungen der Hirnschale, Ergießung des Geblüts auf die Hirnhäute und Erschütterungen des Gehirns, ausführlich gehandelt wird. Aus dem Englischen übersetzt, nebst einigen Anmerkungen und einem Verzeichnisse der besten Schriftsteller, so von den Hauptwunden handeln. Nürnberg. 8

J. A. M. IGNAT. PRANDT diss. inaug. de vesicantibus. Vienn. 8.

Landwirthschaftliche Erfahrungen zum Besten des Landmanns. Eine Wochenschrift von IO. HEINR. PRATIE. Erstes Quartal. Altona. 8 mai.

Dissertation physique et botanique sur la maladie néphrétique et sur son véritable spécifique le raisin d'ours (vua ursi) par Dom. JOSEPH QUER. Traduit de l'Espagnol. à Strasburg et à Paris. 8.

*Considérations aux mères, qui veulent nourrir leurs enfans; avec des observations sur les dangers, auxquelles elles s'exposent, ainsi que leurs enfans en ne les nourrissant pas, par M^{de} DE LER**. à Utrecht 8.*

OTTO LIEBRAMMELT, Kunstgärtners in Beuchlitz und Mitglied der oeconomischen Gesellschaft zu Leipzig, vermischte oeconomische Abhandlungen zum Besten der Landwirthschaft und Gärtnerey, aus eigener Erfahrung und angestellten Versuchen mitgetheilet. Halle. 8.

Chirurgie d'armée, où traité de plaies d'armes à feu et d'armes blanches, avec des observations sur ces maladies, les formules des remèdes, qui ont le mieux réussi; des méthodes nouvelles pour leur traitement; des instruments pour tirer les corps étrangers; un moyen assuré pour la réduction des fractures et des luxations et une infinité d'autres détails neufs et intéressans. Par Mr. J. A. RAVATON. à Paris. 8.

De la conservation des enfans; ou les moyens de les fortifier, de les préserver et guérir des maladies, depuis l'instant de leur existence, jusqu'à l'âge de puberté, par Mr. RAULIN. Tom. I. II. à Paris. 12.

IO. S. RAYMUND diff. inaug. de exanthematibus febrilibus in genere. Vienn. 8.

IO. DIETR. REESE diff. inaug. de variis phti-
sin pulmonalem sanandi conatibus. Lugd.
Bat. 4.

IO. IACOB. REICHARD diff. inaug. de Peruvianæ
corticis in plurium generum febribus exhibendi
opportunitate. Gotting. 4.

IACOB REINLEIN diff. physico-chemico-medica
de phosphoris. Vienn. 8.

IO. BENJAMIN REISIG diff. inaug. de sulphurii
crudi usu interno. Lips. 4.

*Die um Danzig wild wachsenden Pflanzen nach
ihren Geschlechtstheilen geordnet und beschrieben
von GOTTFRIED REYGER, Danzig. 8.*

AVG. GOTTLIEB RICHTER epist. gratulatio-
operationes aliquot, quibus cataractam extraxit
describens, Götting. 4.

Recensio succincta de usu atque effectibus medica-
mentorum Richterianorum, quae Halae Magde-
burg. dispensantur, et quibus non tantum leues
sed grauiorès quoque morbi feliciter curantur
edita a nepote inuentoris CHRIST. FRID. RICHT-
TER, Lips. 8.

Tractatus medicus de affectibus animae, quate-
nus machinam corpoream in consensum tra-
hunt. Auctore CHRIST. RICKMANN, M. D.
Ien. 4.

IO. MICHAEL ROEDERER diff. inaug. de val-
vula coli. Argentor. 4. c. f.

Censura

Censura medicinae vniuersae enormiter dispendio-
sae, immo mortiferae a FRANC. COMITERON-
CALLI PAROLINO XXIII. opusculis septenni
studio exarata, insertis nouissimis vero et com-
probantibus nunc primum additis principum aca-
demiarum sapientum ad eundem epistolis,
Venet. 4.

Tal om en ben- eller stenaktig starr vid hessa omki-
etsen af uvea fast vaxen, semlykeligen blifuit med
med Noten nedtryckt; hållet for kongl. vetens-
kaps Academiens vid praesidii nedlaygande den
20 April 1768 af CASTEN BONNOW. Stock-
holm 8 mai.

Handleiding tot de Kennis en Geneezing van de
Ziekten der Kinderen geschreeuen door den Hee-
re ROSEN VAN ROSENSTEIN vertaald met
Aanmerkingen en Byvoegselen vermeerderd door
EDUARD SANDIFORT. In 's Graven-
hage 8.

iusd. *Anweisung zur Kenntniss und Cur der Kinder-
krankheiten. Aus den Schwedischen übersetzt von*
IO. ANDR. MURRAY, Göttingen und Gotha
2te und vermehrte Auflage, 8.

ettre de M. ROUGNON Professeur en Médecine à
M. LORRY (*touchant les causes de la mort de M.*
CHARLES) à Besançon 8 mai.

ournal de médecine, chirurgie, pharmacie etc. par
M. A. ROUX Tom. XXVIII Jan. Febr. Mars, a Pa-
ris 8. c. tab. aen.

ssay on inoculation for the small-pox. By THOM.
RUSSON M. D. Lond. 8.

oyage de France, d'Espagne, de Portugal et
A a 3 d' Ita-

d'Italie. Par M. S. du 22 avril 1729 au 6 fevrier 1730 à Paris 8. Vol. 4.

Histoire naturelle et politique de la Pensilvanie et de l'établissement des Quakers dans cette contrée traduite de l'Allemand par P. M. D. S. Censeur Royal, précédée d'une carte géographique à Paris 12.

Y. C. L. S. *Physicalische Untersuchung, ob auch patagonische Riesen möglich und die Erzählung davon wahr sey?* Leipz. 8.

* * SALUCE *Betrachtungen über die flüssige elastische Materie, welche aus dem Schießpulver erzeugt wird.* Berlin 8. m. K.

Materies medica in regno vegetabili. Auctore GABRIEL PETR. SALLE, Monspel. 4.

EDUARD SANDIFORT thesaurus dissertationum, programmatum, aliorumque opusculorum selectissimorum Vol. I. Roterodam. 4. c. f.

Nosologia methodica sistens morborum classes iuxta SYDENHAMI mentem et botanicorum ordinem. Auctore FRANCISCO BOISIER DE SAUVAGES. Editio noua auctior et emendatior, à Amsterdam et à Paris, 4 Vol. 2.

Essai sur la conformité de la médecine ancienne et moderne dans le traitement des maladies aiguës, traduit de l'Anglois de Mr. SCOMBERG Doct. en médecine, par M. l'Abbé BARKER du Collège des médecins de Londres, Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée par M. LORRY Doct. en médecine, à Paris 12.

IO. CHRIST. SCHAEFERS *dritter und letzter Nachtrag zum Gebrauch und Nutzen der Regenspurgischen Waschmaschine,* Regensb. 4. m. K.

IO. CHRIST. SCHAEFERS. *erstere Versuche mit Schnecken nebst 3 ausgemahlten Kupfertafeln, ib. 4.*

AUG. SCHAARSCHMIDTS *Unterricht von den Kranckheiten der Knochen, Berlin und Stralsund, 8.*

A. E. SCHLOEZER *von der Unschädlichkeit der Pocken in Rußland, und von Rußlands Bevölkerung überhaupt, Göttingen und Gotha, 8.*

Brief van IO. ALBERT SCHLOSSER M. D. medelid van de koninglyk maatschappy der weeten-schappen van Londen, aan den zeer ervaarenen en kundigen Heere FERDINAND DEIEAN, onlangs beroemd stads Heekmeester der Stad Batavia behelzende eene naauwkeurige Beschryuing der Amboinsche Haagdis etc. Amsterd. 4 mai. c. tab. aen. 1. (*belgice et latine.*)

H. SMITH *formulae medicamentorum, Lond. 8.*

Dissertation upon the nerues. By WILLIAM SMITH, ib. 8,

Eiusd. system of Physick, ib. 4.

FRID. TRAUGOTT SCHMIDTS *Bienenbau in Körben, oder Niedersächsischer Bienenvater. Leipzig, 8.*

LEBR. EHKGOTT SCHNEIDER *chirurgischen Geschichte mit theoretischen und practischen Anmerkungen. Vierter Band. Chemnitz 8.*

DANIEL GOTTF. SCHREBER *neuer Cameral-schriften 10ter Theil, Leipz. 8. m. K.*

IO. CHRIST. DAN. SCHREBER *ökonomische botanische Beschreibung der Gräser, Leipzig, fol. mit Kupf.*

PHILIP. GEORG. SCHROEDER *dissert. inaug. sistens*

- sistens febrium putridarum differentias, Resp. *Aug. Eberh. Brande*, Gotting. 4.
- Eiusd.* diff. inaug. sistens de dysenteria analecta practica, Resp. *Adam Iul. Goetze*, ib. 4.
- Eiusd.* diff. inaug. de apoplexiae ex praecordiorum vitiis origine analecta sistens, Resp. *Georg. Phil. Koch*, ib. 4.
- Eiusd.* diff. inaug. de arthritide vaga, Resp. *Balthas. Tugend*, ib. 4.
- Eiusd.* diff. inaug. de coctionis atque criseos in febribus impedimentis variisque noxis inde oriundis, Resp. *Gerh. Matth. Frid. Brawe*, ib. 4.
- Litographische Beschreibung der Gegenden um Thangelsstadt und Rettewitz in den Weimarischen von* IO. SAMVEL SCHROEDER, *Pfarrer daselbst, Iena*, 8.
- IGNAT. IO. NEPOMVC. SWANNENFELD diff. inaug. sistens febrium diuisionem, Vienn, 8.
- ION. SIDREN diff. de cholera, Resp. *Io. Sahlberg*, Upsal. 4.
- Eiusd.* diff. symptomatum febrilium pars prima, de affectibus oris et faucium, Resp. *Petro Bergio*, ib. 4.
- Eiusd.* diff. symptomatum febrilium pars secunda, de anxietate, Resp. *Berger. Mart. Hall*, ib. 4.
- Eiusd.* diff. symptomatum febrilium pars tertia, de delirio, Resp. *Dan. Wiser*, ib. 4.
- Eiusd.* dissert. sistens casum sphaceli cranii, Resp. *Iohann Friedrich Tornbohm*, ib. 4.
- Eiusd.* dissert. sistens casum haemorrhoidalem, Resp. *H. Sparschuch*, ib. 4.
- G. E. SILBERSCHLAGS *evangelisch Lutherischen Predi-*

Predigers in Stendal ausgesuchte Closterbergische Versuche in den Wissenschaften der Naturlehre und Mathematick. Berlin, 8. m. K.

ANTON. FRANC. SOTTEGAST institutiones medicae ad motuum leges, ordines, mores, harmoniam, et therapiae ministerium inferuientes etc. Pars I, et II. Francof. 8.

Prodomo di un opera ad imprimerli sopra le riproduzione animali dato in luce dall' Abbate SPALLANZANI Prof. di Filosofia. In Modena, 4.

Eiusd. programme ou précis d'un ouvrage sur les reproductions animales. Traduit del' Italien par M. B*** DE LA SABIONNE à Genev. 8.

AC. REINBOLD SPIELMANN spec. inaug. de animalibus nociuis Alsatie, Resp. Ioh. Friedrich Weiler, Argent. 4.

Eiusd. dissert. inaug. acaciae officinalis historiam sistens, Resp. Ignat. Xaver. Emeric Lachausse, ib. 4.

H. F. VAN DER STADT tractatus de salubritate febris, Gandavi 8.

A. STISSERS botanica curiosa, oder nützliche Anmerkungen, wie einige fremde Kräuter und Blumen in den Helmstädtisch medicinischen Garten cultiviret und fortgebracht werden. Helmstädt und Magdeburg, 8. m. K.

F. V. STISSERS Einleitung zur Landwirthschaft und Policey der Deutschen vermehret von D. G. H. ZINKLER. Neue Auflage, Iena, 8.

FRID. GABR. SVLZER dissert. inaug. qua quaestio: an in plantis sal essentielle ammoniacum haereat? discutitur. Gotting. 4.

IO. CHRIST. TILLING progr. de eorum, qui
aquis mineralibus vtuntur, diaeta, Lipf. 4.

CHRIST. GERH. TIMMERMANNI de herniis animad-
uerfiones, Rintel, 4.

S. A. D. TISSOT fermo inaug. de valetudine litera-
torum, Laufann. 8.

Eiusd. de la fanté des gens de lettres, ib. 8.

Eiusd. von der Gefundheit der Gelehrten. Aus dem
Franzöfifchen überfetzt. Leipz. 8.

Eiusd. An effay on difeafes incident to literary and
fedentary perfons. Translated from the french.
Lond. 8.

Eiusd. Onanie. Aus dem Franzöfifchen überfetzt,
Hamb. 8.

Eiusd. Underättelfe huru Landtmänn böra i brift på
förfarme läkare förhålla fig uti de mäst gängfe fi-
ukdomar och Prof-effer nädigfte befallning fuen-
gis Landboar, tit nödig hielpreda ut af Fransös-
kam öfverfätt af HERRMANN SCHVTZER M.
D. Stockholm 8 mai.

*Gemeinnützige Abhandlungen zur Beförderung und der
Erkenntnis und des Gebrauchs natürlicher Dinge in
Absicht auf die Wohlfahrt des Staats und des mensch-
lichen Geschlechts überhaupt von IO. DAN. TI-
TIVS 1ster Theil Leipz. 8.*

Eiusd. Abhandlung über die Frage, welches die dien-
lichsten und am wenigsten kostbaren Mittel find, der
überhandnehmenden Versandung in der Danziger
Nehring vorzubeugen und dem weitem Anwachse
der Sanddunen abzuhelpfen, ib. 4.

ALOYS. PAVL. TRAVCCHI dissertatio inaug.
de mechanismo et vfu respirationis. Vi-
enn, 8.

DANIEL WILHELM TRILLER dissert. inaug.
de vespertina morborum exacerbatione. Resp.
Ioh. Beniamin Gallwitz, Witeberg, 4.

Eiusd. program. inaug. de vespertina morborum
curatione, diuino Christi miraculo peracta
ib. 4.

Question chirurgico - legale , relative à l'affaire
de Demoiselle Famin, femme du Sieur Lancret,
accusée de suppression de part etc. par M. VA-
LENTIN à Berlin, 12.

ABRIEL FRANCISCA VENEL dissert. med.
de aquis montis aurei. Resp. *Sebast. Ioh. Ba-
ptista Lavialle du Masmorel*. Monspel. 4.

Abrégé de l'anatomie du corps humain. Par Mr.
VERDIER. Quatrieme edition revue, corrigée
et considerablement augmentée par Mr. SABA-
TIER, a Paris, 12. Vol. 2.

Memoire raisonné des remedes et du regime à pra-
tiquer dans la maladie, qui afflige la ville de
Mamers et les paroisses circonvoisines. Par
Mr. VETILLART, envoyé au mois, d'octob.
1767 par Mr. DU CLUZEL au Mans, 8.

Ergo in pertinacibus faciei capitisque doloribus ni-
hil prodesse, sed contra plurimum nocere posse
neruorum quinti paris sectionem. Auctore
PET. MARIA VIEILLARD, Paris. 4.

RUDOLPH. AUGUSTIN. VOGEL opuscula me-
dica selecta, antea sparsim edita, nunc autem in
vnum collecta, recognita, aucta et emendata.
Gotting. 4.

Eiusd. *Neue medicinische Bibliothek.* Des 7ten Ban-
des 3 und 4tes Stück, ib. 8.

RVDOLPH AVGVSTIN VOGEL dissert. inaug. decas
obseruationum physico-medico-chirurgicarum,
Resp. Io. Ioachim Schoenberg, Gotting. 4.

Eiusd. dissert. inaug. de non acceleranda secundina-
rum extractione. Resp. Ludwig Albert Appun,
ib. 4.

Eiusd. dissert. inaug. fluxus coeliaci genuina notio
atque ratio exposita. Resp. Io. Iust. Sothen,
ib. 4.

Eiusd. dissert. inaug. de tuto et eximio vesicatorio-
rum vsu in acutis. Respond. Ioh. Martin Struve,
ib. 4.

Eiusd. program. I et II, de PAULI AEGINETAE
meritis in medicinam, imprimisque chirurgiam
ib. 4.

Description d'un serpent à Sonnette de l'Ameri-
que. Par A. VOSMAER, à Amsterd. 4. c. f.

Eiusd. description du trompette americain, ib.
4. c. f.

Eiusd. description d'un alcyon d'Amerique à longue
queue, ib. 4. c. f.

IO. AVG. VNZERS *Grundris eines Lehrgebäudes
von der Sinnlichkeit der thierischen Körper. Lüneb.
und Rinteln. 8.*

*Die Naturgeschichte der Versteinerungen zur Erläute-
rung der Knorrischen Sammlung von Merkwürdig-
keiten der Natur, herausgegeben von IOHANN
ERNST IMMANUEL WALCH. Des zweyten
Theils erster Abschnitt, Nürnberg. fol.*

IO. GOTTSCH. WALLERIVS elementa metal-
lurgiae speciatim chemicae conscripta atque ob-
seruationibus, experimentis et figuris aeneis illu-
strata, Holm. 8. c. f.

JO. GOTTSCH. WALLERIVS lucubrationum academiarum specimen primum de systematibus mineralogicis et systemate mineralogico rite condendo. Holm. 8. c. f.

A full and plain account of the gout. The second edition corrected to which is added an index. By FERDINAND WARNER, L. L. D. Lond. 8.

An account of a series of experiments instituted with a view of ascertaining the most successful method of inoculating the smallpox. By WILLIAM WATSON M. D. Fellow of the Royal Society one of the Trustees of the British museum and member of the Royal college of Physicians, ib. 8.

E. A. WEBERS *vermischte Anmerkungen aus der Arzeneygelahrtheit und der Litteratur*, Iena 8.

JO. FRID. WEILER dissert. inaug. sistens herniae gangraena correptae, casum et epicrisin, Argentor 4.

The Works of ROBERT WHYTT, Edinburgh. 4.

GEORG. DAN. WIBEL dissertat. inaugur. casum aegroti, auditu difficili ex colluuie serosa, laborantis sponte sanato sistens. Argentorat. 4.

Observationum medicarum triga pro specimine inaugurali. Auctore IUST. NICOL. WIEDENFELD, Gotting. 4.

Treatise on the management of bees. By IO-
NAS WILDMANN, Lond. 4. c. fig.

Eiusd. *Abhandlung von der Wartung der Bienen. Auf Veranlassung einer hochansehnlichen ökonomischen Gesellschaft zu Leipzig aus den Englischen übersetzt und zugleich mit Anmerkungen einiger Mitglieder der Oberlausnitzer Bienengesellschaft versehen, Leipzig, 8. m. Kupf. f. a.*

Sutto-

Suttonius, ou le magicien blanc, nouvelle nouvele.
le. Par IEAN WILKES. à la Haye 8.

IO. HENRICVS WINKLER progr. de vi luminis borealis in commouenda acu magnetica
Lips. 4.

D. DAVID. WIPACHER de thermis Ribariensibus in Hungaria, ib. 8.

IO. AVG. WOHLFARTH obseruatio de vermibus per nares excretis. Hal. Magdeburg. 4. c. f.

IO. BAPTIST. IOSEPH ZAVSCHNER dissert. inaug. de fale a mineralogis haud descripto, opera eius inuento, eruditis communicando ex occasione acidularum ad Pragam recens ab eodem detectarum a loco *na Wenecku* coronariarum, et perillustribus dominis possessoribus Ziegerinorum nomine insignitarum. Prag. 8.

I. F. ZVECKERTS *Beschreibung aller Gesundbrunnen und Bäder Teutschlands.* Berlin, 4.

Contenta in hac parte.

	Medical Transactions Vol. I.	p.195
I.	VAN DEN BOSCH historia constitutio- nis epidemicae verminosae	212
II.	The works of WHYTT	223
V.	MARTINI <i>neues systematisches Conchy- liencabinet. Erster Band.</i>	230
V.	MURRAY de vermibus in lepra obuiis iuncta leprosi historia et de lumbricorum fetis obseruationes	238
VI.	Nuove osservazioni sopra i globetti rossi del sangue	242
VII.	SPALLANZANI dell'azione del cuore ne' vasi sanguigni nuove osservazioni	247
VIII.	Histoire & mémoires de l'Academie royale des sciences de Paris année 1764.	253
X.	Traité de la vitriolisation & de l'aluna- tion &c. par Mr. MONNET	278
X.	PLENKS <i>Anfangsgründe der Geburths- hülfe, I und IIter Theil</i>	286
XI.	Storia naturali degli uccelli, Tomo primo	293
XII.	STÖRCK libellus, quo Continuantur ex- perimenta et obseruationes circa noua sua medicamenta	300
XIII.	EIUSDEM libellus, quo demonstratur, herbam, veteribus dictam flammulam Io- vis, posse tuto et cum magna vtilitate ex- hiberi aegrotantibus	305
		XIV.

- XIV. Journal de médecine, chirurgie, pharmacie &c. Par Mr. ROUX. Tom. XXV & XXVI p.300
- XV. Traité des sensations & des passions en général & des sens en particulier, par Mr. LE CAT. Tom. I.II.III 320
- XVI. Noua physico medica 340
- XVII. Continuatio indicis scriptorum physico medicorum, quae anno 1768 prodierunt. 360
-